



Field Museum of Natural History

LIBRARY

Chicago

From *Strecker Collection*

---

Class ~~A~~ 46.03 Book G556

Gemma 2652


Gen


1777.3

79463



v. 1





1870

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ENTOMOLOGISCHE

B E Y T R Ä G E

Z U

DES RITTER LINNE'

ZWÖLFTEN AUSGABE

DES NATURSYSTEMS

V O N

JOH. AUG. EPHRAIM GOEZE,

Pastor an der Kirche S. Blasii zu Quedlinburg, Ehrenmitgliede  
der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin, der  
Herzoglichen deutschen Gesellschaft in Helmstädt, der  
Naturforschergesellschaft in Halle, und der Königlich  
Schwedischen patriotischen Gesellschaft  
zu Stockholm.

DRITTEN THEILES VIERTER BAND.

34917

---

*L e i p z i g,*

bey Weidmanns Erben und Reich. 1783.

DEYTRÄGE

DEYTRÄGE

DEYTRÄGE

7 24



---

## VORREDE.

**H**ier der vierte und letzte Band des dritten Theils meiner entomologischen Beyträge. Wann der fünfte Theil erscheinen werde, kann ich noch nicht mit Gewisheit bestimmen.

In der Vorrede zu den vorigen Theilen habe ich die entomologischen Schriften angeführt, die in der Zeit noch herauskamen, da die Theile abgedruckt wurden, die ich also bey meiner Handschrift selbst nicht anführen konnte. Jetzt sollte ich also aus Cramers und Espers Heften, wie auch aus Fabricii Spec. Inf. das Uebrige nachholen. Ich bitte aber meine Leser, diese Schriften selbst zu vergleichen, und das Fehlende ihren Exemplaren meiner Beyträge beyzufügen. Es würde die Vorrede sonst beynahe eben so stark, als dieser Band geworden seyn.

Lieber will ich einige, den Entomologen nützliche und sehr gegründete *Berichtigungen* mittheilen, die ich den freundschaftlichen Erinnerungen einiger meiner Freunde zu danken habe.

Zuerst von dem Herrn Pfarrer *Scriba* zu  
Gräfenhausen.

Zum ersten Theil des dritten Bandes der Bey-  
träge über die *Pap. Dan. Cand.*

- 1) Cramers P. D. C. *Nise* kann nicht Hecube, sondern ein anderer seyn. Der Sebaische ist es auch nicht.
- 2) Bey Eubule ist Seb. 38. f. 19. 20. angeführt, und eben dieser Sebaische steht unter den neuen *Lae-  
te flavus*.
- 3) Bey Sennoe ist Seba t. 26. f. 5. 6. citirt; diese Larve und Puppe mit 7. 8. ist aber *Philea*.
- 4) Bey Cleopatra fällt also das Citatum Seba 26. f. 7. 8. weg.
- 5) Cramers *Eclipsis* ist nicht die Linnéische, sondern *Maerula Fabricii*.
- 6) Die Sulzersche *Teutonia* ist Cramers *Coronea*.
- 7) Die *Iphigenia* im Naturforscher ist Cramers *Pyrha*.
- 8) Fabricii *Calypso* hat Seba t. 6. f. 9. 10. und t. 26. f. 3. 4.; letztere fällt also unter den neuen weg.
- 9) No. 84. unter den neuen Sebaischen ist *Leucippe* Cram. et Fabricii.
- 10) No. 89. unter den neuen ist *Odibes* Cram. der nämliche scheint auch Seba t. 18. f. 12. 13. zu stehen.
- 11) Der Bergsträßerische *Nelo* ist zuverlässig eine Varietät von *Rapae*.

12) *Creona*

- 12) Creona Cram. steht Seba t. 18. f. 4. 5.
- 13) Crameri Daplidice ist eigentlich Linn. Hellica.
- 14) Crabifera Cram. scheint Seba t. 38. f. 15. 16. zu seyn.
- 15) No. 97. Seba t. 45. f. 3. 4. oder t. 31. f. 9. 10. möchte Arganbe Fabric. seyn.

Vom Herrn Hofmeister *Knoch* zu  
Braunschweig.

Diese sind wichtig und sehr genau.

Bey der Ph. Tortr. *Prafinana* L. wird im Degeer Th. I. Qu. 1. S. 50. in der Note Rösels IV B. t. 22. angeführt, und im Naturf. VII. p. 139. dieselbe Röselsche Abb. für die Linn. *Prafinana* ausgegeben.

Nach Degeer soll bey der *Prafin.* L. Raupe, Puppe und Schmetterling eine grüne Farbe haben. Dieses fällt aber bey dem Röselschen Schmetterling a. a. O. weg, indem die Puppe unten gelblich und oben röthlich blau ausieht. Daher bin ich der Meynung, daß Linn. *Prafin.* bey dem Rösel IV B. t. 10. f. 5. abgebildet worden, und eben diejenige sey, welche Füesli p. 41. n. 798. Ph. *Bicolorana* nennet, und also Degeer Tom. II. Qu. 2. p. 296. den Geoffr. Inf. II. p. 172. n. 124. Rösel IV. t. 10. und Réaum. I. t. 39. f. 10—14. mit Recht bey der *Prafinana*

angezogen habe. Das Linnéische Citat bey der Prasinana aus Röfel IV. t. 22. ist meiner Meynung nach falsch. Man darf nur die Abbildungen des Réaumür, Degeer und Poda mit jenen, und unter einander vergleichen, um die Sache ins Reine zu bringen. Die Röfelsche Phal. Tom. IV. t. 22. f. 5. *ist keine Tortrix*. Dieses weiß ich aus häufiger Erfahrung. Ich halte sie für Geoffr. Ph. verte ondée. II. p. 172. n. 125. Die Theresianer haben sich wahrscheinlich durch das falsche Zitat beym Linné verleiten lassen, die Prasin. mit der Ph. verte ondée für einerley zu halten,

Meine Leser vergleichen hierbey in diesem Bande p. 3. no. 285,



Beym Degeer Th. I. Qu. 2. S. 5. ist in der Note vieles von den Ursachen und Absichten der besondern Struktur des Gespinnstes der Ph. Pavonia gesagt worden. Seit vier Jahren habe ich Versuche mit diesen Gespinnsten gemacht. Ich habe die Reuse in der Mitte quer durch geschnitten, und die Puppe in dem untern weitem Theile, den ich mit einer Nadel

an

an dem Kasten verflochten, liegen lassen. Ich habe davon *ganz ausgewachsene* Schmetterlinge bekommen; dabey aber die Vorsicht angewandt, daß ich sie in einem grossen Kasten, der inwendig nicht glatt war, auskommen liess. Denn die Männchen sind sehr lebhaft, wenn sie nicht durch die enge Oeffnung kriechen müssen, und fallen während des vielen Hin- und Herlaufens sehr leicht, zumal wenn der Deckel oder die Wände des Kastens glatt sind. Fallen sie aber ein oder mehrere mal; so werden es Krüppel, und ihre Flügel wachsen nicht gehörig aus. Diejenigen, welche durch die Reuse kriechen, und in ihrer Ordnung nicht gestört werden, sitzen bald stille, und kommen nicht so leicht in Gefahr zu fallen. Die Weibchen müssen sich besonders sehr anstrengen, um durch die enge Oeffnung der Reuse zu kommen, und geben sich daher gleich zur Ruhe, um auszuwachsen.

Wozu also der künstliche Bau des Gespinnstes? Der Allmacht des Schöpfers war es gefällig, bey diesem Schmetterling einen andern und künstlichem Weg zu wählen, wodurch er aus seinem Behältniß kommen konnte.

Die vom Degeer T. II. p. 250. no. 2. beschriebene Phaläne kann nicht *Atomaria* L. seyn. Diese hat Frisch XIII. S. 12. t. 5. abgebildet, ist viel kleiner, und bey weitem nicht so groß, als die vom Degeer abgebildete. Degeer ziehet auch Schaeff. Icon. t. 17. f. 3. an, wo offenbar *Prunaria* L. abgebildet worden, die auch Kleemann in seinen Beytr. I. t. 23. f. 3. geliefert hat, und von dieser ist bey dem Degeer die Rede. Denn er sagt: die Flügel wären auf der Oberseite alle Orangegelb, welches bey dem Männchen vorzüglich eintritt; bey der *Atomaria* Linn. aber, die auch im Naturforscher III. t. 1. f. 4. schlecht gezeichnet ist, nicht statt findet. In der Note sind Hufnagel Berlin. Magaz. IV. p. 570. n. 12. der faule Esel; Gleditsch Forstwiss. Th. I. p. 390. n. 7. *Kleemanns* Beytr. I. p. 285. t. 34. angezogen. Vergleicht man aber die Beschreibung der Raupe und des Schmetterlings, so Degeer T. I. Qu. 2. p. 103 — 106. von dem großen braunen Fleischfarbig gestreiften Stockspanner macht, mit Kleemanns Beschreibung am angef. Orte von der Raupe t. 35. f. 1. 2. 3. und hält damit des Hufnagels und Gleditsch *Atomaria*, und Linn. *Hirtaria* zusammen; so wird

wird man sich schwerlich enthalten können, unter allen diesen Namen die *Hirtaria* Linn. zu verstehen. Ich habe sie sehr oft aus der Raupe gezogen, und gefunden, daß die Degeerische Beschreibung l. c. und die Kleemannische mit der Natur genau übereinstimmen. Kleemann wußte es nicht, was für ein Schmetterling aus der t. 35. f. 1. 2. 3. abgebildeten Raupe komme. Denn er giebt die t. 34. f. 4. abgebildete für die Raupe des t. 34. f. 6. 7. vorgestellten Schmetterlings aus. Diese habe ich niemals gehabt, und wenn Kleemann darinn nicht irrt, wie ich denn nicht glaube; so hat der von ihm gezeichnete Spanner, oder *Hirtaria* Linn. *zweyerley Raupen*, wie ich dergleichen auch bey andern Arten gefunden habe. Des Degeer T. I. Qu. 1. p. 256. n. 6. t. 5. f. 21. beschriebene und abgebildete Phaläne halte ich für *Atomaria* Linn. Degeers Ph. Noctua Tom. II. Qu. 2. p. 293. und 294, so Schäffer t. 112. f. 1. 2. abgebildet, ist Linn. Ph. N. Exclamationis, und Hufnagels Ph. N. Clavus; also wohl keine neue Art. Es hat auch Degeer Tom. II. Qu. 1. p. 253. bey der *Fasciaria* Linn. den Rösel I B. Cl. 3. t. 3. unrecht citirt.

Uebrigens hat Herr Cammerrath *Jung* in seinem Verzeichniß der meisten bisher bekannten europäischen Schmetterlinge: 1782.

über die Atomaria,

— Aprilina,

— Ludifica,

*viele Berichtigungen* geliefert.

Bey dieser Gelegenheit aber kann ich nicht umhin, noch dieses anzuzeigen, wie mich Herr *Knoch* sehr versichert hat: daß Herr *Herbst* im 2ten Stück des Füesl. Archivs Männchen und Weibchen der Atomaria nebst der Raupe und Puppe, unter dem Namen: *Artemisaria*, Beyfußspanner, beschrieben und abgebildet habe.

Das 2te Stück der *Knochischen* Beyträge zur Insektengeschichte, mit sieben sehr fein ausgemalten Kupfertafeln, kann ich meinen Lesern abermal nicht genugsam empfehlen.

Herr *Knoch* ist so sehr philosophischer Beobachter und Entomologe, daß eben dadurch seine Beobachtungen an *Genauigkeit* und *Annehmlichkeit* einen vorzüglichen Werth erhalten, und eine große Menge schöner kostbarer Mahlbücher unserer Zeiten weit hinter sich zurücklassen, darinn man nichts, als Genera,

Spe-



Species, u. s. w. von der wahren Naturgeschichte aber fast gar nichts findet. Meine Leser werden mir danken, daß ich ihnen statt einiger magern Auszüge aus jenen, aus diesen einige lehrreiche und höchst interessante Bemerkungen mittheile.

In der Vorrede sagt Herr K. sehr richtig: daß man doch allen Fleiß anwenden möchte, die Abbildungen natürlicher Dinge der Natur so getreu als möglich zu machen, weil sonst die Herrlichkeit des Schöpfers mit entstellt würde. Ein Vorzug, den nur solche geschickte Hände, als die Knochischen, die selbst so vortrefflich zeichnen, ihren Werken geben können!

Ferner eine ansehnliche Vermehrung einer Fauna Bructera. Er hat, wie ich, angemerkt, daß in dem Moosse des Berges viele Puppen unbekannter Spannmesser liegen.

P. 1. Ph. N. virens L. n. 139. davon p. 2. eine eigene Besonderheit. Die Zunge dieser Phal. ist von der Basis an bis in die Mitte gespalten, da sie sonst nur von der Mitte bis an die Spitze gespalten ist. Vielleicht ist sie hier nur zusammengeklebt gewesen, wie mir oft vorgekom-

men

men ist. Diese Phaläne ist auch hier zum *erstenmal* abgebildet.

P. 4. Ph. Geom. pustulataria, die L. nicht hat.

P. 7. Ph. G. Prunaria L. Varietas, zu der verschiedene Citata bey der Sordiatia L. gehören. Die Beschreibung der *Raupe* in schönem Latein, meisterhaft. Kenner der Entomologie werden die Schwierigkeit einer solchen Beschreibung fühlen, besonders bey Larven, die so sehr variiren, und sich durch keine merkliche Farben auszeichnen.

Besonders genau p. 12. die Bemerkungen über die Oekonomie und Lebensart dieser Raupen.

P. 17. heist es unter andern in der Anmerkung: „Könnte man die mannigfaltigen Abänderungen, die sich sowohl an Kammförmigen als Borstenähnlichen Fühlhörnern der Schmetterlinge finden, ohne Hülfe eines Vergrößerungsglases bemerken; so glaube ich, nicht ohne Grund, daß selbige bey sehr vielen Gattungen ein wesentliches Unterscheidungszeichen abgeben würden.“

Es wären denn doch dies nur einzelne Merkmale, die nie einen vollständigen Begriff eines  
natür-

natürlichen Körpers geben. Sie müssen alle zusammen genommen werden.

P. 21. no. 4. Ph. N. Lucipara L. no. 181. t. 1. f. 4. 6. 7. Hier zum *erstenmale* abgebildet. p. 28. sehr artige philosophische Anmerkungen.

„Linné, sagt der V. giebt diese Art für selten aus. Ihm selbst ist er im Freyen nie zu Gesicht gekommen; da hingegen die Raupe jährlich in großer Menge vorhanden sey. Wie viele der bereits bekannten Nachschmetterlinge würden also fehlen, wenn ihre Raupen nicht aufgesucht wären, die sich wegen ihrer lebhaften Farben, ihrer Begierde zur Nahrung, und der davon zurückgebliebenen Spuren, oft ihrer, das Auge an sich ziehenden Kunsttriebe, ihrer Unruhe bey bevorstehender Verwandlung, und anderer Ursachen wegen nicht so sorgfältig verbergen können, als sie es größtentheils in ihrem letzten und vollkommenen Zustande zu thun pflegen, worinn sie am Tage gewöhnlich der Ruhe genießen, und einen ihren trüben und dunklen Farben sehr ähnlichen Aufenthalt wählen, der sie auch oft durch seine Dunkelheit gegen alle Nachstellungen in Sicherheit setzt? Dagegen finden sich meistentheils an denen Schmetterlingen sehr in die Augen fallende Far-

Farben und Zeichnungen, deren Raupen uns durch ihr Ansehen und durch den Aufenthalt in Saamenkapseln, in dem Mark des Holzes, oder in der Erde sehr oft verborgen bleiben.“

Bey gewissen *Käferarten* ist das Verhältniß fast eben so. Wie lange sind die unansehnlichen Larven der Prachtkäfer (*Buprestis*) in alten faulen Holzstämmen verborgen geblieben, und wie schön sind oft die Käfer?

P. 29. Ph. N. *Tanaceti* no. 5. t. 2. f. 1. 9.

Abermal hier *zuerst* abgebildet. Die Raupen können seitwärts, wie einige Blattwickler, 5 bis 6 Zoll weit springen.

P. 36. eine artige Bemerkung, die ich auch aus meiner Erfahrung sehr wahr befunden habe.

„Obgleich diese Raupe eine glatte Haut und helle in die Augen fallende Farbe hat; also von dieser Seite gegen ihre Feinde nicht sonderlich geschützt ist; so habe ich dennoch keine, auch selbst nicht unter den gesundesten Ausgewachsenen gefunden, deren ich oft eine Menge zusammengebracht, welche von andern Insekten beschädigt gewesen wären. Auch waren die Puppen, welche mir nicht ausgekommen sind, niemals besetzt. Ich will

es gern zugeben, daß sie sich durch ihr starkes Schlagen mit dem Kopfe, und andere heftige Bewegungen gegen die Angriffe ihrer Feinde vertheidiget. Allein warum setzen diese Waffen nicht auch andere Arten, welche damit versehen sind, in Sicherheit? Sollten vielleicht die bitteren Säfte, welche unsere Raupe aus ihren Nahrungspflanzen zieht, den gewöhnlichen Raupenverfolgern einen Ekel erregen, so wie den Bohrkäfern, Holzläusen und Schabkäfern bey aufgetrockneten Insekten, welche mit bittern Extrakten bestrichen sind? Ich wünschte, daß auch andere Naturforscher hierüber Beobachtungen anstellen möchten.“

Diese Raupen brachten ihre Puppenhülle ohne Erde aus großen und kleinen Stücken von morschem Weidenholze, die unter ihre Futterkräuter geworfen waren, glücklich zu Stande.

P. 38. 39. 40. 41. ist das kunstmäßige Verhalten der Raupe in Verfertigung ihres Gespinnstes beschrieben, da sie in Verlegenheit gesetzt war, ihren Bau nach einem ganz andern Plan, als der ihr in der Natur angewiesen war, also nur nach den zufällig veranlaßten Umständen, zu machen, wobey der V. sagt: „Ich glaube nicht zu irren, wenn ich diese Kunsthandlung

lung unter *die ersten* setze, die jemals an Insekten bemerkt worden sind.“

Und wir stimmen ihm völlig bey. Dergleichen Bemerkungen können nicht genug gesammelt werden. Die Handlung der Raupe zeugt offenbar von gewissen Graden von Verstandeskraften. Und solche Anmerkungen sind die rechten Materialien zu einer *Psychologie der Thiere*.

P. 44. sagt der V. in der Anm. „Die verlängerten Zungenfutterale sind beynahe ein unterscheidendes Merkmal bey allen Puppen der *Kappenhalsigen Eulen*; doch weichen sie auch unter sich von einander ab.“

Sehr richtig und wahr. Ich fordere hierdurch den Verfasser öffentlich auf: die *Kappenhalsigen Eulen* von den *Noctuis* L. ganz zu trennen, und sie zunächst auf die *Sphinges* folgen zu lassen. Sie verdienen es, und geben dazu selbst die Charaktere an die Hand. Er ist auch der Mann dazu, der nicht nöthig hat, in verba Magistri jurare. —

P. 47. no. 6. Ph. N. *Artemisiae*, die L. nicht hat.

P. 50. von den *Dörnchen an den Fußblättern* dieser *Kappenhalsigen Eulen*, daß sie wegen

gen ihrer *Ordnung* sehr in die Augen fallen, fast allen Eulen gemein sind, und wahrscheinlich zum Mittel dienen, sich fest anzuhalten.

P. 51. no. 7. Ph. N. Trapezina L. no. 99. Von den Mordraupen dieser Phaläne p. 55. besondere Bemerkungen :

1) Dafs sie *in ihrer Freyheit* auch andre Raupen verzehren, wobey sie der V. oft ange-  
troffen hat.

2) Dafs sie sich ungern wieder an Pflanzen gewöhnen, wenn man sie eine Zeitlang mit andern Raupen gefüttert hat.

3) Dafs sie durch das Fleischfressen bisweilen etwas von der grünlichen Farbe verlieren, und bräunlich werden.

4) Dafs eine Kleinere oder Schwächere oft einer Größern überlegen wird, und dieselbe auf die hinterlistigste Art angreift.

„Sie sucht ihr erst von hinten zu durch einen tückischen Biss eine Wunde beyzubringen. Ist ihr solches geglückt; so läßt sie die Verwundete so lange unangefochten, bis sie von ihrer Wunde matt und krank wird. Dann fällt sie über sie her, und giebt ihr die letzten tödtlichen Bisse.

Nach p. 56. ist dem V. Sphinx Euphorbiae nach acht Tagen ausgekommen, der gewöhnlich ein, auch zwey Jahr in der Puppe liegt. Also giebt's wegen der gewissen Zeit des Auskommens noch keine Regel.

P. 58. no. 8. Ph. B. Fagi L. no. 30. Von der Larve p. 59. abermal eine meisterhafte Beschreibung. Ihre Geschichte ist noch nicht aufgeklärt genug. Von ihren unförmlich langen Füßen, welche Absicht? Offenbar erschweren sie ihr das Gehen. Sie stämmt sie in die Höhe, wenn ein Geräusch gemacht wird, oder wenn sie Gefahr fürchtet. Die Schmetterlinge kommen äußerst selten vollkommen aus den Puppen, wenn sie auch gar nicht in ihrer Ruhe gestört werden. Was mag davon die Ursache seyn?

P. 68. no. 9. Ph. G. pulveraria L. no. 215. Diese, die wahre *Clerksche*, aber nicht *Defoliaria*.

P. 71. no. 10. Ph. N. Parthenias L. no. 94. t. 3. f. 8. zum *erstenmale* hier abgebildet: das *Weibchen*. Es ist dieselbe, als unter meinen neuen Ph. glaucescens: Beytr. III Th. 3 B. p. 206. no. 63.



P. 75. no. 11. t. 4. Ph. Pyr. Tarficrinalis, der *Haarfuss*. Eine ganz neue Art.

P. 79. no. 12. t. 5. f. 1-6. Ph. Pyr. Barbalis L. no. 329. wegen der Haare und Fühlhörner merkwürdig.

P. 81. no. 13. t. 5. f. 8. Ph. Tin. Degeerella L. no. 426. Aeufserst lange besondere Antennen.

P. 85. no. 14. Pap. Pl. Rur. W album, das weisse W. t. 6. f. 1. 2. Varietas Pap. Ilicis Esper. An diversa species?

P. 88. no. 2. t. 6. f. 3. Pap. Pl. Rur. Hippothoë. Varietas foeminae.

P. 90. no. t. 6. f. 4. 5. Pap. Pl. Rur. Amphidamas.

P. 93. no. 4. t. 6. f. 6. 7. Pap. Pl. Rur. Erebus. Eine ganz neue Art.

Die t. 6. abgebildeten Tagfalter sind alle merkwürdig. Ihre Geschichte, so wie andrer ihres Geschlechts, verdient noch immer eine genaue Untersuchung. Auch ist es merkwürdig, daß einige dieser Pap. Pl. Rural. in verschiedenen Gegenden häufig, in andern gar nicht gefunden werden. In unserer Gegend Hippothoë,

pothoë, Amphidamus, W album und Erebus gar nicht; Virgaureae äußerst selten.

P. 95. Scarab. hemipterus L. no. 63. t. 7. f. 11. 12. wegen des besondern Kopfs. f. 12.

Gewiß ist in diesen wenigen Bogen mehr *wahre Naturgeschichte* enthalten, als in manchem prächtigen ausgemahlten Werke, das einige hundert Thaler kostet.

Vor der Neujahrsmesse 1783.

G O E Z E.

---

---

V. *Blattwickler*. Ph. Tortrices. \*)

Chenilles plieuses Papillons (Phalenes) larges d'épaules. Réaumur.

Nach der Wiener Entomologen Eintheilung:  
*Syst. Verz. der Schmetterlinge der Wiener Gegend* p. 125. giebt es sechs Klassen derselben.

- 1) Grüne; 2) Metallische; 3) Gelbe; 4) Braune;
- 5) Graue; 6) Düstere.

282. Phal.

\*) Linné hat sie alle unter dem allgemeinen Namen: Tortrices, begriffen; allein Réaumur hat schon einen Wink gegeben, daß ihre Oekonomie und Verwandlung nicht nach einerley Ordnungen und Gesetzen erfolge, mithin darinn schon der Grund zu einer natürlichen, und der Erfahrung gemäßen Eintheilung zu suchen sey. S. *Mém. des Inf.* Tom. II. *Mém.* 5. 6. &c. Er serzt unter diesen *Raupenarten* drey Ordnungen: 1) einige biegen nur den Rand des Blatts über oder unter sich, und überziehen den noch offenen Raum mit einem Gewebe (Chenilles plieuses); 2) andere rollen das Blatt in mehrere Windungen (Chenilles roulées). Jene also *Blattwickler*; diese *Blattroller*. 3) Noch andere spinnen mehr Blätter zugleich oder die Blüthen der Pflanze in einen Knospen zusammen, und dieses entweder einsam, oder gesellschaftlich (Chenilles lieues en paquet; Chenilles lieues des fleurs); *Blattbinder*. S. *Abhandl. von der Wickelraupe*, nebst einigen Vorschlägen zu derselben Verrilgung. 8. Berl. und Leipz. 1779. mit e. Kupfer. Es ist dies aber Ph. G. L. *Braconata*, und keine *Tortrix*.



282. Phal. *Tortr. Cercana*, die *Wachsmotte*. \*)

Müllers Linn. Naturfyst. 5 Th. 1 B. p. 722. no. 282.  
der *Honigdieb*.

Fabric. S. E. p. 655. *Tinea*. 1. *Cerella*:

Alis griseis, postice emarginatis: dorso canaliculato, fusco.

283. *Fasciana*, das *Weißband*. \*\*)

Müller l. c. p. 723. no. 283. *Weißband*.

Wiener Schmett. p. 131. E. Graue Blattwickler, Ph.  
*Tortr. Cinercae*: n. 36. *Unbekannte Raupe*;  
Dunkler Wickler mit *breitem weißem Querbande*. T. *Fasciana* L.

Geoffr. Inf. II. p. 188. no. 14. *Tinea fusca*, capite  
fusco, alis pone albidis.

La *Teigne bedaude à tête brune*. Long. 4  
lign.

Raj. Inf. p. 204. no. 99. *Phalaena parva*, alis ob-  
longis, *Tinea* instar, e fusco et albo bicoloribus,  
nigra parte alba longiore.

Aequa-

\*) Ich kann nicht sagen, was den *Linué* bewogen hat, diese un-  
ter die *Wickler* zu setzen, da sie eher zu den eigentlichen *Mot-  
ten*, *Tinea*, zu gehören scheint. Ich habe die Verwüstungen  
der *Larve* an einer mit Wachs und Harz imprägnirten *Kindes-  
mumie* erfahren. Als ich sie vor drey Jahren bekam, waren  
hin und wieder kleine mit Wurmmehl angefüllte Löcher zu se-  
hen. Dies bewog mich, sie eine geraume Zeit in Weingeist zu  
legen, und wieder zu trocknen. Dessen ohnerachtet zeigen sich  
bis jetzt noch immer kleine weiße Larven darinn, die sierdurch-  
löchern. Das Wachs muß vorzüglich die Nahrung der Lar-  
ven seyn. Ich kann aber nicht sagen, ob es dieselbe Art mit de-  
nen in den Bienenstöcken sey, weil ich sie nicht zur Verwand-  
lung bringen können.

\*\*) Nicht abgebildet.

Aequalis *vestivorae*, at paulo minor.

Scop. Ent. carn. p. 233. no. 586. Phal. *Fasciana*.

Alae anticae supra fulco glaucoque variae;  
*fascia* lata postica *albida*.

Habitat in *Pomis*, quorum folia convolvit.

Long. Lin. 4. Lat.  $2\frac{1}{3}$ .

Mülleri (Otto Fridr.) Faun. Fridr. p. 55. no. 471.

Ph. T. *fasciana*. Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1494. Nom. Linn.

284. *Uncana*, der Klauenflügel.

Müller l. c. p. 723. no. 284. *Klauenflügel*.

Wiener Schmett. p. 91. Y. *Afterspannraupen*, Lar-  
vae *Pseudogeometrae*; *Blendende Eulen*, Ph.

Noct. *Submetallicae*: n. 4. *Unbekannte Raupe*;

*Braunblanke weißgezeichnete Eule*; N. *Unca*.

Ph. Geom. *Uncana* L.

Fabric. S. E. p. 646. no. 7. *Pyralis uncana*. Nom.  
Linn.

— Spec. Inf. II. p. 277. no. 8.

Otto Fabric. Faun. Groenl. p. 195. no. 151. Nom.  
Linn.

Habitat inter frutices ad ripas rivulorum.

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 455.

— Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1495. Nom. Linn.

Clerk Phal. t. 3. f. 7.

285. *Prasinana*, der *Grasgrünwickler*. \*)

Müller l. c. p. 723. no. 285. der *Erlenwickler*.

A 2

*Füeslins*

\*) Die beyden vom Linné angeführten Schriftsteller bey dieser *Prasinana*: Réaumur, und Degeer gehören nicht zu derselben, sondern zu einer besondern Art, welche Füesl. *Bicolorana* nennet. Wegen des rothen Flügelrandes aber möchte die Geoffroy'sche II. no. 125. wohl die wahre *Prasinana* L. seyn.

*Früßlins* Verz. Schweiz. Inf. p. 41. no. 797. Ph. *Prasinana*. Bey uns selten auf *Eichen*.

*Röfels* Insektenbel. IV. p. 252. t. 22. die zu der NV. 2ten Kl. gehörige schöne gelblichtgrüne Bücherraupe. \*)

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 94. no. 271. der *Erlenwickler*.

*Wiener Schmett.* p. 125. A. *Grüne Blattwickler*, Ph. Tortr. *Virides*: no. 2. *Hageeichenwickler* (Querc. Rob.); *Hageeichenwickler*. T. *Prasin.* L.

*Gleditsch* Forstw. I. p. 557. no. 13. Ph. Tortr. *prasinana*, das *grüne Blatt*, der *grüne Blattwickler*. p. 656. no. 44. der *gelbgrüne weißpunktirte Blattwickler*.

*Behm.* Ep. S. Linn. p. 167. no. 285. Ph. T. *prasinana*. Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inf. II. p. 172. no. 125. *Phalaena Seticornis Spirilinguis*; alis deflexis viridibus; fascia duplici transversa saturatiore. \*\*)

*La Phalène verte ondée.*

*Long.* 7 Lign.

*Fabric.* S. E. p. 645. no. 3. *Pyralis prasinana*. \*\*\*)

*Variat* antennis pedibusque albis et fulvis.

— *Ejusd. Species Insectorum* I. p. 276. no. 5. *Pyralis Fagana*.

Alis

\*) Die *Röfelsche* IV. t. 22. ist mit der t. 10. nicht einerley, sondern die letztere ist die *Bicolorana* des *Früßl.* *Réaumur*, und *Degeer*.

\*\*) Ses Ailes superieures sont vertes, bordées d'un peu de rouge et nuancées de trois bandes presque transverses d'un vert plus foncé.

\*\*\*) *Röfel* IV. t. 10. wie auch *Réaumur*. und *Degeer* gehören nicht hieher.

Alis viridibus, strigis tribus obliquis albis;  
antennis pedibusque fulvis.

Larva viridis, linea laterali flava, cauda bifida.

Pupa intra folliculum, gibbosum, ferrugineum.

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 456. Ph. T. *prasinana*.

— Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1496. Ph. T. *prasinana*. Nom. Linn.

286. *Viridana*, der *Grünwickler*. \*)

Müller l. c. p. 723. no. 286. der *Grünwickler*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 799. Ph. *Viridanæ*.  
Sehr häufig auf *Eichen*.

— Magaz. der Entomol. II. p. 38. Ph. *Viridana*.  
Die Raupen des Chorherrn Meyer hatten alle auf dem achten Absatz braune Flecke.

Röfels Infektenbel. I. NV. 4 Kl. p. 5. t. 1. der in den Eichenblättern wohnende grüne Blattwickler mit kleinen schwarzen Punkten.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 18. no. 29. der *Grünwickler*.

Wiener Schmett. p. 125. A. Grüne Blattwickler: no. 3. *Kahneichenwickelraupe* (Querc. Rob.); *Kahneichenwickler*. T. *Viridana* L.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 656. no. 45. der ganz grüne Blattwickler sonder Flecke, II. p. 752. no. 78.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 463. E. Blattwickler: no. 22. der ganz grüne *Eichenwickler*.

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 371. no. 17. *Viridana*.

A 3

Oekono-

\*) Das Zitatum: Frisch III. n. 8, t. 5. das Linné hierbey angeführt hat, gehört zu *Clorana*.

*Oekonomische Nachrichten* der patriotischen Gesellschaft in Schlesien I. p. 142. 143. 152.

Der *fahlgrüne Blattwickler* für die Obstbäume der gefährlichste; der minder gefährliche, doch immer schädliche, der *schwarze bunte und gestreifte*.

*Behm. Epit. S. L.* p. 167. no. 286. *T. Viridana.* Nom. *Linn.*

*Syst. Natur.* du Regn. Anim. II. p. 160. no. 85. *Phalène du Saule.*

*Geoffr. Inf. II.* p. 171. no. 123.

*Phalaena feticornis spirilinguis*, humeris latis, antennis flavescens, alis dilute virescentibus.

*La Chappe verte.* Long. 4 lign.

*Fabric. S. E.* p. 646. no. 4. *Pyralis Viridana.* Nom. *Linn.*

*Larva nuda*, 16poda, viridis, nigro-punctata; pedibus posticis flavis.

*Pupa brunnea*, postice stylo bifido.

— *Ejusd. Species Inf. II.* p. 277. no. 6. *P. viridana.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 52. no. 457. *T. Viridana.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 130. no. 1497. *T. Viridana.* Nom. *Linn.*

287. *Clorana*, der *Wollweidenwickler*.

*Müller l. c.* p. 724. no. 287. t. 22. f. 13. der *Weidenwickler*.

*Fließlins* schweiz. *Inf.* p. 41. no. 800. *Ph. Clorana.*

— *Magaz. der Entomol.* p. 38. *Ph. Clorana.* Nach des Chorherrn *Meyer* Bemerkung überwinter die *Puppen*. *Rösel* sagt: nach 14 Tagen erschienen



fchienen die Vögel. Vermuthlich *zwei Genera-  
tionen* im Jahr.

*Frisch* Inf. III. p. 18. no. 8. 2 Pl. t. 5. die kleine  
*graue Weidenraupe* mit dem grünen *Zweifal-  
ter* — mit ganz *grünen Oberflügeln* mit weißem  
Saum, und weißen *Unterflügeln* (also der *Rö-  
felsche* I. NV. 4 Kl. t. 3.).

*Röfels* Insektenbel. I. NV. 4 Kl. p. 8. t. 3. der *dicke  
grünlichgraue Blattwickler* zwischen den *Weiden-  
blättern*.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 60. no. 167. der  
*Weidenwickler*.

*Wiener Schmett.* p. 126. A. *Grüne Blattwickler*: no.  
4. *Weidenwickelraupe* (Salic. Pentandr.); *Wei-  
denwickler*. T. *Clorana* L.

*Réaumur* Inf. II. Mém. 5. p. 236. t. 18. f. 6. 7. f. 4.  
*Coque en bateau*.

*Fabric.* S. E. p. 646. no. 5. *Pyralis Clorana*,  
Nom. *Linn. Spec. Inf.* II. p. 277. no. 7.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 52. no. 458. T. *Clorana*.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 130. no. 1498. T. *Clorana*.  
Nom. *Linn.*

*Degeer* Inf. Tom. II. P. I. p. 475. no. 8. t. 10. f. 5-  
9.

*Phalène chappe verte à bordure blanche.*

*Phalène* à antennes filiformes. à trompe, à ai-  
les larges en toit vertes en dessus bordées de blanc,  
& blanches en dessous.

— *Uebersf.* 2 B. 1 Th. p. 350. no. 8. t. 10. f. 5-9.  
die *grüne weißgerändelte Mantelphaläne*.

288. *Litterana*, der *Buchstabenflügel*. \*)

*Müller* l. c. p. 724. no. 288. der *Buchstabenflügel*.

A 4

Füesl.

\*) Nicht abgebildet.

*Füesl.* Schweiz. Inf. p. 41. no. 801. Ph. *Litterana*.  
*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 753. no. 77. T. *litterana*,  
 der dunkelgrüne Blattwickler mit schwarzen  
 Zeichnungen.

Der *Wiener Nachtrag* p. 317. Tortrices. A. Grüne  
 Wickler: no. 5. *Unbekannte Raupe*; hochgrüner  
 schwarz gezeichneter Wickler. T. *Litterana* L.  
*Fabric.* S. E. p. 646. no. 6. *Pyralis Litterana*.  
 — *Spec. Inf.* II. p. 284. no. 51.

289. *Zoegana*, der Rostpunkt.

*Müller* l. c. p. 724. no. 289. der *Wechselfpunkt*.  
*Füesl.* Schweiz. Inf. p. 41. no. 802. Ph. *Zoegana*.  
 Bey uns selten.

*Wiener Schmett.* p. 127. C. Gelbe Blattwickler: no.  
 4. *Unbekannte Raupe*; strohgelber Wickler mit  
 einem braunen Winkelstrich.

*Fabric.* S. E. p. 648. no. 18. *Pyralis Zoegana*.  
 Alis flavis; puncto medio lituraque postica  
 ferrugineis.

— *Spec. Inf.* II. p. 280. no. 25.

*Clerk* Phal. t. 4. f. 4.

290. *Hamana*, der Hakenflügel.

*Müller* l. c. p. 724. no. 290. der *Hakenflügel*.

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 754. no. 79. T. *hamana*.

Der Blattwickler mit gelben Oberflügeln, die  
 mit einem braunrothen Punkte und einer solchen  
 hakenförmigen Zeichnung versehen sind.

*Wiener Schmett.* p. 127. C. Gelbe Blattwickler: no.  
 3. *Unbekannte Raupe*; zitrongelber Wickler mit  
 einem braunen Wiederhaken. T. *Hamana*. L.

*Fabric.* S. E. p. 648. n. 18.  $\beta$ . *Pyr. Hamana*. Nom.  
*Linn.*

(als eine Abänderung der *Zoegana*.)

*Clerk*

Clerk Phal. t. 4. f. 47.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1500. T. *Hama-*  
*na.* Nom. Linn.

291. *Kaekeritziana*, der *Upsalische Einpunkt.* \*)

Müller l. c. p. 725. no. 291. der *Einpunkt.*

Wiener Schmett. p. 177. C. Gelbe Blattwickler: no.  
1. Unbekannte Raupe; bleichgelber Wickler mit  
einem *Mittelpunkt.* T. *Kaekeritziana* L.

292. *Oporana*, der *Netzförmige Wickler.*

Müller l. c. p. 725. no. 292. das *Netz.*

Gleditsch Forstwiss. II. p. 788. no. 15. T. *Oporana*,  
die rothgraue gefleckte /und gegitterte *Aepfel-*  
*baummotte.*

Wiener Schmetterl. p. 128. D. Braune Blattwickler,  
T. *Ferrugineae*: no. 2. *Zwetschenwickelraupe*  
(*Pruni domest.*); *Zwetschenwickler.* T. *Opora-*  
*na* L.

Glasers physik. ökon. Abh. von den schädlichen  
Raupen der Obstbäume. (neue Ausg. 1780.) p. 35.  
t. 3. f. 5. 6. 7. \*\*)

Fabric. S. E. p. 651. no. 33. *Pyralis Oporana.*  
Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 283. no. 43.

Geoffr. Inf. II. p. 170. no. 119.

A 5 *Pha-*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Da diese Wickler so sehr in der Farbe ändern, und gelblich,  
bräunlich, grünlich und röthlich gefunden werden; so trage ich  
kein Bedenken, die *Glaserschen* Wickler hierher zu ziehen. Ob-  
gleich der *Röfelsche* I. NV. 4 Kl. t. 2. vom *Geoffroy* hierher  
gerechnet wird; so wollte ich ihn doch lieber mit andern Schrift-  
stellern für die folgende *Rosana* L. halten.

*Phalaena feticornis spirilinguis*, humeris latis, aurato-flavescens, alarum fascia transversa, maculaque duplici fusca.

La Chappe à bande ♂ tache brune. Long. 4 lign.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1499. T. *Opera-na*. Nom. Linn.

293. *Rosana*, der *Rosenwickler*.

Müller l. c. p. 725. no. 293. der *Rosenwickler*.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4 Kl. t. 2. p. 7. der schwarze Blattwickler mit weißen Punkten auf den Kirschbäumen. \*)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 18. no. 30. der *Rosenwickler*.

Früßl. Magaz. der Entomol. II. p. 38. T. *Rosana* (mit dem Rölfelschen Zitato I. NV. 4. t. 2.). Die Raupe auch in *Haselblättern* und *Eichenblättern*. Sind den *Schlupfwespen* unterworfen.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 869. no. 1. T. *Rosana*, die kleine Blattwicklermotte des *Rosenstrauchs*.

— p. 1033. no. 4. T. *Rosana*, die *Rosenblattwicklermotte* mit der grauen Querbinde in den Oberflügeln.

Blankaart Schaupl. der Raupen t. 8. f. E F G H.

Wiener Schmett. p. 128. C. Gelbe Blattwickler: no. 10. Heckenrosenwickelraupe (*Rosae caninae*); *Heckenrosenwickler*.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 161. no. 86. *Phalène de la Rose*.

Act.

\*) Aus diesem Rölfelschen macht der Staatsr. Müller Faun. Fr. p. 58 n. 523. eine neue Art von *Motten*: Ph. *Tinea* Hebenstreitella:

Alis subfuscis; priorum maculis tribus obscuris umbraticis,

*Act. Upsal.* 1736. p. 25. no. 77. *Papilio* alis depressis brevissimis testaceis.

*Fabric. S. E.* p. 647. no. 9. *Pyralis Rosana.* Nom. Linn.

— *Spec. Insect.* II. p. 278. no. 11.

*Réaum. Inf.* II. t. 15. f. 5-9.

*Degeer Inf.* I. *Mém.* 13. p. 403. t. 27. f. 4. 8. 11. 12.

14. *Uebersf.* I. 3 Qu. S. 17.

— Tom. II. P. I. p. 468. no. 1.

*Phalène* à antennes filiformes à trompe; à ailes larges brunes; à taches & lignes transverses obscures, dont les inférieures sont noirâtres en dessus, à barbillons courbés.

*Phalène* chappe brune à réseau des arbres fruitiers.

— *Uebersf.* II B. I Th. p. 345. no. 1. der netzförmige Braunmantel auf den Obstbäumen.

*Mülleri Zool. Dan. Prodr.* p. 130. no. 1503. *T. Rosana.* Nom. Linn.

294. *Gnomana*, die Querstreife.

*Müller l. c.* p. 725. no. 294. der Schiefband.

*Wiener Schmett.* p. 127. C. Gelbe Blattwickler: no. 7. Unbekannte Raupe; blaßgoldgelber Wickler mit rothbraunen Schrägstreifen.

*Fabric. S. E.* p. 651. no. 32. *Pyralis Gnomana.* Nom. Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 285. no. 42.

*Clerk Phal.* t. 4. f. 13.

*Geoffr. Inf.* II. p. 171. no. 121.

*Phalaena feticornis spirilinguis*, humeris latis, flava, fascia transversa fusca.

La Chappe brune à bande brune.

Long.  $2\frac{1}{2}$  lign.

*Degeer* Inf. Tom. II. P. I. p. 469. no. 3.

*Phalène* à antennes filiformes à trompe, à ailes larges d'un jaune foncé à lignes obliques & nuances brunes.

*Phalène* chappe jaune à bande brune du Poirier.

— *Uebersf.* II B. I Th. p. 346. no. 3. der *Gelbmantel mit einer braunen Binde auf den Birnbäumen.*

295. *Xylosteana*, der *Heckkirfchenwickler.*

*Müller* l. c. p. 725. no. 295. der *Kreuzträger.*

*Neuer Schaupl. der Natur* II B. p. 247. der *Kreuzträger.*

*Wiener Schmett.* p. 128. D. *Braune Blattwickler, T.*

*Ferrugineae:* no. 4. *Heckenkirfchenwickelraupe* (*Lonicerae Xylostei*); *Heckkirfchenwickler. T.*

*Xylosteana* L.

*Clerk* Phal. t. 2. f. 6.

*Fabric.* S. E. p. 648. no. 14. *Pyralis Xylosteana.*

*Alis anticis testaceis; fascia fusca.*

— *Spec. Insect.* II. p. 279. no. 19.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1501. T. *Xylosteana.* Nom. *Linn.*

296. *Arcuana*, der *Bogenwickler.*

*Müller* l. c. p. 726. no. 296. die *Bogenbinde.*

*Wiener Schmett.* p. 126. B. *Metallische Blattwickler:*

no. II. *Unbekannte Raupe; goldgelber Wickler mit einer schwarzen Makel und Silber. T. Arcuana* L.

*Catholicon* A. p. 456. T. *Arcuana.*

*Fabric.* S. E. p. 649. no. 22. *Pyralis Arcuana.*

Alis luteis; fasciis tribus *arcuatis* maculaque disci atra; punctis tribus argenteis — Lineolae tres argenteae ad basin alarum.

— Spec. Inf. II. p. 281. no. 31.

*Clerk* Phal. t. 10. f. 8.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 52. no. 461. T. *Arcuana*.

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1506. T. *Arcuana*.  
Nom. *Linn.*

297. *Avellana*, der *Hafelwickler*.

*Müller* l. c. p. 726. no. 297. *Hafelwickler*.

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 570. no. 9. T. *Avellana*,  
der *braune bandige Blattwickler der Hafelstau-*  
*de*.

*Wiener Schmett.* p. 127. C. *Gelbe Blattwickler*, T.  
*Flavae*: no. 8. *Hafelstaudenwickelraupe* (*Coryli*  
*Avellanae*), *Hafelstaudenwickler*. T. *Avellana* L.

*Catholic.* A. p. 631. T. *Avellana*.

*Albin* Inf. I. t. 95. f. g. h.

*Fabric.* S. E. p. 650. no. 25. *Pyralis Avellana*.  
Nom. *Linn.*

— Spec. Inf. II. p. 281. no. 34.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 52. no. 460. T. *Avellana*.

— Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1505. T. *Avellana*,  
Nom. *Linn.*

*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 158. no. 72. Phal.  
des *Jardins*.

298. *Ameriana*, der *Gemeinstrich*.

*Müller* l. c. p. 726. no. 298. der *Gemeinstrich*.

*Füßl.* Schweiz. Inf. p. 41. no. 803. T. *Ameriana*.  
Auf den *Weiden*.

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 754. no. 80. T. *Ameria-*  
*na*, der *eigentliche Weidenblattwickler*.

*Wiener Schmett.* p. 128. C. Gelbe Blattwickler: no.

II. *Sahlweidenwickelraupe* (Sal. Capreae), *Sahlweidenwickler.* T. *Ameriana* L.

*Fabric. S. E.* p. 647. no. II. *Pyralis Ameriana.*  
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 278. no. 15.

299. *Piceana*, der *Fichtenwickler.*

*Müller l. c.* p. 726. no. 299. der *Pechflügel.*

*Gleditsch Forstwiss.* I. p. 503. no. 7. T. *Piceana*,  
der *Nadelwickler.*

*Clerk Phal.* t. 2. f. 9.

*Mülleri* *Faun. Fr.* p. 52. no. 459. T. *Piceana.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 130. no. 1502. T. *Piceana.*  
Nom. *Linn.*

300. *Ministrana*, der *Roststrich.*

*Müller l. c.* p. 726. no. 300. der *Rothrand.*

*Wiener Schmett.* p. 128. D. Braune Blattwickler:  
no. 5. *Unbekannte Raupe; Zimmtbrauner goldgelb gemischter Wickler.* T. *Ministrana.*

*Syst. Nat. du Regn. Anim.* II. p. 159. no. 75. *Phal. de Jardin.*

*Fabric. S. E.* p. 648. no. 15. *Pyralis Ministrana.*  
Nom. *Linn.*

— *Spec. Insect.* II. p. 279. no. 20.

*Clerk Phal.* t. 2. f. 12.

301. *Lecheana*, der *I L Wickler.*

*Müller l. c.* p. 727. no. 301. das *I L.*

*Gleditsch Forstwiss.* II. p. 822. no. 17. die *preussische Blattwicklermotte.*

*Pontoppid. N. H. von Dännem.* p. 223. t. 17. *Ph. Tortr. Lecheana.*

*Wiener Schmett.* p. 126. B. *Metallische Blattwickler:*

no. 3.



no. 3. *Ahornwickelraupe* (*Aceris campestris*),  
*Ahornwickler*. T. *Lecheana* L.

*Clerk* Phal. t. 10. f. 2.

*Fabric*. S. E. p. 649. no. 23. *Pyralis Lecheana*.  
Nom. *Linn*.

— *Spec. Inf.* II. p. 281. no. 32.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 52. no. 462. T. *Lecheana*.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 131. no. 1507. T. *Lecheana*.  
Nom. *Linn*.

302. *Bränderiana*.

β) *Fuscana*, der *Braunwickler*.

*Müller* l. c. p. 727. no. 302. t. 22. f. 14. der *Braun-*  
*wickler*.

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 754. no. 76. T. *Fuscana*,  
der *braune Blattwickler*.

*Fabric*. S. E. p. 648. no. 13. *Pyralis fuscana*.  
Nom. *Linn*.

*Clerk* Phal. t. 4. f. 7.

*Mülleri* *Zool. Dan. Pr.* p. 130. no. 1504. T. *fuscana*.  
Nom. *Linn*.

303. *Christiernana*, der *blutadrichte Wickler*.

*Müller* l. c. p. 727. no. 303. die *Blutader*.

*Füesl.* Schweiz. Inf. p. 41. no. 805. Phal. *Christier-*  
*nana*.

*Wien. Schmett.* p. 128. C. *Gelbe Blattwickler*: no. 9.  
*Unbekannte Raupe*; *hochgelber Wickler mit ro-*  
*senrothen Gitterstreifen*.

*Schäff.* Icon. t. 145. f. 4.

*Fabric*. S. E. p. 649. no. 24. *Pyralis Christier-*  
*nana*. Nom. *Linn*.

— *Spec. Inf.* II. p. 281. no. 33.

304. *Forskåleana*, das *gelbe Netz*.

*Mil.*

Müller l. c. p. 727. no. 304. das gelbe Netz.

Wiener Schmett. p. 127. C. Gelbe Blattwickler: no. 6. Rosenwickelraupe (*Rosae Centifoliae*); Rosenwickler. T. *Forskaleana* L.

Fabric. S. E. p. 652. no. 41. *Pyralis Forskaleana*. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 285. no. 57.

Clerk Phal. t. 10. f. 2. 6.

Mülleri Faun. Fr. p. 52. no. 463. T. *Forskaleana*.

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1508. T. *Forskaleana*. Nom. Linn.

305. *Loeflingiana*, das Doppelkreuz.

Müller l. c. p. 727. no. 305. das Doppelkreuz.

Fabric. S. E. p. 652. no. 42. *Pyralis Loeflingiana*. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 285. no. 58.

Clerk Phal. t. 10. f. 6.

306. *Hartmanniana*, der Doppelstrich. \*)

Müller l. c. p. 728. no. 306. der Doppelstrich.

Faun. Suec. ed. 2. no. 1322.

307. *Bergmanniana*, das vierfache Silberband.

Müller l. c. p. 728. no. 307. das Silberband.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 806. Phal. *Bergmanniana*. Selten.

Wiener Schmett. p. 126. B. Metallische Blattwickler, no. 5. Unbekannte Raupe, gelber Wickler mit Silberstrichen. T. *Bergmanniana* L.

Clerk Phal. t. 10. f. 5.

Fabric. S. E. p. 652. no. 43. *Pyralis Bergmanniana*. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 285. no. 59.

Scop.

\*) Nicht abgebildet.

*Scop.* Entom. carn. p. 232. no. 584. Ph. *Bergmanniana*.

Alae anticae flavae, nodulis binis, fasciisque argenteis, margine fusco-ferrugineo.

Long. lin.  $3\frac{1}{2}$ . Lat. 2.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 53. no. 465. T. *Bergmanniana*.

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1509. T. *Bergmanniana*. Nom. Linn.

*Degeer* Inf. II. P. I. p. 469. no. 4.

Phalène à antennes filiformes à trompe, à ailes larges d'un jaune orangé luisant avec quatre rayes transverses d'un brun argenté.

Phalène Chappe jaune à rayes argentées.

— *Uebers.* II B. I Th. p. 346. no. 4. der Gelbmantel mit Silberstreifen.

308. *Holmiana*, das silberne Dreyeck.

*Müller* l. c. p. 728. no. 308. das silberne Dreyeck.

*Füssl.* Schweiz. Inf. p. 41. no. 807. Ph. *Holmiana*.

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 789. no. 17. T. *Holmiana*, die kleine gelbrothe Obstmotte mit dem dreyeckigen silberfarbigen Runsflecke.

*Wien.* Schmett. p. 127. B. Metallische Blattwickler: no. 16. Birnwickelraupe (*Pyri* comm.); Birnwickler. T. *Holmiana* L.

*Fabric.* S. E. p. 650. no. 31. *Pyralis Holmiana*. Nom. Linn.

— *Spec.* Inf. II. p. 283. no. 41.

*Clerk.* Phal. t. 10. f. 7.

*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 158. no. 73. Phalène des Pommiers.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 53. no. 466. T. *Holmiana*.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1510. T. *Holmianna*. Nom. *Linn.*

309. *Rolandriana*, der *Krummstrich*. \*)

*Müller* l. c. p. 728. no. 309. der *Krummstrich*.

*Wiener Schmett.* p. 128. C. *Gelbe Blattwickler*: no. 12. *Weißnießwurzwickelraupe* (*Veratri albi*); *Weißnießwurzwickler*. T. *Rolandriana* L.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 53. no. 467. T. *Rolandriana*.

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1511. T. *Rolandriana*. Nom. *Linn.*

310. *Solandriana*, der *Birkenwickler*.

*Müller* l. c. p. 728. no. 310. der *Birkenwickler*.

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 551. no. 10. T. *Solandriana*, der *Birkenblattwickler*.

*Scop.* Entom. carn. p. 234. no. 587. T. *Solandriana*.

Macula media, communis, ovata, alterius coloris; alae anticae margo crassior apicem versus fusco-punctatus.

*Long.* Lin. 5. *Lat.* 2 $\frac{1}{2}$ .

*Fabric.* S. E. p. 648. no. 17. *Pyralis Solandriana*.

Alis pallidis, albo-subfasciatis, macula communi dorsali, ferruginea.

— *Spec. Inf.* II. p. 280. no. 23.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1513. T. *Solandriana*. Nom. *Linn.*

*Degeer* *Inf.* I. t. 28. f. 29. 30.

— *Ueberf.* 3 Quart. p. 20.

— — II. Part. I. p. 485. no. 3.

*Phalène* à antennes filiformes, à trompe, à ailes

\*) Nicht abgebildet.

ailes pendantes d'un brun clair à tache triangulaire blanche sur la femelle & brune sur le male au bord interieur.

*Phalène* brune à losange blanche du Bouleau.

— *Uebersf.* II B. I Th. p. 358. no. 3. *die braune Birkenphaläne mit dem weissen rautenförmigen Fleck.*

311. *Hastiana*, die weiße Schrägbinde.

*Müller* l. c. p. 729. no. 311. die *Krummbinde.*

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 755. no. 82. T. *Hastiana*, die blaugraue *Weidenmotte mit der schräglaufenden weissen Binde.*

*Wiener Schmett.* p. 126. B. *Metallische Blattwickler:* no. 4. *Bruchweidenwickeltraupe* (*Salicis fragilis*); *Bruchweidenwickler.* T. *Hastiana* L.

*Clerk* Phal. t. 2. f. 7.

*Fabric.* S. E. p. 650. no. 26. *Pyralis Hastiana.* Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 282. no. 36.

312. *Wahlbomiana*, das *Wolkenband.* \*)

*Müller* l. c. p. 729. no. 312. das *Wolkenband.*

*Wiener Schmett.* p. 131. E. *Graue Blattwickler:* no. 20. *Unbekannte Raupe, grauer Wickler mit dunklen Flecken.* T. *Wahlbomiana* L.

*System. Nat.* du Regn. Anim. II, p. 158. no. 74.

*Phalène* de la grandeur d'une petite Mouche, qu'on trouve quelquefois dans les Jardins.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 53. no. 468. T. *Wahlbomiana.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 131. no. 1512. T. *Wahlbomiana.* Nom. *Linn.*

B 2 313. *Le+*

\*) Nicht abgebildet.

313. *Lediana*, die *Silberschuppe*.

Müller l. c. p. 729. no. 313. die *Silberschuppe*.

Wiener Schmett. p. 127. B. *Metallische* Blattwickler: no. 13. *Porschwickelraupe* (*Ledi palustris*); *Porschwickler*. T. *Lediana* L.

Fabric. S. E. p. 650. no. 27. *Pyralis Lediana*.  
Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 282. no. 37.

Clerk Phal. t. 10. f. 12.

314. *Alstroemeriana*, der *Seitenrostfleck*.

Müller l. c. p. 729. no. 314. der *Braunfleck*.

Wiener Schmett. p. 130. E. *Graue* Blattwickler: no. 18. *Unbekannte* Raupe; *weissgrauer* Wickler mit *Purpurflecken*. T. *Alstroemeriana* L.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 162. t. 23. f. 5. der *Braunfleck*. T. *Alstroemeriana* L.

Clerk Phal. t. 10. f. 1.

Fabric. S. E. p. 653. no. 44. *Pyralis Alstroemeriana*. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 286. no. 61.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 469. T. *Alstroemeriana*.

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1514. T. *Alstroemeriana*. Nom. Linn.

315. *Schalleriana*, die *Rostflügelspitze*.\*)

Müller l. c. p. 729. no. 315. der *Rostfleck*.

Fabric. S. E. p. 650. no. 28. *Pyralis Schalleriana*.

Alis canis; macula marginali ferruginea.

Puncta aliquot muricata ad basin alae anticae.

— Spec. Inf. II. p. 282. no. 38.

316. *Schrae-*

\*) Nicht abgebildet.

316. *Schraeberiana*, das weisse Randdreyeck. \*)

Müller l. c. p. 729. no. 316. das weisse Dreyeck.

Fabric. S. E. p. 650. no. 30. *Pyralis Schreberiana*. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 282. no. 40.

317. *Logiana*, der Kohlenstaub.

Müller l. c. p. 730. no. 317. der Kohlenstaub.

Wiener Schmett. p. 130. E. Graue Blattwickler: no.

4. Unbekannte Raupe; graulichweisser Blattwickler mit düsterer Außenrandmakel. T. *Logiana* L.

Fabric. S. E. p. 651. no. 34. *Pyralis Logiana*. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 283. no. 45.

Clerk Phal. t. 10. f. 3.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 470. T. *Logiana*.

— Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1515. T. *Logiana*. Nom. Linn.

318. *Gouana*, der Schneeflügel. \*\*)

Müller l. c. p. 730. no. 318. das Braunfutter.

Fabric. S. E. p. 651. no. 35. *Pyralis Gouana*. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 283. no. 46.

319. *Brunnichana*, der Rhombus. \*\*\*)

Müller l. c. p. 730. no. 319. das Viereck.

Wiener Schmett. p. 132. F. Düstere Blattwickler:

no. 2. Unbekannte Raupe; schwärzlichter Wickler mit weislichter Gemeinmakel. T. *Brunnichana* L.

B 3

Fabric.

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

\*\*\*) Nicht abgebildet.

*Fabric.* S. E. p. 649. no. 21. *Pyralis Brunnichana.* Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 281. no. 30.

320. *Pariana*, die *bleyfahle Binde.*

*Müller* l. c. p. 730. no. 320. die *Bleybinde.*

*Wiener Schmett.* p. 132. F. *Düftere* Blättwickler: no. 8. *Unbekannte Raupe; düfterer Wickler mit gezähnten Oberflügeln.* T. *Pariana* L.

*Clerk* *Phal.* t. 10. f. 9.

321. *Moderiana*, der *braune Randfleck.* \*)

*Müller* l. c. p. 730. no. 321. der *Randfleck.*

*Linn.* S. N. ed. 10. p. 823. *Phal. Rurinana.*

*Fabric.* S. E. p. 650. no. 29. *Pyralis Moderiana.* Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 282. no. 39.

*Mülleri* *Zool. Dan. Pr.* p. 130. no. 1516. T. *Moderiana.* Nom. *Linn.*

322. *Uddmanniana*, der *Querfleck.* \*\*)

*Müller* l. c. p. 730. no. 322. der *Querfleck.*

*Wiener Schmett.* p. 130. E. *Graue* Blättwickler: no. 8. *Himbeerwickelraupe* (*Rubi idaei*); *Himbeerwickler.* T. *Uddmanniana* L.

*Fabric.* S. E. p. 648. no. 16. *Pyralis Uddmanniana.* Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 279. no. 22.

323. *Cruciana*, der *Bogenfleck.* \*\*\*)

*Müller* l. c. p. 731. no. 323. der *Bogenfleck.*

*Fabric.*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

\*\*\*) Nicht abgebildet.



Fabric. S. E. p. 649. no. 19. *Pyralis Cruciana*.  
Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 280. no. 26.

324. *Fabriciana*, das *Punkt-paar*.\*)

Müller l. c. p. 731. no. 324. das *Punkt-paar*.

Fabric. S. E. p. 653. no. 45. *Pyralis Fabriciana*.  
Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 286. no. 62.

325. *Pupillana*, das *Silberauge*. \*\*)

Müller l. c. p. 731. no. 325. das *Silberauge*.

326. *Heracliana*, der *Kronenwickler*.

Müller l. c. p. 731. no. 326. der *Kronenwickler*.

Fabric. S. E. p. 655. no. 56. *Pyralis Heracliana*.  
Alis depressis, griseis; anticis subtus fuscis.

— Spec. Inf. II. p. 288. no. 77.

Schaeff. Monogr. 1758. t. 2. f. 3. 4.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1517. T. *Heracliana*.  
Nom. Linn.

Degeer Inf. I. t. 29. f. 6. 7.

— II. Part. I. p. 407. no. 5.

*Phalène* à antennes filiformes, à trompe, à ailes croisées avec plusieurs petits traits noirs, dont les barbillons en cornes & les pattes postérieures sont très-velues.

*Phalène* à ailes croisées de la Berce.

— Uebersf. II B. I Th. p. 294. no. 5. die *Bärenklauphaläne* mit gekreuzten Flügeln.

Unabgebildete Linnéische Blattwickler.

1. *Fasciana*.

2. *Literana*.

3. *Hartmanniana*.

B 4

4. Ro-

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

4. *Rolandriana.*
5. *Wahlborniana.*
6. *Schalleriana.*
7. *Schraeberiana.*
8. *Gouana.*
9. *Brunnichana.*
10. *Moderiana.*
11. *Uddmanniana.*
12. *Cruciana.*
13. *Fabriciana.*
14. *Papillana.*

*Neue Arten von Blattwicklern.*

1. Phal. Tortr. *Populana*, der *Pappelwickler*.

*Linn. Faun. Suec. ed. 2. Sepos. p. 550. no. 2296.*

*Phalaena feticornis spirilinguis; corniculis duobus subulatis recurvis, alis incumbentibus, nigro cinereoque nebulosis.*

Habitat in truncis *Populi tremulae* cujus foliis Larva victitat, eaque convolvit.

*Syst. Natur. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 79. Phalène sur les troncs du Peuplier.*

2. *Bankiana*, der *Eulenförmige Wickler*.

*Fabric. S. E. p. 644. no. 1. Pylalis Bankiana.*

Alis albis, macula communi fusca.

Habitat in *Anglia*. Statura fere *Noctuae*.

3. *Hattorfiana*, der *Hattorfwickler*.

*Fabric. S. E. p. 647. no. 8. P. Hattorfiana.*

Alis fuscis; strigis cinereis, sesquitertiis.

Habitat in *Germania*.

— *Spec. Inf. II. p. 278. no. 10.*

4. *Decussana*, der *Leipziger Wickler*.*Fabric*. S. E. p. 647. no. 10. P. *Decussana*.

Alis cinereo, nigro argenteoque tenuissime fasciatis; apice macula subocellari cinerea.

Habitat *Lipsiae*.— *Spec. Inf. II.* p. 278. no. 14.5. *Maculana*, der *vierfleckige Wickler*.*Fabric*. S. E. p. 647. no. 12. P. *Maculina*.

Alis anticis fuscis; maculis quatuor dorsalibus atro-ferrugineis.

In *Sueciae Nemoribus*.— *Spec. Inf. II.* p. 279. no. 16,6. *Fuscana*, der *Braunling*.*Fabric*. S. E. p. 648. no. 13. P. *Fuscana*.

Alis anticis fuscis, immaculatis.

— *Spec. Inf. II.* p. 279. no. 17.*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 345. no. 1321. Ph. T. *fuscana*.

Alis superioribus fuscis.

In *Nemoribus*.*Clerk* Phal. t. 2. f. 1. Ph. *Fuscana*.7. *Laetana*, der *Schwarzpunkt*.*Fabric*. S. E. p. 649. no. 20.

Alis anticis fuscescentibus; margine exteriori baseos niveo, nigro punctato.

In *Sueciae Nemoribus*.— *Spec. Inf. II.* p. 281. no. 29.8. *Squamana*, der *Schuppenwickler*.*Fabric*. S. E. p. 651. no. 36.

Alis virescentibus, scabris.

In *Anglia*.

*Fabric.* Spec. Inf. II. p. 284. no. 50.

9. *Emargana*, der *Dickrand*.

*Fabric.* S. E. p. 651. no. 37.

Alis subcaudatis, flavis, fusco-reticulatis, fasciaque lata fusca, margine crassiori emarginato.

In *Anglia*.

— Spec. Inf. II. p. 284. no. 52.

10. *Caudana*, der *Schwanzwickler*.

*Fabric.* S. E. p. 651. no. 38.

Alis subcaudatis griseis; margine interiore fulvo; exteriore emarginato.

In *Anglia*.

— Spec. Inf. II. p. 284. no. 53.

11. *Quercana*, der *sächsische Eichenwickler*.

*Fabric.* S. E. p. 652. no. 39.

Alis anticis flavis; maculis duabus costalibus sulphureis.

In *Saxoniae* *Quercu*.

*Wiener Schmett.* p. 128. C. *Gelbe Blattwickler*: no.

13. T. *Fagana*, *Büchenwickler*. Tab. I. a. f. 6.  
b. f. 6.

12. *Ocellana*, der *geäugte Wickler*.

*Fabric.* S. E. p. 652. no. 40.

Alis cinereis; litura media sanguinea; puncto albido.

In *Anglia*.

— Spec. Inf. II. p. 285. no. 56.

13. *Comwagana*, der *Silberpunkt*.

*Fabric.* S. E. p. 653. no. 46.

Alis ferrugineo-fuscis, argenteo-punctatis  
maculaque dorsali flavicante.

In *Angliae* Nemoribus.

*Fabric.* Spec. Inf. II. p. 286. no. 63.

14. *Aurana*, der *Goldfleck*.

*Fabric.* S. E. p. 653. no. 48.

Alis fuscis; maculis duabus aureis.

In *Anglia*.

— Spec. Inf. II. p. 286. no. 66.

15. *Rivellana*, die *Spaltstreife*.

*Fabric.* S. E. p. 654. no. 50.

Alis fuscis; fasciis tribus cinereis; secunda in-  
trorsum bifida.

In *Sueciae* Nemoribus.

— Spec. Inf. II. p. 287. no. 69.

16. *Dorsana*, der *Rückenbogen*.

*Fabric.* S. E. p. 654. no. 52.

Alis fuscis, arcu dorsali albo apiceque strigis  
argenteis.

In *Lipsiae hortis*.

— Spec. Inf. II. p. 287. no. 71.

*Geoffr.* Inf. II. p. 189. no. 16.

*Tinea* alis nigris, superioribus macula qua-  
drata alba, ex quatuor lineolis albis transversis  
composita.

La *Teigne à quarrure*.

Long.  $2\frac{1}{2}$  Lign.

17. *Strigana*, der *Rost- und Silberfarbig gestreifte*  
*Wickler*.

*Fabric.* S. E. p. 654. no. 53.

Alis flavescens, apice strigis ferrugineis argenteisque; puncto triplici atro.

In *Sueciae Nemoribus.*

— *Spec. Inf. II.* p. 287. no. 72.

18. *Depressana*, der *Hängeflügel.*

*Fabric. S. E.* p. 655. no. 57.

Alis depressis, fuscis, capite, thoraceque niveis.

Habitat in *Suecia.*

— *Spec. Inf. II.* p. 289. no. 78.

19. *Koenigiana*, der *ostindianische braungefläubte Wickler.*

*Fabric. S. E.* p. 653. no. 47.

Alis fulvis, apice nigris, fulvo-maculatis.

— *Spec. Inf. II.* p. 286. no. 65.

20. *Leeana*, der *Bleywickler.*

*Fabric. Gen. Inf. c. Mantiff.* p. 292. no. 7-8.

*Pyralis* alis plumbeis; lineolis tribus maculae magna apicis ferrugineis.

— *Spec. Inf. II.* p. 278. no. 9. *Pyralis Plumbeana.* Habitat *Hamburgi.*

21. *Pallidana*, der *bläßgelbe Wickler.*

*Fabric. Mantiff.* p. 292. no. 9-10.

Alis pallide flavis; strigis duabus obliquis ferrugineis.

— *Spec. Inf. II.* p. 278. no. 12.

Habitat *Hamburgi.*

22. *Servana*, der *Zentralfleck.*

*Fabric. Mantiff.* p. 292. no. 15-16.

Alis anticis fuscescentibus; macula centrali fulva, basi flavis.

- Spec. Inf. II. p. 279. no. 21.  
In *Germania.*

23. *Asperana*, der *Rauhflügel.*

*Fabric.* Mantiff. p. 292. no. 35-36.

Alis anticis, basi albis, apice fuscis *scabris.*

- Spec. Inf. II. p. 284. no. 48.  
Habitat *Hamburgi.*

24. *Duplana*, der *Doppelpunkt.*

*Fabric.* Mant. p. 293. no. 35-36.

Alis anticis pallidis; punctis duobus approximatis baseos nigris.

- Spec. Inf. II. p. 284. no. 49.  
Habitat *Kiliae.*

25. *Schestediana*, der *Schwarzflügel.*

*Fabric.* Mant. p. 293. no. 47-48.

Alis atris; macula magna communi, strigis atomisque coerulescenti argenteis.

- Spec. Inf. II. p. 286. no. 64.  
Habitat *Kiliae* in *Alnetis.*

26. *Schulziana*, der *Silberpunkt.*

*Fabric.* Mant. p. 293. no. 49-50.

Alis testaceis fasciis punctisque argenteis, medioque litura atra.

- Spec. Inf. II. p. 287. no. 68.  
In *Germania.*

27. *Lundana*, die *Goldspitze.*

*Fabric.* Mant. p. 294. no. 53-54.

30 *Lepidoptera. 233. Phalaena Tortrix.*

Alis basi fuscis linea semicirculari pallida,  
*apice auratis*; margine crassiori nigro pallido-  
que striato.

— Spec. Inf. II. p. 287. no. 73.

In *Kiliae Quercu.*

28. *Applana, der dreyfache Mittelpunkt.*

*Fabric. Mant. p. 294. no. 56-57.*

Alis depressis fuscis; punctis tribus centrali-  
bus albis.

— Spec. Inf. II. p. 288. no. 76.

Habitat *Kiloniae.*

29. *Bankiana, der englische Waldwickler.*

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 275. no. 1.*

Alis fuscis, fasciis duabus niveis, posteriore  
unidentata.

In *Angliae Sylvis.*

30. *Smeathmannia, die abgebrochene Binde.*

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 278. no. 13.*

Alis exalbidis, fasciis duabus obliquis fuscis,  
antere abbreviata, posteriore interrupta.

In *Anglia.*

31. *Forsterana, der doppelte Randfleck.*

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 279. no. 18.*

Alis anticis obscure cinereis, maculis duabus  
marginalibus fuscis.

In *Angliae Nemoribus.*

32. *Stroemiana, der doppelte Rückenfleck.*

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 280. no. 24.*

Alis fuscis, maculis duabus dorsalibus cine-  
reis.



In *Germania.*

33. *Cinerana*, der *Afchwickler.*

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 281. no. 27.*

Alis exalbido cinereis immaculatis, capite fulvo.

In *Germania.*

34. *Obliquana*, die *Schrägstreife.*

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 281. no. 28.*

Alis cinereis, fasciis obliquis fulvis, albo-marginatis.

In *Anglia.*

35. *Fasciana*, die *Braunbinde.*

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 282. no. 35.*

Alis anticis obscure cinereis, fascia media lituræ apicis fuscis.

In *Angliæ hortis.*

36. *Ilicana*, der *Schwarze Mittelpunkt.*

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 283. no. 44.*

Alis anticis fusco-cinereis, punctis fuscis, centrali solitario atro.

In *Angliæ hortis.*

37. *Turnbergiana*, der *Schwarze Vierpunkt.*

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 284. no. 47.*

Alis anticis cinereis, punctis quatuor elevato-fasciculatis atris.

In *Germania.*

38. *Scabrana*, der *Höckerflügel.*

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 284. no. 54.*

Alis anticis cinereis fusco subfasciatis scabris, margine exteriori postice exciso.

In *Angliae Quercu*.

39. *Teatiana*, der vierfache schwarze Randpunkt.

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 286. no. 60.*

Alis anticis griseis, macula punctisque duobus centralibus nigris.

In *Angliae Nemoribus*.

40. *Bicolorana*, der Weißgrünwickler. \*)

*Füesl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 798. der Weißgrünwickler.*

*Röfels Infektenbel. IV. p. 73. t. 10. die glatte, grüne, mit einer kleinen Rückenwarze versehene, auf dem Eichenlaub lebende Raupe, mit ihrem besonders schönen grünen Papilion.*

*Wiener Schmett. p. 125. A. Grüne Blattwickler: no. 1. Eichenwicklerraupe (Quercus Roboris); Eichenwickler. T. Quercana.*

*Degeer Inf. Tom. I. Mém. 2. p. 58. t. 3. f. 1.*

— *Tom. II. P. I. p. 410. no. 1.*

*Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabattues en toit, dont les supérieures sont vertes à deux lignes obliques jaunâtres, & les inférieures blanches.*

*Phalène verte bilinaire.*

— *Uebers. II B. I Th. p. 296. no. 1. die grüne zweylinichte Phaläne.*

*Geoffr. Inf. II. p. 172. no. 124.*

*Phalaena feticornis spirilinguis, humeris latis, alis viridibus, linea duplici transversa albida.*

*La Chappe verte à bande.*

*Long. 9 Lign.*

*Réaum. Inf. I. t. 39. f. 10-14.*

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 276. no. 4. Pyralis prasinana.*

Alis

\*) Vergl. mit *Prasinana* L. no. 285. welche *Fabric. Spec. Inf. II. p. 276. no. 5. Fagana* nennet,

Alis anticis viridibus, strigis duabus obliquis flavicantibus, posticis albis.

Habitat in *Alno*, *Quercu* Europae.

*Larva* viridis, linea laterali flavicante, segmento secundo dorsi tuberculato.

*Pupa* viridis, linea dorsali atra.

41. *Podana*, der *Okergelbe Wickler*.

*Scop.* Ent. carn. p. 232. no. 583.

Alae ochraceae; anticae cinnamomeae; atomis strigaeque media fuscescentibus, apice caudatis.

In *Rhododendro ferrugin.*

*Long.* lin.  $5\frac{1}{2}$ . *Lat.* 3.

42. *Rubiana*, der *Strauchwickler*.

*Scop.* Ent. carn. p. 233. no. 585.

Alae fuscescentes; anticae supra cinerascens; macula communi postica subovata brunea, macula apicis punctisque tribus posticis crassiori margini impositis bruneis.

*Long.* lin.  $4\frac{1}{4}$ . *Lat.*  $2\frac{1}{3}$ .

An *Viduana Mülleri*? *Zool. Dan. Pr.* p. 132. no. 1523.

Alis albo-cinereis, fasciis obliquis, maculaeque marginali nigro punctata griseis.

43. *Fasciana*, die *Weißbinde*.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 342. no. 1304.

Alis fusco-cinerascens; fascia alba.

In *Pomariis*.

*Stop.* Ent. carn. p. 233. no. 586.

Alae anticae supra fusco glaucoque variae; fascia lata albida postica.

*Long.* lin. 4. *Lat.*  $2\frac{1}{3}$ .

34. *Lepidoptera*. 233. *Phalaena Tortrix*.

44. *Cervana*, der *Hirschhornfarbige Wickler*.

*Scop.* Ent. carn. p. 234. no. 588.

Alae anticae *cervinae*; limbo ferrugineo et fusco-punctato; fascia fuscescente punctisque (3-4) glaucis variegata.

In *Ericetis*.

Long. lin. 5. Lat.  $2\frac{1}{2}$ .

45. *Lambergiana*, der *Rindenfarbige Wickler*.

*Scop.* Entom. carn. p. 234. no. 589.

Alae anticae *corticinae*; strigis transversis punctisque quatuor plumbeis.

Circa *Idriam*.

Long. lin. 4. Lat.  $2\frac{1}{4}$ .

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1522. T. *Lambergiana*.

Alis nigricantibus maculis obscuris plumbeis.

46. *Wulfeniana*, der *Schwärzling*.

*Scop.* Ent. carn. p. 235. no. 590.

*Nigricans*, alis anticis plumbeo-punctatis; subtus puncto albo, quo posticae utrinque notatae.

Long. lin. 3. Lat.  $1\frac{1}{2}$ .

Circa *Idriam*.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 132. no. 1521. T.

*Wulfeniana*.

Alis nigricantibus; anticis punctis argenteis; posticis litura utrinque nivea.

47. *Rufana*, der *Fuchs*.

*Scop.* Ent. carn. p. 235. no. 591.

Alae anticae ferrugineae, glauco-punctatae.

In *Salicetis*.

Long.  $4\frac{1}{2}$ . Lat.  $2\frac{2}{3}$ .

48. *Plum-*

48. *Plumbana*, der *Bleystrich*.

*Scop.* Ent. carn. p. 235. no. 592.

Alae anticae basi fuscescentes; posticae ferrugineae, *lituris transversis hamatis plumbeis*, punctisque (2 - 3) nigris marginalibus ad angulum posticum.

In *Herbidis*.

Long. lin.  $4\frac{1}{2}$ . Lat.  $2\frac{1}{3}$ .

49. *Rusticana*, der *Landmann*.

*Scop.* Ent. carn. p. 236. no. 593.

Alae anticae canescentes; maculis obsoletis fasciaque pallide caesatis.

Circa *Tuguria et possessiones Rusticorum*.

Long. 4 lin. Lat. 2.

50. *Miscellana*, der *Mischling*.

*Scop.* Ent. carn. p. 236. no. 594.

Alae anticae cervinae fusco-punctatae; strigis transversis interruptis plumbeis, fasciaque media fuscescente, plumbeo puncto notata.

In *Nemoribus, hortis, pomariis*, Majo.

Long. lin. 4. Lat. 2.

51. *Montana*, der *Bergmann*.

*Scop.* Ent. carn. p. 236. no. 595.

Alae anticae fuscae, macula communi media margineque crassiore postice ferrugineis, strigis binis posticis obliquis fimbriaque plumbeis.

In *montanis Carnioliae*.

Long. lin. 3. Lat.  $\frac{1}{2}$ .

*Wien. Schmett.* p. 127. B. *Metallichte Blattwickler*: no. 14. *Unbekannte Raupe; schwärzlicher Wickler*, mit gelber Gemeinmakel, und silbernem Unterrande. T. *Montana Scop.*

52. *Cana*, der *kleine Esel*.

*Scop.* Ent. carn. p. 236. no. 596.

Alae anticae canescentes; fronte atomisque cervinis.

Inter *Corylos*.

Long. lin. 6. Lat. 3.

53. *Pedana*, der *Nebelflügel*.

*Scop.* Ent. carn. p. 237. no. 597.

Alae anticae cinereo-fuscoque nebulosae, apice strigis obliquis ferrugineis.

Inter *frutices*.

Long. lin. 5. Lat. 2½.

54. *Umbriana*, der *Nachtschatten*.

*Scop.* Ent. carn. p. 237. no. 598.

Umbrina; alis anticis cinereis, fascia punctisque marginalibus fuscescentibus.

In *Pratis*.

Long. lin. 4. Lat. 2.

55. *Formosana*, der *Obstfreund*.

*Scop.* Ent. carn. p. 237. no. 599.

Alae anticae nigro-corticinoque variae, strigis tribus submarginalibus obliquis plumbeis, punctisque albis marginalibus.

Circa *Idriam*, in *Pomariis*.

Long. lin. 4. Lat. 2.

56. *Rivulana*, die *Bachlinie*.

*Scop.* Ent. carn. p. 237. no. 600.

Alae anticae murinae; fascia rivulisque posticis, albidis.

In *Sylvis*.

Long. lin. 4. Lat. 2.

Wien. Schmett. p. 131. E. Graue Blattwickler: no. 21. Unbekannte Raupe; grauer Wickler mit düstern Schrägstreifen. T. Rivulana Scop.

57. *Gramineana*, der *Grasling*.

Scop. Ent. carn. p. 238. no. 601.

Alae anticae atomis fasciisque binis obsoletis fufcescentibus.

In herbidis collibus.

Long. lin.  $3\frac{1}{2}$ . Lat.  $1\frac{3}{4}$ .

58. *Capillitiana*, der *Buschkopf*.

Scop. Ent. carn. p. 238. no. 602.

Alae anticae subferrugineae; punctis marginalibus capite palpisque albidis.

In Sylvestribus locis.

Long. lin. 4. Lat. 2.

59. *Osseana*, der *Beinfarbige Wickler*.

Scop. Ent. carn. p. 238. no. 603.

Alae anticae osseae; atomis fuscis, punctoque apicis fufcescente.

In Herbidis.

Long. lin.  $3\frac{1}{2}$ . Lat.  $1\frac{1}{2}$ .

60. *Pyraliana*, der *Lichtfalterartige Wickler*.

Scop. Ent. carn. p. 238. no. 604.

Alae anticae ferrugineae; limbo obscuriore, fasciisque binis fuscis.

In Sylvis.

Long. lin. 3. Lat.  $1\frac{1}{2}$ .

61. *Revoyana*, der *Krummrand*.

Scop. Ann. hist. nat. 5. p. 116. no. 130.

Alis superioribus glauco-virentibus, margine  
exteriore notabiliter curvo.

Circa *Schemnitz*.

Alae anticae *Longit.* lin. 4-5.

Comes Petr. *Reyay de Reva*.

62. *Schiffermulleriana*, der *Schiffermüller'sche Wickler*.

*Scop.* Ann. hist. nat. 5. p. 117. no. 131.

Parva; alis cinereo-murinoque variis.

In *hortis Schemnitzensibus*.

Alae anticae *Long.* lin. 3-4.

63. *Hoehenwartiana*, der *Hoehenwartische Wickler*.

*Scop.* Ann. hist. nat. 5. p. 117. no. 132.

Alis anticis fuscis, macula magna, lunata,  
communi, media.

*Schemnitzii* in *hortis et pratis*.

Alae anticae *Long.* lin. 5-6.

64. *Cruciana*, das *Rostkreuz*.

*Scop.* Ann. hist. nat. 5. p. 118. no. 133.

Alae anticae flavae; singula cruce ferruginea.

Circa *Schemnitz* in *pratis*.

Alae anticae *Long.* lin. 4-5.

65. *Cingulana*, der *Gürtelwickler*.

*Scop.* Ann. hist. nat. 5. p. 118. no. 134.

Parva; murina; fascia alba supra basin.

*Schemnitzii* in *pratis*.

Alae anticae *Longit.* lin. 3-4.

66. *Miana*, der *Silberflügel*.

*Mülleri* *Faun. Fridr.* p. 53. no. 472.



Alis omnibus argenteis superioribus limbo fusco; lineaque undulata argentea.

In *Horto*.

— Zool. Dan. Prodr. p. 131. no. 1518.

67. *Koenigiana*, der *Grauflügel*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 53. no. 473.

Alis omnibus griseis politis; inferioribus strigata undulata.

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1519.

In *Arvis*.

68. *Albana*, der *Weißling*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 53. no. 474.

Alis omnibus albis; inferioribus apice fascia fusca.

In *Arundineto*.

— Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1520.

69. *Penniferana*, der *Federträger*.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1527.

Alis sexpennibus cinereis, fasciis duabus punctisque marginalibus nigris.

*Frisch* Inf. III. p. 20. no. 10. t. 7. der 3ten Platte. f. 1-5.

Das kleine *Kaprifoliumblüträuplein* mit seinem Zwiefalter.

70. *Aureana*, der *Goldrand*.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1528.

Alis omnibus utrinque fuscis, margineque postico latiusculo, aureo.

71. *Miniana*, der *Röthling*.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1525.

Alis superioribus miniatis; nodulo disci candido, triangulo marginali rufo.

72. *Circulana*, der *Zirkehwickler*.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1526.

Alis fulvescentibus; macula dorsali communi ferruginea, striga alba cincta.

73. *Graminana*, der *Graswickler*.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1529.

Alis omnibus utrinque cinereo-fuscis; basi maculis, disco lineis, altera bifida, altera curvata, transversis, albis.

74. *Olivana*, *Olivengrüner Wickler mit 2 silbernen Schrägestreifen*.

*Wien. Schmett.* p. 126. B. *Metallische Blattwickler*; no. 1. *Unbek. R.*

75. *Pilleriana*, *goldner W. mit 2 braunen Schrägestreifen*.

*Wien. Schmett.* p. 126. B. no. 2. *Unbekannte R.*

76. *Baumanniana*, *gelber Oranienstreifiger W. mit Silberstrichen*.

*Wiener Schmett.* p. 126. B. no. 6. *Unbek. R.*

77. *Tesserana*, *gelber rothfleckichter W. mit Silberstrichen*.

*Wien. Schmett.* p. 126. B. no. 7. *Unbek. R.*

*Geoffr. Inf.* II. p. 186. no. 10.

*Tinea aurata*, alis superioribus cruce decussata fusco-rubra.

*La Teigne à croix de saint André.*

*Long.* 2 $\frac{3}{4}$  lign.

78. *Badiana*, graugelber, rothbraunfleckichter *W.* mit Silberstrichen.

Wien. Schmett. p. 126. no. 8. Unbek. R.

79. *Woeberiana*, brauner *W.* mit Rothgold und Silber gezeichnet.

Wien. Schmett. p. 126. no. 9. Unbek. R.

80. *Penkleriana*, grau- und gelbgemischter *W.* mit Silberstreifen.

Wien. Schmett. p. 126. no. 12. Unbek. R.

81. *Lunulana*, braunschwarzer *W.* mit einem weißen Gemeinmonde und matten Silberstrichen.

Wien. Schmett. p. 127. B. no. 15. Unbek. R.

82. *Micana*, graubräunlichter und schwarzgemischter *W.* mit Silbersprecken.

Wien. Schmett. p. 127. B. no. 17. Unbek. R.

83. *Argentana*, ganz silberglänzender *W.*

Wien. Schmett. p. 127. B. no. 18. Unbek. R.

84. *Suttneriana*, bleichgelber *W.* mit einem Mittelpunkt.

Wien. Schmett. p. 127. C. Gelbe Blattw. no. 2. Unbek. R.

85. *Costana*, Ledergelber *W.* mit zwey braunen Außenrandmakeln.

Wien. Schmett. p. 127. C. no. 5. Unbek. R.

86. *Mediana*, Okergelber und braungezeichneter *W.*

Wien. Schmett. p. 128. C. Unbek. R.

42 *Lepidoptera*. 233. *Phalaena Tortrix*.

87. *Viburnana*, *Mehlbaumwickler*.

*Wien. Schmett.* p. 128. C. no. 15. *Mehlbaumwickler*  
*lerraupe (Viburni Lantanae)*.

88. *Buoliana*, *Oranienfarbener Silberweißgeitterter W.*

*Wien. Schmett.* p. 128. C. no. 16. *Unbek. R.*

89. *Ferrugana*, *Rostbrauner Wickler*.

*Wien. Schmett.* p. 128. D. *Braune Blattwickler*:  
no. 1. *Unbek. R.*

90. *Heparana*, *Leberfarbiger W. mit dunklen Streifen*.

*Wien, Schmett.* p. 128. D. no. 3. *Unbek. R.*

*Geoffr. Inf.* II. p. 169. no. 118.

*Phalaena feticornis spirilinguis*, humeris latis, ferrugineo-fusca, fasciis tribus transversis saturatioribus.

*La Chappe brune.*

*Long.* 4 lign.

*Degeer Inf.* Tom. I. *Mém.* 13. p. 409. 410. t. 27.  
f. 9. 10.

— II. Part. I. p. 468. no. 2.

*Phalène* à antennes filiformes à trompe, à ailes larges d'un brun de Café, à bande oblique obscure, à barbillons droits & allongés.

*Phalène chappe brune du Lilas.*

— *Ueberf.* II B. I Th. p. 345. no. 2. *die braune Mantelphaläne auf den Fliedern.*

*Hellgrüne sechzehnfüßige Raupe mit grünem Kopfe.*

91. *Fulvana*, *Specklilienwickler*.

*Wien.*

- Wien. Schmett. p. 128. D. no. 6. Specklilienwickler-  
raupe (Lonicerae Periclymeni).*
92. *Rhombana, gelbbrauner W. mit zwey düstern  
Flecken.*  
*Wien. Schmett. p. 128. D. no. 7. Unbek. R.*
93. *Rufana, gelbröthlicher W. mit düsterer Außen-  
randmakel.*  
*Wien. Schmett. p. 129. D. no. 8. Unbek. R.*
94. *Lipstana, Leberbrauner W. mit weißen Mittel-  
punkten.*  
*Wien. Schmett. p. 129. D. no. 9. Unbek. R.*
95. *Cristana, dunkelbrauner W. mit weißem Innen-  
rande.*  
*Wien. Schmett. p. 129. D. no. 10. Unbek. R.*
96. *Scopoliana, Caffebrauner W. mit 2 weißglänzen-  
den Bogenflächen.*  
*Wien. Schmett. p. 129. D. no. 11. Unbek. R.*
97. *Laevigana, hellbrauner W. mit dunkler Mitte.*  
*Wiener Schmett. p. 129. D. no. 12. Unbek. R.*
98. *Puffilana, rothbrauner W. mit weißgestricheltem  
Außenrande.*  
*Wien. Schmett. p. 129. D. no. 13. Unbek. R.*
99. *Striana, bräunlicher W. mit düstern Streifen.*  
*Wien. Schmett. p. 129. D. no. 14. Unbek. R.*
100. *Hohenwartiana, graubrauner (auch goldgel-  
ber) W. mit silberfarbigen Untenrandhäkchen.*  
*Wien. Schmett. p. 129. D. no. 15. Unbek. R.*

101. *Politana*, glänzender goldbräunlicher *W.* ohne Makel.

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 16. Unbek. R.

102. *Mitterbacheriana*, Oraniengelb- und rothbrauner *W.* mit weißen Strichelchen.

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 17. Unbek. R.

103. *Tenerana*, weißlicht- und Zimmetbrauner *W.* mit feinen Punkten.

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 18. Unbek. R.

104. *Permixtana*, blaßbuntfarbiger *W.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 19. Unbek. R.

105. *Sparfana*, grauer röhlich gezeichneter *W.*

Wien. Schmett. p. 129. E. Graue Blattw. no. 1. Unbek. R.

106. *Succedana*, hellgrauer *W.* mit bräunlichten Punkten und weißen Strichelchen.

Wien. Schmett. p. 129. E. no. 2. Unbek. R.

107. *Cinctana*, weißer *W.* mit braunem Querbande und Flecken.

Wien. Schmett. p. 129. E. no. 3. Unbek. R.

108. *Dilutana*, röhlichweißer *W.* mit blaßfarbigen Flecken.

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 5. Unbek. R.

109. *Variiegana*, gelblichtweißer *W.* mit düsterer Innenrandmakel und buntem Untenrande.

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 6. Unbek. R.

110. *Ocellana*, weißlichter Wickler mit grauem Rücken und Innenwinkel.

Wien.

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 7. Unbek. R.

111. *Asperana*, grauer *W.* mit bunthökrichten Flügeln.

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 8. Unbek. R.

112. *Treueriana*, weißgrauhökrichter schwarzgefleckter (auch grünlichweißser) *W.*

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 10. Unbek. R.

113. *Pinana*, Fichtenwickler.

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 11. Fichtenwickler-raupe (*Pini Piceae* etc. *Clus.*).

114. *Scabrana*, grauer *W.* mit düstern Hökern des Rückenwinkels.

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 12. Unbek. R.

115. *Punctulana*, röthlichgrauer *W.* mit erhobenen schwarzen Punkten.

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 13. Unbek. R.

116. *Consersana*, Perlfarbener *W.* mit blaugrauen Punkten und Strichelchen.

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 14. Unbek. R.

117. *Strigulana*, Lichtgrauer dunkelspreckichter *W.*

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 15. Unbek. R.

118. *Steinkellneriana*, grauer *W.* mit schwarzem *S.*

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 16. Unbek. R.

119. *Revayana*, grauer *W.* mit rothem Mittelpunkt.

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 17. Unbek. R.

120. *Tumidana*, Lichtgrauer *W.* mit zwey röthlichen Schwulsten.

Wien.

46. *Lepidoptera.* 233. *Phalaena Tortrix.*

- Wien. Schmett.* p. 130. E. no. 18. *Unbek. R.*
121. *Undulana*, *grauer weislichtgeschlängelter W.*  
*Wien. Schmett.* p. 131. E. no. 22. *Unbek. R.*
122. *Stagnana*, *grauer lichtgewässerter W.*  
*Wien. Schmett.* p. 131. E. no. 23. *Unbek. R.*
123. *Comitana*, *dunkelgrauer weisgeschlängelter W.*  
*Wien. Schmett.* p. 131. E. no. 24. *Unbek. R.*
124. *Affectana*, *braungrauer weisgefleckter W.*  
*Wien. Schmett.* p. 131. E. no. 25. *Unbek. R.*
125. *Botrana*, *Weintraubenwickler.*  
*Wien. Schmett.* p. 131. E. no. 26. *Weintraubenwick-  
lerraupe (Botri).*
126. *Achatana*, *grauer W. mit rothbraunen Flecken.*  
*Wien. Schmett.* p. 131. E. no. 27. *Unbek. R.*
127. *Mygindiana*, *grauer, abwärts feuerrothgestrich-  
ter W.*  
*Wien. Schmett.* p. 131. E. no. 28. *Unbek. R.*
128. *Corticana*, *dunkelgrau und weisgefleckter W.*  
*Wien. Schmett.* p. 131. E. no. 29. *Unbek. R.*
129. *Scutulana*, *grauer W. mit zwei weislichen Flä-  
chen.*  
*Wien. Schmett.* p. 131. E. no. 30. *Unbek. R.*
130. *Linneana*, *weislichgrauer W. mit einem schwar-  
zen Mittelfrichelchen.*  
*Wien. Schmett.* p. 131. E. no. 31. *Unbek. R.*
131. *Similana*, *grauer W. mit zwei weislichen Flächen  
und gestrichtem Außenrande.*  
*Wien. Schmett.* p. 131. E. no. 32. *Unbek. R.*



132. *Sinuana*, Mäufefahler *W.* mit einer weissen Innenrandmakel.  
*Wien. Schmett.* p. 131. E. no. 33. Unbek. R.
133. *Roborana*, Eichenbuschwickler.  
*Wien. Schmett.* p. 131. E. no. 34. Eichenbuschwicklerraupe (*Quercus* Kob.)
134. *Tripunctana*, schwarzgrauer *W.* mit weissem Mittelraume und drey schwarzen Pünktchen.  
*Wiener Schmett.* p. 131. E. no. 35. Unbek. R.
135. *Profundana*, düstergemischter *W.* mit weislicher Gemeinmakel.  
*Wien. Schmett.* p. 132. F. düstere Blattwickler: no. 1. Unbek. R.
136. *Trauniana*, schwarzer *W.* mit hochgelber Gemeinmakel.  
*Wien. Schmett.* p. 132. F. no. 3. Unbek. R.
137. *Iacquiniana*, braunschwarzer *W.* mit bleichgelbem Gemeinbände.  
*Wien. Schmett.* p. 132. F. no. 4. Unbek. R.
138. *Furvana*, grauschwarzer *W.* mit lichtgezeichnetem Untenrande.  
*Wien. Schmett.* p. 132. F. no. 5. Unbek. R.
139. *Inundana*, mattschwarzer weislich gewässerter *W.* mit weissem Mittelpunkte.  
*Wien. Schmett.* p. 132. F. no. 6. Unbek. R.
140. *Urticana*, Nesselwickler.  
*Wien. Schmett.* p. 132. F. no. 7. Nesselwicklerraupe (*Urticae dioicae*).  
An *Degeer* Inf. II. Part. I. p. 470. no. 5.  
*Phalène Chappe à ailes béantes de l'Ortie?*  
— Tom. I. Mém. 13. p. 413. t. 28. f. 1. 2. 9. 10.  
— *Ueberf.* II B. I Th. p. 473. no. 5. die Mantelpha-

*phaläne auf den Nesseln mit aus einander stehenden Flügeln.*

141. *Alniana, Erlenwickler.*

*Wien. Schmett. p. 132. F. no. 8. Erlenwicklerraupe (Betulae Alni).*

142. *Fuligana, ganz düsterer Wickler.*

*Wien. Schmett. p. 132. F. no. 9. Unbek. R.*

143. *Literana, hochgrüner schwarzgezeichneter W.*

*Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. A. no. 5. Unbek. R.*

144. *Decimana, gelber kreuzmaklichter W. mit Silberstrichen.*

*Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. B. Unbek. R.*

145. *Trigonana, Dottergelber W. mit bräunlichem Dreyecke.*

*Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. C. Unbek. R.*

146. *Steineriana, Skorpionsfennenwickler.*

*Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. C. Skorpionsfennenwicklerraupe (Coronillae Emeri).*

147. *Hermanniana, Brombeerwickler.*

*Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. D. Brombeerwicklerraupe (Rubi fruticosi).*

148. *Pasquayana, Elfebeerwickler.*

*Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. D. Elfebeerwicklerraupe (Crataegi torminalis).*

149. *Helvolana, Weißwurzwickler.*

*Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. D. Weißwurzwicklerraupe (Convallariae Polygonati).*

150. *Gerningana, goldbrauner schwarzrothstreifichter W.*

*Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. D. Unbek. R.*

151. *Campoliliana*, weißer, braun- und gelbsprenklicher W.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. E. Unbek. R.

152. *Fluidana*, weißer, braunwellenstreifichter W.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. Unbek. R.

153. *Lacunana*, bleichgrauer braunmaklichter W.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. Unbek. R.

154. *Salviana*, Salbeywickler.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. F. Salbeywickler-  
raupe (*Salviae pratensis*).

155. *Merianana*, der hohe Brustschildwickler.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 470. no. 6. t. 9.  
f. 16. 19.

*Phalène* à antennes filiformes, à trompe, à corcelet huppé, à ailes larges d'un brun verdâtre avec deux cercles ovales & trois lignes transverses grises.

*Phalène chappe à corcelet à arrête.*

*Chenilles* raies vertes à points blancs & à cinq rayes longitudinales blanches, dont celle du milieu est large.

— De *grandeur mediocre.*

— Ueberf. II B. I Th. p. 473. no. 6. t. 9. f. 16. 19.

*Die Mantelphaläne mit einem kantigen Brustschild.*

*Merian. Inf. Eur. t. 87.*

156. *Mumetes*, der Sichelflügel.

Cramer Pap. exot. I. p. 128. t. 82. Fig. A. *Surin.*

*Alis furvis; anticis falcatis flavo-lineatis.*

157. *Marriana*, das braune Dreyeck.*Cramer* Pap. exot. IV. p. 113. t. 348. Fig. F.Alis *anticis* sinuosis variegatis; maculis fuscis triangularibus; *posticis* luteis.158. *Renselariana*, das gelbe Bächlein.*Cramer* Pap. exot. IV. p. 114. t. 348. Fig. H.Alis *anticis* flavo-rivulatis; maculis quatuor fulvis; *posticis* fusco-canis.159. *Crameriana*, der Buckelflügel.*Cramer* Pap. exot. IV. p. 114. t. 348. Fig. I.Alis *anticis* gibbosis, margine rutilantibus, medio bilineatis; *posticis* fusco-canis.160. *Seppiana*, der fleischfarbige Wickler.*Cramer* Pap. exot. IV. p. 135. t. 359. Fig. H.Alis concoloribus *incarnatis*; *anticis* margine exteriori fusco-maculato.161. *Holthufiana*, der Pommeranzenrand.*Cramer* Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. H.Alis flavicantibus; *anticis* marginibus rutilantibus nigroque punctatis; *posticis* margine aurantiaco.162. *Meyeriana*, der Flimmerrand.*Cramer* Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. K.

Incarnata; marginibus nigro-ciliatis.

163. *Gladbaghiana*, das Doppelstäbchen.*Cramer* Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. L.Alis *anticis* rubro-variegatis; *binis* flavo-rubroque bacillis.

164. *Demarriana*, der *Schneeflügel*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. M.

*Nivea*; anticis rivulis transversis flavis sinuosis.

165. *Fuesliniana*, der *Röthling*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 163. t. 372. Fig. E.

*Rutilans*; atro-punctata.

166. *Albertiana*, die *gelbweiße Neune*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 163. t. 372. Fig. H.

*Furva*; alis anticis binis numeris 9 flavo-albis.

167. *Burmanniana*, der *Mondrand*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. H.

*Lutescens*; margine anticarum atro-lunulato.

168. *Gerningiana*, der *Randpunkt*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. I.

*Testacea*; punctulis nigris marginalibus.

169. *Walchiana*, der *Weisrand*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 191. t. 384. Fig. F.

Alis olivaceo-micantibus, margine anteriore niveis.

170. *Thunbergiana*, der *Bräunling*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. H.

Alis anticis fuscis, brunneo-maculatis.

171. *Klemaniana*, der *Weispunkt*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. I.

Alis olivaceo-fuscis; albo-punctatis, posticis concoloribus brunneis.

172. *Esperiana*, der *Schwarzstrich*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. K.

Alis concoloribus, fusco-rubris, nigro-lit-ratis.

173. *Clerkiana*, der *weiße Dreyzack*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. M.

Alis anticis canescentibus, alba tripude marginali; posticis furvis, nigro-lineatis.

V. *Lichtmücken*, Pyralides. (*Zünster*, *Pinceurs*.)

327. *Farinalis*, die *Mehlmücke*.

*Müller* L. N. S. 5 Th. I B. p. 731. *Feuerwürmlein* p. 732. no. 327. der *Polirflügel*.

*Füesl.* Schweiz. Inf. p. 41. no. 808. Ph. *Pyralis*.

*Wien. Schmett.* p. 123. B. *Kurzschmauzige Zünster*, Ph. Pyr. *Brevipalpes*: no. 33. *Mehlzünster-raupe* (Farinae culinariae). Pyr. *Farinalis* Linn.

*Geoffr.* Inf. II. p. 167. no. 113.

*Phalaena seticornis spirilinguis triangularis*, alis superioribus fusco-purpureis; fascia transversa albido-ferruginea, abdomen supra protendens.

La *Phalène à ventre relevé*.

Long.  $4\frac{1}{2}$  Lign.

*Réaun.* Inf. II. t. 2. f. 4.

*Bekn.* Ep. S. L. p. 167. no. 327. Ph. Pyr. *Farinalis*.

*Blumenbachs* Handb. der N. G. p. 372. no. 18. Ph.

Pyr. *Farinalis*.

*Scop.* Entom. carn. p. 240. no. 608.

Alae anticae basi et limbo caryophyllinis, media parte pallide cervina, marginibus repandis albidis.

Long.  $5\frac{1}{2}$  lin.

*Poda* Mus. graec. p. 94.

*Schaeff.* Icon. t. 95. f. 8. 9.

*Fabric.* S. E. p. 641. *Phalaena* alis forficatis no. 112.

Ph. *Farinalis.*

Palpis recurvatis, alis politis, lutescentibus, strigis repandis albis, basi apiceque glaucis.

— *Spec. Inf.* p. 270. no. 169. Ph. *Farinalis.*

Sedens caudam erigit.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 54. no. 478. Pyr. *Farinalis.*

Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 132. no. 1530. Pyr. *Farinalis.*

N. L.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 112. t. 348. Fig. D. Pyr.

*Farinalis* *Linn.*

328. *Glaucinalis*, der Blauflügel.

*Müller* l. c. p. 732. no. 328. der *Glattflügel.*

*Wien. Schmett. A. Langschmawzichte Zünsler, P.*

*Longipalpes.* p. 120. no. 10. *Unbek. R. Gelblicher*

*Zünsler mit zwey Querstrichen. P. Glaucinalis*

*Linn.*

Die Querstriche kaum sichtbar.

*Fabric.* S. E. p. 641. no. 113. *Phalaena glaucinalis.*

Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* p. 270. no. 172. N. L.

*Clerk* Phal. t. 5. f. 4.

*Mülleri* Faun. Fr. p. 54. no. 479. Pyr. *glaucinalis.*

Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 132. no. 1531. Pyr. *glaucinalis.*

N. L.

329. *Barbalis*, der *Langbart*.

*Müller* l. c. p. 732. no. 329. der *Schenkelbart*.

*Friesl.* schweiz. Inf. p. 41. no. 809. *Ph. barbalis*.  
Selten.

*Pontopp.* N. G. v. D. p. 221. t. 17.

*Wien. Schmett.* p. 120. A. no. 9. *Kleezünsterraupe*  
(*Trifolii pratensis*); *Kleezünster*. *Pyr. barbalis*  
*Linn.*

*Raj.* Hist. Inf. p. 227. no. 103. *Phalaena parva*, alis  
latis, e fulvo utrinque albicantibus, nulla colorum  
diversitate.

*Scop.* Ent. carn. p. 239. no. 605. *Pyr. barbalis*.

Alae omnes utrinque cinerascens; atomis  
strigisque tribus. Antennae subpectinatae. Femora  
antica barbata.

Circa *Labacum*.

*Long.* lin.  $6\frac{3}{4}$ .

*Fabric.* S. E. p. 641. no. 114. *Phalaena barbalis*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* p. 271. no. 171. N. L.

*Clerk* Phal. t. 5. f. 3.

*Mülleri* Faun. Fr. p. 54. no. 476. *Pyr. barbalis*.  
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 133. no. 1532. N. L.

330. *Tentacularis*, der *Langfühler*.

*Müller* l. c. p. 732. no. 330. der *Langfühler*.

*Wien. Schmett.* p. 119. A. no. 2. *Butterblumzünsterraupe*  
(*Leontodontis Taraxaci*); *Butterblumzünster*.

*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 150. no. 32.

*Fabric.* S. E. p. 641. no. 115. *Phalaena tentacularis*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* p. 271. no. 172. N. L.



*Degeer* Inf. I. t. 5. f. 1.

— *Uebersf.* I. I Qu. p. 50. t. 5. f. 1.

— II. Part. I. p. 358. no. 12.

*Phalène* à antennes barbues, à trompe; à ailes horizontales d'un blanc sale avec deux lignes transverses d'un brun pâle, dont les barbillons de la tête égalent les antennes en longueur.

*Phalène* à très longs barbillons.

— *Uebersf.* II Th. I B. p. 260. no. 12. der *Langbart*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 54. no. 475. *Pyr. tentacularis*. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 133. no. 1533. *Pyr. tentacularis*. N. L.

331. *Proboscidalis*, der *Rüselfühler*.

*Müller* l. c. p. 732. no. 331. der *Rüselfühler*.

*Füesl.* Schweiz. Inf. p. 42. no. 810. *Phal. proboscidalis*. Nicht selten.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 26. no. 59.

*Kleemanns* Beytr. p. 265. t. 32. f. 1-10.

Die grün hellgestreifte mit zarten Härchen und 14 Füßen besetzte springende *Spannraupe* der 3ten Klasse.

Ueber den gewölbten Netzförmigen Augen noch ein kleines rundes.

*Sulzers* Gesch. der Inf. p. 162. VI. *Feuervöglein*.

Ph. *Pyr. Proboscidalis*. t. 23. f. 6. 7. 8.

Das Weibchen bläuser.

*Wien. Schmett.* p. 119. A. no. 1. *Unbek. R. Brauner*

*Zünsler mit spitzigem Außenwinkel der Oberflügel.* *Pyr. Proboscidalis* L. \*)

D 4

*Scop.*

\*) Da hier die Raupe als unbekannt angegeben wird; so scheinen die W. Entomologen die *Kleemannsche* wohl nicht für die *Probosc. L.* zu halten.

*Scop.* Ent. carn. p. 239. no. 606. Ph. Pyr. *Proboscidalis.*

Alae anticae supra cinereae, fasciis tribus fuscis; margine utrinque ferrugineo; postica in alae apice desinente; antennae subpectinatae.

In *Carnioli* non rara.

*Long.* lin. 6.

*Fabric.* S. E. p. 642. no. 116. Phal. *Proboscidalis.*  
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* p. 271. no. 173. N. L.

*Mülleri* Faun. Fr. p. 54. no. 477. Ph. Pyr. *Proboscidalis.* N. L.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 133. no. 1534. Ph. Pyr. *Proboscidalis.* N. L.

332. *Rostralis*, die *Langschnauze*.

*Müller* l. c. p. 733. no. 332. t. 22. f. 15. die *Langschnauze*.

*Fießlins* Schweiz. Inf. p. 42. no. 811. Ph. *Rostralis.*

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 580. no. 1. Ph. *Pyralis*, die *Haynbüchennotte*; die *dunkelgraue langschmäbliche Lichtmotte*; auf *Weißbüchen und Hopfen*.

*Wien. Schmett.* H. p. 119. no. 3. *Hopfenzünsler-raupe* (*Humuli Lupuli*); *Hopfenzünsler.* Ph. Pyr. *Rostralis* L.

*Leske* Anfangsgr. der N. G. I. p. 463. no. 21. *Hopfenzünsler.*

*Röfels* Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 14. t. 6. das *grüne Springräuplein auf dem Hopfen*.

*Raj.* Hist. Inf. p. 214. no. 9.

*Phalaena* media e rufo cinerascens aut pulla, gemina proboscide sursum reflexa, alis exterioribus duplici transversa areola e rufo nigricante distinctis.

*Geoffr.*

Geoffr. Inf. II. p. 168. no. 116.

*Phalaena feticornis spirilinguis*, corniculis magnis cristatis, alis fusco-fumosis, medietate postica albidiore, punctis verrucosis eminentibus.

*Le toupet à pointes.*

Long. 6 lign.

Fabric. S. E. p. 642. no. 117. Phal. *Rostralis*. Nom. Linn.

*Larva nuda*, 14-poda, viridis; strigis obliquis lineisque lateralibus albis.

*Pupa folliculata*, brunnea, obtusa, antice carinata.

— Spec. Insect. p. 271. no. 174. Nom. Linn.

333. *Sulphuralis*, der Schwefelflügel.

Müller l. c. p. 733. no. 233. der Schwefelflügel.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 812. Phal. *Sulphuralis*. Bey uns selten.

Wien. Schmett. p. 93. Z. *Halbspannraupen* (Larvae Semigeometrae); *reiche Eulen*, Ph. *Noctuae Metallicae*: no. 6. *Windeneulenraupe* (Convoluti arvensis); *Windeneule*. N. *Sulphurea* (*Pyralis Sulphuralis* L.).

*Beschäftigungen* der Gesellsch. Naturf. Freunde zu Berlin. III. B. p. 37. t. 1. f. 7. Phal. *Sulphuralis*.

Schäeff. Icon. t. 9. f. 14. 15.

Fabric. Mantiss. p. 280. no. 83-84. Phal. *Bombyx lugubris*.

Alis deflexis flavis, rivulis punctisque atris; posticis fuscis.

— Spec. Insect. p. 197. no. 116. Ph. B. *lugubris*.

334. *Forficalis*, das Kohlvögelchen.

Müller l. c. p. 733. no. 334. der *Kohlwurm*.

*Füesl.* Schweiz. Inf. p. 82. no. 813. Phal. *Forficallis*.

*Wien. Schmett.* p. 122. B. *Kurzschauzigte Zünsler*: no. 17. *Meerrettigzünsler* (Cochleariae Armoraciae); *Meerrettigzünsler*. Ph. *Forficallis* L.

*Schaeff.* Icon. t. 51. f. 8. 9.

*Geoffr.* Inf. II. p. 166. no. III.

*Phalaena feticornis spirilinguis, triangularis; alis deflexis flavis, lineis duabus ferrugineis obliquis.*

*La bande esquissée.*

*Long. 6 lign.*

*Syst. Natur.* du Regn. Anim. II. p. 158. no. 70. *Phalène du Chou.*

*Act. Upsal.* 1735. p. 24. no. 49.

*Papilio alis planis pallidis nitidis.*

*Fabric.* S. E. p. 642. no. 120. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* p. 272. no. 177. Nom. L. *Phalaena Forficallis.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 54. no. 484. Ph. P. *Forficallis*. N. L.

— *Z. D. Pr.* p. 133. no. 1535. Ph. P. *Forficallis*. N. L.

535. *Verticalis*, das *Nesselvögelchen*.

*Müller* l. c. p. 733. no. 335. der *Nesselwurm*.

*Füesl.* Schweiz. Inf. p. 42. no. 814. Ph. *Verticalis*.

*Röfels* Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 9. t. 4. der *große grüne Blattwickler der größern Brennnessel*.

*Wien. Schmett.* p. 120. B. no. 1. *Nesselzünsler* (Urticae dioicae); *Nesselzünsler*. P. *Verticalis* L.

*Sulzers* Kennz. der Inf. t. 16. f. 98. Ph. *Purpurallis*.

*Bekmann*

*Bekmann* Ep. S. L. p. 167. no. 335. P. *Verticalis*.  
*System. Natur.* du Regne Anim. II. p. 153. no. 46.  
*Phalène de l'ortie*.

*Act. Upsal.* 1736. p. 24. no. 50.

Papilio alis planis nitidis albidis, fasciis undulatis.

*Fabric.* S. E. p. 643. no. 121. Phal. *Verticalis*. \*)

— *Spec. Insect.* p. 272. no. 180. Phal. *Verticalis*. \*\*)

Larva 16-poda, pilosa, capite pedibusque flavis.

Pupa brunnea, segmentis tribus ultimis denticulo notatis.

*Raj.* Inf. p. 207. no. 48.

*Phalaena* parva ex albido sublutea, alis exterioribus duplici linea transversa nigricante, oblique ducta notatis.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 54. no. 482. Pyr. *Verticalis*. N. L.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 133. no. 1536. P. *Verticalis*. N. L.

336. *Pinguinalis*, das *Fettvögelchen*. \*\*\*)

*Müller* l. c. p. 733. no. 336. der *Butterkeeter*.

*Füesl.*

\*) Hierbey hat *Fabricius* des *Geoffroy* Inf. II. p. 166. no. 12. *La bande à l'envers*, angeführt; dieses ist aber der *Wiener* Pyr. *Palealis*. p. 123. no. 27.

\*\*) Hier stehet auch noch der *Geoffroy* p. 166. no. 12.

\*\*\*) Von der Raupe sagt *Linné*: habitat — rarius in *Ventriculo humano*, inter *Vermes pessima*. Es ist möglich, daß dergleichen Räumchen mit den Speisen in den Magen kommen, und allerley üble Zufälle erregen können; man verwechsle sie aber ja nicht mit den eigentlichen *Eingeweide- und Darmwürmern*.

Füesst. Schweiz. Inf. p. 42. no. 815. Ph. *pinguin-*  
*alis*.

Abhandl. der schwed. Akad. der Wiss. 17 B. 1755. p.  
50. Rolanders Beschr. einer glatten Raupe mit  
16 Füßen und getheilten Gelenken, welche von  
allerley Hausmannskost lebt. t. 2.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 13. Schmalzzünsl-  
raupe (Butyri aliorumque pinguium); Schmalz-  
zünsl. P. *Pinguinalis* L.

Schaeff. Icon. t. 60. f. 8. 9.

Réaumur. Inf. III. t. 20. f. 5.

Fabric. S. E. p. 643. no. 124. Phal. *pinguin-*  
*alis*. N.

L.

— Spec. Inf. p. 273. no. 184. Ph. *pinguin-*  
*alis*. N.

L.

*Larva* 16-poda, laevis, fusca, nitida.

*Pupa* nuda, brunnea, obscura.

Pontopp. N. G. v. D. p. 221. no. 64. Ph. *pinguin-*  
*alis*.

Mülleri Faun. Fr. p. 54. no. 479. Pyr. *Pingu-*  
*inalis*. N. L.

— Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1537. Pyr. *Pingu-*  
*inalis*. N. L.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 371. t. 6. f. II.

*Phalène* à antennes filiformes sans trompe, à  
barbillons allongés; à ailes horizontales d'un  
gris d'agathe avec des rayes & des taches brunes  
& noires.

*Phalène de la graisse.*

— Ueberf. II Th. I B. p. 271. t. 6. f. II. die *Fett-*  
*phaläne*.

337. *Frumentalis*, das Getreidevögelchen.

Müller l. c. p. 734. no. 337. der Getreidewurm.

Pallas

Pallas Reifen I. Th. p. 81. \*)

Neueste Entdeckungen im Russl. Reiche. I. p. 217.

338. *Secalis*, das *Rockenwögelchen.* \*\*)

Müller l. c. p. 734. no. 338. der *Rockenwurm.*

Lepechins Reise durch Russl. I. p. 81. Sie sollen von gekochtem *Wermuthwasser* sterben.

Schwed. Abh. 1752. 14t. B. p. 67. *Rolander* von der Raupe in den weissen Aehren.

Wiener Schmett. p. 78. M. *Seitestreifenraupen*; *schwarzgezeichnete Eulen*: no. 17. *Rockenhalm-eulenraupe* (*Secalis cerealis* intra culmos habitans); *Rockenhalm-eule.* *Noctua Secalis* L.

Fabric. S. E. p. 644. no. 125. Phal. *Secalis.* Nom. Linn.

— Spec. Inf. p. 273. no. 186. Phal. *Secalis.* Nom. L.

An *Mülleri* Faun. Fr. p. 46. no. 410? Ph. *Noctua Secalis*, spirilinguis cristata cinerea: thorace bipunctato, alis strigis maculisque tribus; subtus punctatis.

In Spica *Secalis.*

— Z. D. Pr. p. 124. no. 1425. Ph. N. *Secalis.*

339. *Sanguinalis*, das *Blutband.*

Müller l. c. p. 734. no. 339. das *Blutband.*

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 41. Unbek. R. *Gelber Zünsler mit 2 rothen Querbänden.* Pyr. *Sanguinalis* L. et p. 152.

Schaeff. Icon. t. 19. f. 16.

Fabric.

\*) Die Larven fressen oft in Russland die Aecker rein ab. Das beste Mittel dagegen, die Felder, sobald die Saat aufgegangen, besonders bey feuchter Witterung, mit Asche von Buchweizen und Erbsenstroh bestreuet,

\*\*) Nicht abgebildet.

*Fabric.* S. E. p. 644. no. 126. Phal. *Sanguinalis.*  
Nom. L.

— *Spec. Inf.* p. 274. no. 188. Ph. *Sanguinalis.* N.  
L.

340. *Sticticalis*, der *Bartrand.* \*)

*Müller* l. c. p. 734. no. 340. der *Bartrand.*

*Fabric.* S. E. p. 644. no. 127. Phal. *Sticticalis.*  
Nom. L.

— *Spec. Inf.* p. 274. no. 189. Phal. *Sticticalis.*  
N. L.

In Europa boreali.

341. *Reticularis*, der *Scheckrand.* \*\*)

*Müller* l. c. p. 734. no. 341. der *Buntbart.*

*Faun. Suec.* ed. 2. p. 352. no. 1355. Ph. Pyr. *Reticu-*  
*laris.*

342. *Purpuralis*, der *Purpurmantel.* \*\*\*)

*Müller* l. c. p. 735. no. 342. der *Purpurmantel.*

*Wien. Schmett.* p. 124. B. no. 42. *Weißdornzünsler-*  
*raupe* (*Crataegi oxyac.*); *Weißdornzünsler.* Pyr.  
*Purpuralis* L.

*Fabric.* S. E. p. 644. no. 131. Phal. *purpuralis.* Nom.  
*Linn.*

— *Spec. Inf.* p. 275. no. 194. Phal. *purpuralis.*  
N. L.

*Variat rarius alis fuscis flavo-maculatis.*

*Mülleri* *Faun. Fr.* p. 54. no. 483. Ph. Pyr. *purpura-*  
*lis.* N. L.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 133. no. 1538. Ph. Pyr. *purpu-*  
*ralis.* N. L.

343 *Du\**

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

\*\*\*) Nicht abgebildet.



843. *Duplaris*, der Doppelpunkt. \*)

Müller l. c. p. 735. no. 343. der *Parallelpunkt*.

Mülleri Z. D. Pr. p. 133. no. 1539. Pyr. *Duplaris*.  
N. L.

— Faun. Fridr. p. 55. no. 485. Phal. *Tinea duplaris*. N. L.

*Unabgebildete Linnéische Lichtmücken.*

1. no. 338. *Secalis*.
2. no. 340. *Sticticalis*.
3. no. 341. *Reticularis*.
4. no. 342. *Purpuralis*.
5. no. 343. *Duplaris*.

*Neue Arten von Lichtmücken.*

1. *Nemoralis*, die *Waldlichtmücke*.

Fabric. S. E. p. 642. no. 118.

Palpis recurvatis, alis griseis; strigis tribus fuscis; intermedia flexuosa.

In Angliae *Nemoribus*.

— Spec. Inf. p. 271. no. 175.

Harris Inf. Angl. t. 6. f. 2?

2. *Palpalis*, die *geradschnauzige Lichtmücke*.

Fabric. S. E. p. 642. no. 119.

Palpis porrectis, thorace longioribus, alis griseis; posticis margine crassiori albo.

Habitat in *Anglia*.

— Spec. Inf. p. 271. no. 176.

3. *Fuscalis*, das *Weissauge*.

Fabric. S. E. p. 643. no. 122.

Palpis

\*) Nicht abgebildet.

64 *Lepidoptera.* 233. *Phalaena Pyralis.*

Palpis recurvatis, alis fuscis, nitidis; anticis puncto subocellari niveo. In *India orientali.*  
*Fabric.* Spec. Inf. p. 273. no. 182.

4. *Dorsalis*, die braune Rückenlinie.

*Fabric.* S. E. p. 643. no. 123.

Palpis recurvatis; alis cinereis, linea dorsali fasciaque postica fuscis. In *Brasilia.*

— Spec. Inf. p. 273. no. 183.

5. *Fascialis*, die Doppelbinde.

*Fabric.* S. E. p. 644. no. 128.

Palpis recurvatis, alis fuscis, fasciis duabus flavis.

In *Nova Hollandia.*

— Spec. Inf. p. 274. no. 190.

6. *Recurvatis*, die Weisbinde.

*Fabric.* S. E. p. 644. no. 129.

Palpis recurvatis, alis fuscis; anticis fasciis duabus albis; posteriore abbreviata.

In *India orientali.*

— Spec. Inf. p. 274. no. 192.

7. *Punctalis*, der Weisrand.

*Fabric.* S. E. p. 644. no. 130.

Alis subferrugineis, striga flava, margine crassiori albo-punctato.

— Spec. Inf. p. 275. no. 193.

In *Europae borealis* Nemoribus.

8. *Costalis*, der Rippenfleck.

*Fabric.* S. E. p. 644. no. 132.

Alis purpurascens; maculis duabus costalibus, margineque postico flavis. In *Anglia.*

*Fabric.*

*Fabric. Spec. Inf. p. 275. no. 196.*

9. *Dentalis*, die *Purpurbinde*.

*Fabric. S. E. p. 645. no. 134.*

Alis flavis; fascia purpurea.

In *India orientali*.

— *Spec. Inf. p. 275. no. 198.*

10. *Undalis*, die *Wasserbinde*.\*)

*Fabric. Spec. Insect. p. 272. no. 178.*

Alis obscure cinereis, strigis tribus obliquis undatis niveis.

In *Italia*.

11. *Ferrugalis*, die *Rostbinde*.

*Fabric. Spec. Inf. p. 273. no. 185.*

Alis flavis, strigis tribus undatis ferrugineis.

In *Africa aequinoctiali*.

12. *Nivealis*, der *Schneebruch*.

*Fabric. Spec. Inf. p. 274. no. 187.*

Alis griseo-fuscis, maculis duabus costalibus albis, corpore niveo.

In *Germania*.

13. *Strigalis*, die *Purpurader*.

*Fabric. Spec. Inf. p. 274. no. 191.*

Alis griseis, strigis duabus flavis costaque purpurascete.

In *Germaniae Nemoribus*.

14. *Ver-*

\*) Die Noctua *Sagittata*, S. E. p. 597. no. 3. hält *Fabric.* nun selbst in seinen *Spec. Inf. p. 272. no. 179.* für eine *Phalaenam* oder *Pyralidem* L. *Palpis recurvis, alis cinereis, macula costali atra, posticis flavis, margine fusco: Phalaena Sagittalis.*

*Caput acuminatum.*

14. *Verrucalis*, die Dreywarze.*Mülleri* Faun. Fridr. p. 55. no. 484.Palpis porrectis, alis albis, lineis duabus nigris acutis; *verrucis tribus*.In *Pariete*.— Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1540. Ph. Pyr. *Verrucalis*.15. *Anthracinalis*, der Köhler.*Scop.* Ent. carn. p. 239. no. 607.

Tota nigra; alis anticis albo-maculatis. Antennae mari pectinatae.

Circa *torrentes*. Long. lin.  $6\frac{1}{2}$ .*Wien. Schmett.* p. 124. B. no. 46. *Schwarzer Zünsler mit viel weißen Fleckchen*. P. *Anthracinalis**Scop.* Die Raupe ist entdeckt. S. *Nachtrag* p. 317.16. *Citrinalis*, die Zitrongelbe Lichtmücke.*Scop.* Ent. carn. p. 240. no. 609.

Alae citrinae; posticae pallidiores immaculatae; anticae fascia submarginali et cratere sanguineo reticulatae.

Circa *Idriam*.Palpi lin.  $1\frac{1}{2}$  longi.

Long. lin. 4.

17. *Trabealis*, der schwarze Balken.*Scop.* Ent. carn. p. 240. no. 610.Alae anticae paleaceae; fasciis binis; *trabe* longitudinali maculisque (5) nigris.*Labaco mortuam* accepi.Long. lin.  $4\frac{1}{2}$ .18. *Cristalis*, der schwarze Busch.*Scop.* Ent. carn. p. 241. no. 611.

Alae fuscae; anticae supra ferrugineo fuscoque nebulosae; *crista* nigricante in medio notatae.

Circa *Idriam*.

Long. lin.  $3\frac{1}{2}$ .

19. *Lunalis*, das braune Mündgen.

Scop. Ent. carn. p. 241. no. 612.

Alae cervinae; anticae strigis tribus obsoletis lunulaque fuscis.

Labaci degit.

Long. lin.  $6\frac{1}{2}$ .

20. *Viminalis*, die Bindweiden-Lichtmücke.

Scop. Ent. carn. p. 241. no. 613.

Alae murinae, fascia obscuriore utrinque.

In aut circa *Salicem viminalem*.

Long. lin. 5.

21. *Extimalis*, die Rostspitze.

Scop. Ent. carn. p. 241. no. 614.

Alba; alis anticis apice ferrugineis.

In agro *Labacensi*.

Long. lin. 5.

22. *Sericealis*, der Seidenglanz.

Scop. Ent. carn. p. 642. no. 615.

Tota subossea, sed *Serici* in modum nitens; alis anticis macula obsoleta fuscescente.

In agro *Labacensi*.

Long. lin. 4.

Wien. Schmett. p. 122. B. no. 18. Unbek. R. Hell-  
okergelber Zünsler mit einem schwarzen Mond-  
fleckchen. P. *Sericealis* Scop.

23. *Ruralis*, der *Landmann*.

*Scop.* Ent. carn. p. 242. no. 616.

Alae paleaceae, strigis transversis, undulatis, obsoletis, fuscis.

*Ruri* degit.

*Long.* lin. 7.

24. *Trivialis*, der *gemeine Mann*.

*Scop.* Ent. carn. p. 642. no. 617.

Alae paleaceae; anticae supra fascia lineis tribus obscurioribus composita, ab alae margine inferiore nata et in apicem desinente.

*Vulgaris* apud nos in hortis et pratis.

*Long.* lin. 6.

25. *Nemoralis*, die *Waldnymph*.

*Scop.* Ent. carn. p. 642. no. 618.

Alae anticae basi osseae, venulis paleaceis reticulatae, limbo paleaceo, parte intermedia vinaceae, margine externo repando.

In *Nemoribus* frigidis umbrosis.

*Long.* lin. 5.

*Wien.* *Schmett.* p. 123. B. no. 34. *Unbek. R. Gelb- und düsterröthlicher Zünsler mit weiß und braun-gezähntem Saume.* P. *Nemoralis* *Scop.*

26. *Majalis*, die *Maylichtmücke*.

*Scop.* Ent. carn. p. 643. no. 619.

Alae anticae supra albae; fasciis tribus, interruptis, fuscescentibus. Pectus pedesque argentei, tibiis fusco-annulatis.

In pratis *Majo* M.

*Long.* lin. 4.

27. *Luteolaris*, die *Leimfarbige Lichtmücke*. \*)

*Scop.*

\*) *Ib.* no. 136. *Phal.* priori simillima, sed absque palpis porrectis, et linea longitudinali, marginali fusco-lutea evidentiore.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 118. no. 135.

Pallide lutea, palpis thorace longioribus, ascendentibus.

In *Hungariae* pratis montanis.

Long. lin. 5-6.

28. *Tinealis*, einwärts bleicher, auswärts düsterrer Zünsler.

Wien. Schmett. p. 119. A. no. 4. Unbek. R.

29. *Decimalis*, mit einem weißlichten X bezeichneter Zünsler.

Wien. Schmett. p. 119. A. no. 5. Unbek. R.

30. *Bombycalis*, gelbbrauner Zünsler mit gelbgerandetem Querbande.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 6. Unbek. R.

31. *Angustalis*, braunrother Zünsler mit schmalen Oberflügeln.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 7. Unbek. R.

32. *Curtalis*, blaßoraniengelber Zünsler mit rothbraunen Querstrichen.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 8. Unbek. R.

33. *Grisealis*, Lichtgrauer Zünsler mit drey Querstrichen.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 11. Unbek. R.

34. *Emortualis*, grünlichgrauer Zünsler mit 2 gelben Querstrichen.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 12. Unbek. R.

35. *Dentalis*, Olivengrünlicher zackicht gezeichneter Zünsler.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 14. Unbek. R.

36. *Repandalis*, glänzender weißlich- und graugewäsfertiger Zünsler.

Wien. Schmett. p. 120. B. no. 2. Unbek. R.

37. *Triquetralis*, glänzendweißlicher Zünsler mit 2 Wellenstrichen und einem Dreyeck.

Wien. Schmett. p. 120. B. no. 3. Unbek. R.

38. *Politalis*, Strohgelber und Kupferbrauner Zünsler.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 4. Unbek. R.

39. *Verbasalis*, der Wollkrautzünsler.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 5. Wollkrautzünsler-raupe (*Verbasici Thapsi*).

40. *Lancealis*, glänzendgrauer Zünsler mit Lanzenförmigen Oberflügeln.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 6. Unbek. R.

41. *Flavalis*, glänzender hellgelber Zünsler.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 7. Unbek. R.

42. *Fuscalis*, glänzender graubrünlicher Zünsler mit blassen Wellenstrichen.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 8. Unbek. R.

43. *Polygonalis*, Wegetrittzünsler.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 9. Wegetrittzünsler-raupe (*Polygoni avicularis*).

44. *Elutalis*, glänzendweißer blaßbraun gerandeter Zünsler.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 10. Unbek. R.

45. *Prunalis*, Schlehenzünsler.



Wien. Schmett. p. 121. B. no. 11. *Schlehenzünsler-  
raupe* (*Pruni spinosae*).

46. *Sambucalis*, der *Holderzünsler*.

Wien. Schmett. p. 122. B. no. 14. *Holderzünsler-  
raupe* (*Sambuci nigrae*).

47. *Literalis*, brauner Zünsler mit weissen Zügen.

Wien. Schmett. p. 122. B. no. 15. *Unbek. R.*

48. *Salicalis*, der *Weidenzünsler*.

Wien. Schmett. p. 122. B. no. 16. t. I. b. f. 5. *Wei-  
denzünsler-raupe* (*Salicis Triandrae* etc.). t. I. a.  
f. 5.

49. *Lunatralis*, graulichter Zünsler mit einem schwar-  
zen Mondfleckchen.

Wien. Schmett. p. 122. B. no. 19. *Unbek. R.*

50. *Olivalis*, glänzender Olivenbräunlicher Zünsler  
mit weissen Mittelzeichen.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 21. *Unbek. R.*

51. *Corticalis*, hellbrauner, weiss und schwarz gestrich-  
ter Zünsler.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 22. *Unbek. R.*

52. *Alpinalis*, glänzender grauer Zünsler mit weisser  
Mittelmakel.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 24. *Unbek. R.*

53. *Punctalis*, Quittengelblicher Zünsler mit einem  
weissen Punkt.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 25. *Unbek. R.*

54. *Aenealis*, bräunlichtgrauer, Kupferschielender  
Zünsler.

72 *Lepidoptera.* 233. *Phalaena Pyralis.*

*Wien. Schmett.* p. 123. B. no. 26. *Unbek. R.*

55. *Palealis*, blafsgrünlichtgelber Zünsler.

*Wien. Schmett.* p. 123. B. no. 27. *Unbek. R.*

*Geoffr. Inf. II.* p. 166. no. 112.

*Phalaena seticornis spirilinguis triangularis,*  
alis deflexis albo-virescentibus, subtus lineis  
duabus transversis nigris.

*La bande à l'envers.*

*Long. 7 lign.*

56. *Ochrealis*, hellokergelber Zünsler.

*Wien. Schmett.* p. 123. B. no. 28. *Unbek. R.*

57. *Margaritalis*, glänzender Perlfarbiger Zünsler.

*Wien. Schmett.* p. 123. B. no. 29. *Unbek. R.*

58. *Cespitalis*, gelb, braun und grauneblichter Zünsler  
mit gelblichen Querstrichen der Unterflügel.

*Wien. Schmett.* p. 123. B. no. 32. *Unbek. R.*

59. *Flammealis*, gelber Zünsler mit Fleischfarblichem  
Rande.

*Wien. Schmett.* p. 123. B. no. 35. *Unbek. R.*

60. *Rubidalis*, Purpurbrauner Zünsler mit 2 gelben  
Querstrichen.

*Wien. Schmett.* p. 124. B. no. 36. *Unbek. R.*

61. *Regalis*, glänzender braunrother Zünsler mit 2  
silbernen halben Querbinden.

*Wien. Schmett.* p. 124. B. no. 37. *Unbek. R.*

62. *Fimbrialis*, Purpurfarbiger Zünsler mit goldgel-  
bem Untenrande.

*Wien. Schmett.* p. 124. B. no. 38. *Unbek. R.*

63. *At-*

63. *Auroralis*, gelber Zünsler mit Purpurstreifen.  
Wien. Schmett. p. 124. B. no. 39. Unbek. R.
64. *Pudoralis*, der Zünsler mit weißen rosenroth gefleckten Oberflügeln.  
Wien. Schmett. p. 124. B. no. 40. Unbek. R.
65. *Quadripunctalis*, Purpurschwarzer Zünsler mit vier gelben Fleckchen.  
Wien. Schmett. p. 124. B. no. 43. Unbek. R.  
Geoffr. Inf. II. p. 195. no. 33.  
*Tinea fusco-rubra*, alis superioribus maculis duabus croceis transversim positis.  
*La Teigne à deux taches jaunes en bande.*  
Long. 3 lign.
66. *Pollinalis*, schwarzer, weißgefleckter und bestäubter Zünsler.  
Wien. Schmett. p. 124. B. no. 44. Unbek. R.
67. *Guttalis*, schwarzer Zünsler mit 8 weißen Fleckchen.  
Wien. Schmett. p. 124. B. no. 45. Unbek. R.
68. *Nivalis*, schimmernd weißer bräunlich gewässerter Zünsler. \*)  
Wien. Schmett. Nachtr. p. 316. A. no. 46. Unbek. R.
69. *Trinalis*, hochgelber dreymaklichter Zünsler.  
Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. B. no. 47. Unbek. R.

\*) Die *Pyr. Calvarialis*, schwarzbrauner Zünsler mit gelbem schwarzgezeichnetem Mittelflecke, ist schon vorher ihre *N. Calvaria*; wie auch p. 317. *P. Marginalis* ihre *N. Marginea*.

74 *Lepidoptera.* 233. *Phalaena Pyralis.*

70. *Punicealis*, rother gelbgefleckter Zünsler.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. B. no. 49. Unbek.  
R.

71. *Porphyralis*, schwärzlichrother gelbgestrich- und  
punktirter Zünsler.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. B. no. 50. Unbek.  
R.

72. *Aufonia*, die Surinamische *Aufonia*.

Cramer Pap. exot. II. p. 66. t. 140. Fig. C.

Alis incarnatis, ciliatis; anticarum dextra li-  
neola curva atra.

73. *Flegia*, die Surinamische *Flegia*.

Cramer Pap. exot. II. p. 66. t. 140. Fig. D.

Alis concoloribus niveo-perlaceis; anticarum  
margine exteriori pallide glaucis.

74. *Chorebus*, der Surinamische *Chorebus*.

Cramer Pap. exot. II. p. 25. t. 113. Fig. D.

Alis anticis falcatis fuscis, lineis transversis  
incarnatis; posticis obscurioribus.

75. *Diaphana*, der afrikanische *Durchschein*.

Cramer Pap. exot. II. p. 26. t. 113. Fig. G.

Alis niveis, atro-punctatis, lineisque transver-  
sis luteis.

76. *Politia*, die afrikanische *Politia*.

Cramer Pap. exot. II. p. 35. t. 120. Fig. A.

Alis niveis, rubro-micantibus; anticis margi-  
ne anteriore luteo.

77. *Nitocris*, die Surinamische *Nitokris*.

Cramer Pap. exot. III. p. 148. t. 275. Fig. A.

Alis

Alis olivaceis concoloribus; anticis margine anteriore rubro-punctatis, lineaque longitudinali communi atro-liturata; posticis lunulis olivaceis marginalibus.

78. *Pueritia*, die *Koromandelsche Pueritia*.

*Cramer* Pap. exot. III. p. 128. t. 164. Fig. E.

Alis fuscis; anticis apice et margine exteriori; posticis pariter maculis nigris, glauco-punctatis.

79. *Tedea*, die — *Tedea*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 48. t. 312. Fig. G.

Alis anticis testaceis, posticis incarnatis; omnibus maculis argentaceis.

80. *Sulphuralis*, der *Schwefelflügel*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 113. t. 348. Fig. E.

Tota sulphurea; alis anticis, binis lineis transversis, punctisque argenteis.

81. *Bilineata*, die *Doppellinie*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. I.

Alis anticis, pulchre rubris, singula flavo-bilineata.

82. *Margaritaria*, das *goldne V*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 150. t. 367. Fig. K.

Alis violaceis, litteris V aurantiacis.

*Clerk* Icon. t. 51. f. 3. 4.

83. *Procopia*, die *Surinamische Prokopia*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 152. t. 368. Fig. E.

Alis violaceis, albo-striatis, basi aurantiacanis.

84. *Marginalis*, der *Surinamische Olivenrand.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 160. t. 371. Fig. D.

Triangularis; alis albescentibus nigro-striatis, margine lato-olivaceo.

*Merian.* Surin. t. 41. f. 2.

85. *Venustalis*, die *Surinamische Venustalis.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 162. t. 371. Fig. I.

Alis anticis flavescens, nigro-serpentulatis; posticis aurantiacis.

86. *Reginalis*, die *Surinamische Schwarzbinde.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 163. t. 372. Fig. C.

Alis incarnatis, anticis aterrime fasciatis,

87. *Vicinalis*, die *Surinamische Schecke.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. G.

Flavo-rubro-furvoque variegata.

88. *Floralis*, das *Surinamische Blümchen.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 191. t. 384. Fig. G.

Hilare rutilans, binis anticarum fasciis albis.

89. *Houttuinialis*, die *Houttuinische Lichtmücke.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. L.

Nigra, aurantiaco-maculata.

VI. *Motten*, Phal. *Tineae.* \*)

344. *Gelatella*, die *Kerbelmotte.* \*\*)

*Mil-*

\*) Es ist merkwürdig, daß bey dem Mottengeschlecht die *Weibchen einiger Arten Flügellos sind.* Ich nenne dies Geschlecht *Motten*, um es von den *Schaben*, *Blattis*, zu unterscheiden. Zu diesen *Motten* gehören die *Miniver*, *Vers mineurs*; *Larvae Subcutaneae.*

\*\*) Da *Linné* selbst dieser Motte den Geschlechtsnamen *Tinea* beyge-

Müllers Erkl. des Linn. Naturfyft. Vten Th. Iter

B. p. 735. no. 344. der *Apfelschäler.* \*)

Martini allgem. Gesch. der Nat. in alphab. Ordn.

III B. p. 129. *Apfelschäler.*

Wien. Schmett. p. 144. D. *Schnauzenlose Schaben,*

Ph. *Tineae Impalpes,* mit gespitzten Oberflügeln:

no. 38. *Rothweidenschabenraupe* (*Salicis purpu-*

*reae*); *Rothweidenschabe.* Ph. T. *Gelatella* L.

Fem. *Hemiptera.*

Clerk Phal. t. 8. f. 3.

345. *Sociella*, die gesellschaftliche Honigmotte.

Müller l. c. p. 735. no. 345. die *Honigmotte.*

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 345. T. *Gelatella.*

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 95. Le

plus grand de tous ceux nommés: *nasutae* par

*Linnaeus.*

Fabric. S. E. p. 656. no. 3. *Tinea Sociella.*

Alis oblongis, cinereis, antice albidis, postice  
pallidis, striga undata, nigra.

— Spec. Inf. p. 289. no. 3. T. *Sociella.*

Clerk Phal. t. 3. f. 11.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 466.

*Phaléne* à antennes filiformes, à trompe; à  
ailes roulées d'un blanc cendré avec des atomes  
bruns, & deux rayes obliques brunes.

*Phaléne à ailes à rouleau applati.*

*Degeer*

beygesetzt hat; so habe ich sie von den *Blattwicklern* abgefondert, und zu den *Tineis* gesetzt.

\*) Die Ueberferzung in dem Müllerschen Kommentar ist sonderbar: „dieses Insekt pflegt sich gerne bey den vom Tische getragenen *Aepfelschaalen* einzufinden.“

*Lin.* Habitat in *Pomariis sub mense defoliationis.* In den *Obstkammern*, um die Zeit, oder in dem Monat, wenn die *Blätter* fallen.

*Degeer* Ueberf. II Th. I B. p. 343. no. 4. die *Phaläne* mit flachgerollten Flügeln.

346. *Colonella*, die *Kolonmotte*.

*Müller* l. c. p. 736. no. 346. das *Kolon*.

*Wiener Schmett.* p. 133. B. *Geradschnauzige Schaben*, Ph. T. *Directipalpes*, mit stumpfen Oberflügeln: no. 1. *Unbek. Raupe*; röthlichgraue Schabe mit schwarzem Mittelpunkte. T. *Colonella* L. Grofs, und gleicht einer *Eule* (*Noctua*).

*Neuer Schaupl. der Natur* II. p. 193. Ph. *Colonella*. *Fabric.* S. E. p. 655. no. 2. T. *Colonella*. Nom. *Linn.*

*Puncta duo atra ad marginem crassiorum.*

— *Spec. Inf.* II. p. 289. no. 2. T. *Colonella*.

*Clerk* Phal. t. 3. f. 8.

*Syst. Nat. du Regn. Anim.* II. p. 163. no. 102. *Phalène des Jardins*.

*Mülleri* *Zool. Dan. Pr.* p. 133. no. 1541. Ph. T. *Colonella*. Nom. L.

*Degeer* *Inf. Tom.* II. P. I. p. 467. no. 5.

*Phalène* à antennes filiformes, à trompe; à ailes roulées d'un gris d'agate avec deux rayes ondées noirâtres, & un point noir au milieu.

*Phalène agathe* à ailes roulées à point noir.

— *Ueberf.* II Th. I B. p. 342. no. 5. die *Achatfarbige Phaläne* mit zusammengerollten Flügeln und schwarzem Punkt.

347. *Pusiella*, die *Zahnlinie*.

*Müller* l. c. p. 736. no. 347. der *Zahnstrich*.

*Küestl.* schweiz. *Inf.* p. 42. no. 816. Ph. *pusiella*. Bey Zürich selten.

*Sulzers* *Gesch. der Inf.* p. 162. t. 23. f. 9. der *Zahnstrich*.

*Fabric.*



*Fabric.* S. E. p. 656. no. 6. T. *Pufiella*. Nom. *Linn.*  
In *Germaniae arvis.*

— *Nov. Spec. Inf.* p. 291. no. 8. T. *Pufiella.*

348. *Bella*, das *punktirte Band.*

*Müller* l. c. p. 736. no. 348. das *Punktband.*

*Raj.* *Hist. Inf.* p. 211. no. 1.

*Phalaena minor fulva*, maculis nigris, alba  
linea pulchre aspersis.

*Linn. Mus. L. V.* p. 399. no. 34.

*Fabric.* S. E. p. 585. no. 101. Ph. *Bombyx bella.*  
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 203. no. 141. Ph. B. *bella.*

*Drury* *Illustr. of nat. hist. I.* t. 24. f. 3.

*Cramer* *Pap. exot. P. I.* t. 109. Fig. CD.

349. *Pulchella*, der *Blutpunkt.*

*Müller* l. c. p. 736. no. 349. der *Blutpunkt.*

*Lepechins* *Reise durch Rußl. P. I.* p. 302.

*Gludbachs* *neue Schmett.* t. 15. f. 5. 6. der *Blut-*  
*punkt.*

*Sulzers* *Gesch. der Inf.* p. 162. t. 23. f. 11. der  
*Blutpunkt.*

*Wien. Schmett.* p. 67. C. *Spindelraupen*, Larvae  
Fusiformes; *Schabenartige Eulen*, Ph. Noctuae  
*Tineiformes*: no. 9. *Sonnenwendeeulenraupe*  
(*Heliotropii europ.* etc.); *Sonnenwendeeule*; No-  
ctua *Pulchra*. *Tinea Pulchella* L.

*Schaeff.* *Icon.* t. 122. f. 1.

*Fabric.* S. E. p. 586. no. 102. Ph. *Bombyx pulchella.*  
la. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 203. no. 142. Ph. B. *pulchella.*

*Cramer* *Pap. exot. P. I.* p. 108. t. 109. Fig. EF. Ph.  
*Lotrix.*

*Scop. Ent. carn.* p. 208. no. 514. Phal. *pulchella.*

Alba;

Alba; alis anticis nigro-rubroque punctatis;  
posticis limbo fusco.

In flore *Scabiosae arvensis*.

Long. lin.  $7\frac{1}{3}$ . Lat.  $3\frac{1}{3}$ .

350. *Evonymella*, die *Spillbaumotte*. \*)

Müller l. c. p. 736. no. 350. die *Spillbaumotte*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 817. Ph. *Evonymella*.

— Magaz. der Entomol. II B. p. 39. Ph. *Evonymella* — die Raupen derselben haben viele *Zwirnwürmer*.

Röfels Insektenbel. I B. NV. 4te Kl. p. 19. t. 8. die gelbe gefellige *Heckenschabe*.

Maders (Kleemanns) Raupenkalender p. 61. no. 171. die *Spillbaumotte*.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 395. no. 1. Ph. T. *Evonymella*, die *Spindelstrauchmotte*.

Die Oberflügel weiß mit 50 schwarzen Punkten, und unten braun.

Glafer von schädlichen Raupen (neue Ausg.) p. 44. *Raupe des punktirten Nachtschmetterlings*, Ph. *Evonymella*.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 23. *Spindelbaumotte*.

Wien. Schmett. p. 138. C. *Krummschnauzichte Schaben*, Ph. T. *Recurvipalpes*: no. 18. *Spindelbaumschabenraupe* (*Evonymi Europaei*); *Spindelbaumschabe*. T. *Evonymella* L.

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 350. Ph. T. *Evonymella*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 358. die *Spillbaumotte*.

Catholicon E. p. 311. *Evonymella*.

*System.*

\*) Das Linnéische Zitatum: *Frisch* V. t. 16. gehört nicht hieher, sondern zu der folgenden, *Padella*.

*System. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 159. no. 81.

*Phalène* de Chenille, qui vit en commun sur le Poirier, le Cerisier, & autres arbres, & qui en ravage toutes les feuilles.

*Réaumur* Inf. II. t. 12. f. 12. 13. I. t. 17. f. 10. II.

La Chenille du *Fusain*; le *petit deuil*.

*Raj.* Hist. Inf. p. 196. *Phalaena parva*, alis longis, lividis seu plumbeis, exterioribus punctis nigris, inferioribus fuscis.

*Act.* Upsal. 1736. p. 26. no. 81. Papilio alis depressis argenteis, nigro-punctatis.

*Scop.* Entom. carn. p. 241. no. 631. Ph. T. *Evonymella*.

Alae anticae supra albae, punctis nigris ad (27).

Long. lin.  $5\frac{1}{4}$ .

*Fabric.* S. E. p. 656. no. 4. Ph. T. *Evonymella*.  
Nom. *Linn.*

*Larva* gregaria, nuda, flava, nigro-punctata, sub tentorio communi.

*Pupa* folliculata, brunnea.

— *Spec.* Inf. II. p. 290. no. 6. T. *Evonymella*.

*Geoffr.* Inf. p. 183. no. 4. *Tinea* alis superioribus, albis punctis nigris, inferioribus fuscis.

La *Teigne blanche à points noirs*.

Long.  $4\frac{1}{2}$  lign.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 55. no. 487. Ph. T. *Evonymella*. Nom: *Linn.*

— *Zool.* Dan. Prodr. p. 133. no. 1542. Ph. T. *Evonymella*.

### 351. *Padella*, die *Obstmotte*.

*Müller* l. c. p. 737. no. 351. die *Obstmotte*.

*Füesl.* schweiz. Inf. p. 42. no. 818. T. *Padella*.

*Fließl.* Magazin der Entomol. 2 B. p. 39. Ph. T. *Padella.*

*Frisch* Inf. V. p. 38. no. 16. 2 Pl. t. 16. von den gefelligen Blattmotten und ihren Papilions.

*Röfels* Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 17. t. 7. die graue gefellige Heckenfchabe, oder Schabenraupe, mit dem großen Gewebe.

*Wien.* Schmett. p. 139. C. no. 33. Vogelkirschenschabenraupe (*Padi Pruni*); Vogelkirschenschabe. T. *Padella* L.

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 789. no. 19. P. T. *Padella*, *Patscherbenmotte.*

*Bkm.* Epit. S. L. p. 168. no. 351. Tin. *Padella.*

*Scop.* Ent. carn. p. 247. no. 636. Ph. T. *Padella.*

*Similis Evonymellae*, sed diversa, 1) punctis paucioribus, nec ultra (20), 2) alis anticis minus albis, subtus ubique fuscis; 3) alis posticis utrinque fuscis totis.

*Long.* lin. 4 $\frac{1}{2}$ .

*Fabric.* S. E. p. 656. no. 5. Tin. *Padella.* Nom. *Linn.*

*Larva* gregaria, nuda, grisea; segmentis utrinque puncto atro, sub tentorio communi.

*Pupa* folliculata, flavicans.

— *Spec.* Inf. II. p. 290. no. 7. Tin. *Padella.*

*Schaeff.* Icon. t. 145. f. 2. 3.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 55. no. 488. Tin. *Padella.*

Nom. *Linn.*

— *Zool.* Dan. Pr. p. 133. no. 1543. Tin. *Padella.*

*Degeer* Inf. II. p. 479. no. 1. t. 10. f. 14. 15. 16.

*Phalène* à antennes filiformes, à trompe, à ailes pendantes, d'un gris-de-perle cendré à vingt points noirs.

*Phalène* petit-deuil cendré à 20 points noirs.

*Chenilles* rases couleur d'ardoise, dont les deux extrémités du corps sont jaunes, avec deux rangs de taches noires & à seize pattes: fig. 10.

— Ueberf. II Th. I B. p. 354. no. 1. t. 10. f. 10. 14. 15. 16.

Die kleine aschfarbige Trauerphaläne mit zwanzig schwarzen Punkten.

352. *Sequella*, die Krummlinie.

Müller l. c. p. 737. no. 352. der Krummbalken.

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 55. Steinsamenschabenraupe (Lithospermi purpurei coerulei); Steinsamenschabe. T. *Sequella* L.

Fabric. S. E. p. 657. no. 7. T. *Sequella*. N. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 291. no. 9. Tin. *Sequella*.

Clerk Phal. t. 10. f. 14.

353. *Crataegella*, Hagedornmotte. \*)

Müller l. c. p. 737. no. 353. die Hagedornmotte.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 7. Hagedornschabenraupe (Crataegi Oxyacanthae); Hagedornschabe. T. *Crataegella* L.

354. *Irrorella*, der Dreypunkt.

Müller l. c. p. 737. no. 354. die Pomeranzenmotte.

Füesl. schweiz. Inf. p. 42. no. 819. Tin. *Irrorella*.

Wien. Schmett. p. 68. C. Spindelraupen, Larvae Fussiformes; Schabenartige Eulen, Ph. Noct. Tineiformes: no. 6. Baumflechteneulenraupe (Lichenis olivacei etc.); Baumflechteneule. N. *Irrorella* (Tin. *Irrorella* L.).

Sulzers Gesch. der Inf. p. 162. t. 23. f. 10. die Pomeranzenmotte.

F 2

Fabric.

\*) Nicht abgebildet.

*Fabric.* S. E. p. 657. no. 9. Tin. *Irrorella*. Nom. Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 291. no. 11. Tin. *Irrorella*.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1606. b. Tin. *Irrorella*. Nom. Linn.

*Degeer* Inf. Tom. II. P. I. p. 342. t. 5. f. 12.

*Phalène* à antennes barbues, à trompe; à ailes rabattues arrondies d'un jaune d'ocre clair, piquées de points noirs, dont le corps est noir & le bout du ventre jaune.

*Phalène* jaune à points noirs.

— *Uebersf.* II Th. I B. p. 248. t. 5. f. 12. die gelbe schwarzpunktirte Motte.

355. *Lutarella*, die Leimfarbige Motte.

*Müller* l. c. p. 737. no. 355. die Gelblingin.

*Wien. Schmett.* p. 68. C. no. 3. *Steinflechteneulens-raupe* (*Lichenis saxatilis*); *Steinflechteneule*. Noct.

*Luteola* (Tin. *Lutarella* L.)

*Clerk* Phal. t. 4. f. 9.

*Fabric.* S. E. p. 657. no. 10. Tin. *Lutarella*.

Alis supra luteis, immaculatis, subtus fuscis.

— *Spec. Inf.* II. p. 291. no. 13. Tin. *Lutarella*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 55. no. 486. Tin. *Lutarella*. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 134. no. 1559. Tin. *Lutarella*.

356. *Mesomella*, die Grasmotte.

*Müller* l. c. p. 738. no. 356. *Grasmotte*.

*Friesl.* Schweiz. Inf. p. 42. no. 820. Ph. *Mesomella*.

*Clerk* Phal. t. 4. f. 14.

*Fabric.* S. E. p. 657. no. 11. Tin. *Mesomella*. Nom. Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 292. no. 14.

Alis anticis pallidis, margine flavo, punctisque duobus fuscis.

357. *Oxyacanthella*, die *Weißdornmotte*. \*)

Müller l. c. p. 738. no. 357. *Weißdornmotte*.

Fabric. S. E. p. 657. no. 12. Tin. *Oxyacanthella*.  
Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 292. no. 15. Tin. *Oxyacanthella*.

358. *Pinetella*, die *Fichtenmotte*.

Müller l. c. p. 738. no. 358. *Fichtenmotte*.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 7. *Föhrenschabenraupe* (*Pini sylvestris*); *Föhrenschabe*. Tin. *Pinetella* L.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 503. no. 8. Ph. Tin. *Pinetella*, die *gelbe Fichtenmotte*.

Knochs Beytr. I. p. 69. t. 4. f. 7. Ph. Tin. *Pinetella*, die *Fichtenmotte*.

Alis anticis pallide aurantiis; alba pyramide longitudinali fasciis binis colore alae interrupta.

Scop. Entom. carn. p. 244. no. 622. Ph. *Pinetella*.

Alae anticae ut in *Pascuella*; sed alba pyramide longitudinali, fasciis binis colore alae interrupta.

Long. lin. 5.

Fabric. S. E. p. 657. no. 13. Tin. *Pinetella*. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 292. no. 16. Tin. *Pinetella*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1544. Tin. *Pinetella*. Nom. L.

359. *Pascuella*, die *Futterkrautmotte*. \*\*)

Müller l. c. p. 738. no. 359. die *Futtermotte*.

F 3

Wien.

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 4. Unbek. R. Bleichgelbe Schabe mit einer geraden Silberstreife.

Scop. Ent. carn. p. 244. no. 621. Ph. *Pascuella*.

Alae anticae pallide aurantiae; linea alba longitudinali, a basi fere ad limbum usque producta, utrinque acuminata, inferiore latere dente in medio instructa; linea limbi transversa, aliaque marginali argenteis; area his interjecta cinerea; apice introrsum plicata.

Long. lin. 5.

*Fabric.* S. E. p. 658. no. 15. Tin. *Pascuella*.

Alis cinereis, linea albissima, margine postico, nigro-punctato.

— Spec. Inf. II. p. 292. no. 18. Tin. *Pascuella*.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1545. Tin. *Pascuella*. Nom. *Linn.*

*Degeer* Inf. Tom. II. Part. I. p. 465. no. 2.

*Phalène* à antennes filiformes, à trompe, à ailes roulées d'un blanc jaunâtre avec des lignes longitudinales argentées, à barbillons allongés.

*Phalène* à ailes roulées blancheâtres, à lignes argentées.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 342. no. 2. die *Phaläne* mit weißlichen zusammengerollten Flügeln mit Silberfarbigen Linien.

360. *Pratella*, die *Wiesenmotte*.

*Müller* l. c. p. 738. no. 360. die *Wiesenmotte*.

*Füesl.* Schweiz. Inf. p. 24. no. 821. Ph. *Pratella*.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 29. Unbekannte Raupe; graue mit Silber geradgestrichte Schabe.

*Clerk* Phal. t. 3. f. 14. (male).

*Syst. Natur.* du Regn. Anim. II. p. 163. no. 98.

*Fabric.* S. E. p. 658. no. 14. *Tinea Pratella*. Nom. *Linn.*

*Fabric.*



*Fabric. Spec. Inf. II. p. 292. no. 17. Tin. Pratella.*

*Mülleri Faun. Fridr. p. 55. no. 491. Tin. Pratella.*

Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1546. Tin. Pratella.*

*Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 464. no. 1.*

*Phalène* à antennes filiformes, à trompe, à ailes roulées d'un blanc argentées en dessus & d'un brun griseâtre en dessous.

*Phalène argentée à ailes roulées.*

— *Uebersf. II Th. I B. p. 341. no. 1. die Silberphaläne mit zusammengerollten Flügeln.*

### 361. *Culmella*, die Halmenmotte.

*Müller l. c. p. 739. no. 361. Halmenmotte.*

*Friesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 822. Phal. Culmella.*

*Wien. Schmett. p. 134. B. no. 9. Wurzelschabensraupe (Radicum graminis); Wurzelschabe. T.*

*Culmella L.*

*Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 97.*

*Schaeff. Icon. t. 145. f. 1. 2.*

*Raj. Hist. Inf. p. 229. no. 106.*

*Phalaena minor* pascuorum gemina proboscide, alis oblongis, cum sedet, circumvolutis, exterioribus ex argenteo lutescentibus vel argenteis vel plumbeis.

*Aët. Upsal. 1736. p. 26. no. 82. Papilio alis depressis cuneiformibus oblongis striatis.*

*Scop. Entom. carn. p. 246. no. 630. Phal. Culmella.*

Albida tota et immaculata; alis posticis fimbria argentea; oculis nigris.

*Long. lin. 4 $\frac{2}{3}$ .*

*Fabric. S. E. p. 658. no. 16. T. Culmella.*

Alis cinereis; linea unica albissima, abbreviata.

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 233. no. 19. Tin. Culmella.*

*Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1549. Tin. Culmella. Nom. Linn.*

362. *Rorella*, die *Thaumotte*. \*)

*Müller l. c. p. 739. no. 362. Thaumotte.*

363. *Carnella*, der *Blutrand*.

*Müller l. c. p. 739. no. 363. Fleischrolle.*

*Füesst. Schweiz. Inf. p. 42. no. 823. Tin. Carnella.*

— *Magaz. der Entomol. II B. p. 107.*

*Wien. Schmett. p. 138. C. no. 13. Unbekannte Raupe; rosenrothe und gelbe Schabe.*

*Naturforsch. III St p. 7. t. I. f. 6. die Rosenrothe Binde, Fascia Rosea. (D. Kühn.)*

*Sulzers Gesch. der Inf. p. 162. t. 23. f. 12. die Fleischrolle.*

*Schaeff. Icon. t. 247. f. 2. 3.*

*Fabric. S. E. p. 658. no. 18. Tin. Carnella. Nom. Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 293. no. 21. Tin. Carnella.*

364. *Nemorella*, die *Waldmotte*. \*\*)

*Müller l. c. p. 739. no. 264. Waldmotte.*

*Gleditsch Forstwiss. II. p. 939. no. 3. die weißliche Waldmotte mit gekrümmten Flügeln, wovon die obern am innern Rande einen schwarzen Punkt haben.*

*Mülleri Faun. Fridr. p. 55. no. 492. Tin. Nemorella. Nom. Linn.*

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1547. Tin. Nemorella.*

365. *Un-*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

365. *Unguicella*, der Nagelflügel.

Müller l. c. p. 739. no. 365. Nagelflügel.

Clerk Phal. t. 12. f. 7.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 80.

Fabric. S. E. p. 654. no. 51. *Pyralis unguicana*.

Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 287. no. 70. *Pyralis unguicana*.

366. *Ramella*, die Eichenmotte. \*)

Müller l. c. p. 740. no. 366. Eichenmotte.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 657. no. 46. Tinea *Ramella*, die kleine weißgraue Sprossenschabe.

367. *Salicella*, die Weidenmotte.

Müller l. c. p. 740. no. 367. t. 22. f. 16. Weidenmotte.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 824. Tin. *Salicella*.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 20. t. 9. der auf Weidenbäumen wohnende schwarze und mit weißen Punkten besetzte Blattwickler.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 39. no. 102. p. 62. no. 172. Tin. *Salicella*, Weidenmotte.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 785. no. 83. Tin. *Salicella*, die kleine blaugraue weißpunktirte Weidenmotte.

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 37. Bandweidenwickler-raupe (*Salicis viminalis*); Bandweidenwickler.

Tortr. *Salicana*.

Sulzers Kennz. t. 16. f. 97.

Fabric. S. E. p. 659. no. 21. Tin. *Salicella*. Nom. Linn.

*Larva nuda, 16-poda, fusca, albo-punctata.*

*Pupa antice nigra, postice brunnea.*

F 5

Fabric.

\*) Nicht abgebildet.

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 294. no. 27. Tin. Salicella.*

368. *Cynosbatella*, die *Rosenmotte*.

*Müller l. c. p. 740. no. 368. Rosenmotte.*

*Früesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 825. Tin. Cynosbatella.*

*Gleditsch Forstwiss. II. p. 1033. no. 5. Tin. Cynosbatella, die graue Knospenmotte der Heckrosen mit weißen Flügelspitzen und einem schwarzen Punkt.*

*Fabric. S. E. p. 654. no. 54. Pyralis Cynobana. Nom. Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 287. no. 74. Pyr. Cynobana.*

*Mülleri Faun. Fr. p. 56. no. 494. Tin. Cynosbatella. Nom. Linn.*

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1548. Tin. Cynosbatella.*

*Degeer Inf. I. t. 34. f. 4. 5.*

— *Uebersf. I. 3 Quart. p. 76.*

— *Tom. II. Part. I. p. 486. no. 5.*

*Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes pendantes d'un brun noirâtre par devant & blanches par derrière avec des taches brunes, à corcelet non-huppé.*

*Phalène brune par devant & blanche par derrière à taches brunes.*

— *Uebersf. II Th. I B. p. 359. no. 5. die braungefleckte, vorn braune und hinten weiße Phaläne.*

369. *Foenella*, die *Heumotte*.

*Müller l. c. p. 740. no. 369. Heumotte.*

*Früesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 826. Tin. Foenella.*

*Clerk Phal. t. 2. f. 13.*

*Fabric.*

*Fabric. S. E. p. 659. no. 22. Tin. Foenella. Nom. Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 294. no. 29. Tin. Foenella.*

*Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 517. Tin. Foenella. Nom. Linn.*

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1550. Tin. Foenella.*

370. *Vestianella*, die *Tuchmotte.* \*)

*Müller l. c. p. 740. no. 370. Tuchmotte.*

*Fischers Naturgesch. von Livland p. 154. no. 373. Tuchmotte.*

*Scop. Ent. carn. p. 256. no. 669. Ph. Vestianella. Alae cinerascens; costa alba.*

*Long. lin. 3½.*

*Fabric. S. E. p. 660. no. 25. Tin. Vestianella. Nom. Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 295. no. 32. Tin. Vestianella.*

371. *Tapetzella*, die *Tapetenmotte.*

*Müller l. c. p. 741. no. 371. Tapetenmotte.*

*Fischers N. G. von Livland p. 155. no. 374. Tapetenmotte.*

*Wien. Schmett. p. 142. D. no. 13. Tapetenschabensraupe (Tapetium etc.); Tapetenschabe. T. Tapetzella L.*

*Raj. Hist. Inf. p. 204. no. 98. Tinea vestivora major, alis oblongis acutis; exterioribus ad scapulas nigricantibus, inferius albensibus, interioribus fuscis sive cinereis.*

*Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 160. no. 82.*

*Clerk Phal. t. II. f. 12.*

*Geoffr. Inf. II. p. 187. no. 13.*

*Tinea nigra, capite niveo, alis pone albidis.*

*La Teigne bedaude à tête blanche.*

*Long.*

\*) Nicht abgebildet.

*Long. 4½ lign.**Fabric. S. E. p. 659. no. 23. Tin. Tapetzella.*

Alis nigris, postice albis, capite niveo.

— *Spec. Inf. II. p. 295. no. 30. Tin. Tapetzella. \*)**Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 503. Tin. Tapetzella. Nom. Linn.*— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1552. Tin. Tapetzella.*372. *Pellionella*, die *Pelzmotte. \*\*)**Müller l. c. p. 741. no. 372. Pelzmotte.**Füesl. schweiz. Inf. p. 42. no. 827. Tin. Pellionella.**Röfels Infektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 46. t. 17. die dem Pelzwerk sehr schädliche Schabenraupe.**Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 119. no. 336. Tin. Pellionella.**Neuer Schaupl. der Nat. I B. p. 144. VI. p. 406. Pelzmotte.**Olaßens Reise durch Island I. p. 320. Pelzmotte.**Allgem. Magaz. der Nat. X. p. 365. Pelzmotte.**Fischers N. G. von Livland p. 155. no. 375. die Pelzmotte.**Eberts Naturl. für die Jug. III. p. 95.**Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 24. Pelzmotte.**Der Dronth. Gefellsch. Schr. IV. p. 286. no. 48. Tin. Pellionella.**Onomat.*\*) Die vom Fabricius hierbey angeführte zwote Untergattung des *Geoffroy* no. 14. la Teigne bedaude à tête brune, ist *Linn. Ph. Tortr. Fasciana* no. 283. (*Wien. Schmett.* p. 131. no. 36.)\*\*) *Conf. Scop. Tin. Zoolegella: Ent. carn. no. 666. forte eadem, sed Tinea haec Scop. non est cana. v. unter den neuen no. 196.*

*Onomat. hist. nat. VI. p. 395. Pelzschabe.*

*Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 160. no. 84. Teigne, qui ronge les habits à poils.*

*Geoffr. Inf. II. p. 184. no. 6.*

*Tinea plumbea nitida, puncto nigro in medio alarum.*

*La Teigne commune.*

*Long. 2 lign.*

*Fabric. S. E. p. 659. no. 24. Tin. Pellionella. Nom. Linn.*

*Larva albicans, linea dorsali rubra, intra cucullum latitans.*

*Pupa flavescens.*

— *Spec. Inf. II. p. 295. no. 31. Tin. Pellionella.*

*Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 504. Tin. Pellionella. Nom. Linn.*

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1553. Tin. Pellionella.*

373. *Sarcitella*, die *Kleidermotte.*

*Müller l. c. p. 741. no. 373. Kleidermotte.*

*Friesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 828. Tin. Sarcitella. In den Kleiderschränken.*

*Röfels Infektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 41. t. 15. die den Insektenfassungen höchst schädliche Schabenraupe.*

*Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 143. Tuchaftermot-ten.*

*Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 119. no. 336. Tin. Sarcitella. \*)*

*Wien. Schmett. p. 139. C. no. 41. Kleiderschabenraupe*

*pe*

\*) Hier wird die auf t. 17. im Röfel abgebildete Motte für Pellionella und Sarcitella angegeben, da doch t. 15. eigentlich die Sarcitella ist.

pe (Vestimentorum); *Kleiderschabe*. Tin. *Sarcitella* L.

*Fischers* N. G. von Livland p. 155. no. 376. *Kleidermotte*.

*Leske* Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 25. *Kleidermotte*.

*Berlin. Samml.* VII. p. 613. Mittel gegen die *Kleidermotten*.

*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 160. no. 83.

*Fabric.* S. E. p. 660. no. 26. Tin. *Sarcitella*. Nom. *Linn.*

Parva; tota cinerea, nitida.

— *Spec. Inf.* II. p. 295. no. 33. Tin. *Sarcitella*.

374. *Nifella*, der *Eyerfleck*.

*Müller* l. c. p. 741. no. 374. *Eyerfleck*.

*Scop. Ent. carn.* p. 247. no. 634. Tin. *Nifella*.

Alae anticae canescentes; macula communi ovata nigricante.

In *Sylvis*.

*Long.* lin.  $4\frac{3}{4}$ .

*Clerk Phal.* t. 12. f. 6.

375. *Mellonella*, der *Honiglecker*. \*)

*Müller* l. c. p. 741. no. 375. *Honiglecker*.

*Friesl.* Schweiz. Inf. p. 42. no. 829. Tin. *Mellonella*. In den *Bienenkörben* und im *Wachstuch*.

*Röfels* Insektenbel. III. p. 242. t. 41. die zu der NV. 4ter Kl. gehörige *Bienenschabe*.

*Swammerd.* Bib. der Nat. Fol. p. 208. t. 26. f. 2. der *Wolf* in den *Bienenkörben*.

*Neuer*

\*) Diese Art Motten nennet *Columella* Lib. 3. cap. 14. Vermiculos ac Tineas. *Virgil.* Georg. 4. Dirum Tineae genus. *Plin. H. N.* Lib. XI. c. 19. Papilionem ignavum.

Destruuntur fumo fimi mixti cum medula bovina.



*Neuer Schaupl. der Nat.* I B. p. 142. *Aftermotte*; *Bienenmotte*; *Bienenschabe*; *Bienenfalter*; *Fauf-teigne de la cire*; *Wolf.*

*Wien. Schmett.* p. 134. B. no. 2. *Honigschabenraupe* (Mellis in Alvearibus); *Honigschabe.* T. *Mellonella* L.

*Bonnets Betr. über die Natur* p. 457. *Aftermotten.*

*Eberts Naturl. für die Jug.* III. p. 95.

*Abhandl. der schwed. Ges. der Wiss.* 24 B. p. 24.

Unterf. und Beschr. einer der Bienenzucht höchst schädlichen Raupe und des daraus entstehenden Schmetterlings, von Adolph *Modeer.* t. I. f. 1-12. Tin. *Mellonella* L.

*Blumenbachs Handb. der N. G. I.* p. 372. no. 19. Tin. *Mellonella.*

*Behm. Epit. S. L.* p. 168. no. 375. Tin. *Mellonella.*

*Scop. Ann. 4. hist. nat.* p. 40. obs. 15. *Tinea Mellonella.*

*Fabric. S. E.* p. 660. no. 28. Tin. *Mellonella.* Nom. *Linn.*

*Larva nuda, 16-poda, grisea, capite brunneo.*

*Pupa folliculata, brunnea.*

— *Spec. Inf. II.* p. 296. no. 36. Tin. *Mellonella.*

376. *Cucullatella*, die *Sperbermotte.*

*Müller l. c.* p. 742. no. 376. *Sperbermotte.*

*Füesl. Schweiz. Inf.* p. 42. no. 830. Tin. *Cucullatella.* Auf *Birn- und Apfelblättern.*

— *Magaz. der Entomol. II.* p. 39. Tin. *Cucullatella.*

*Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl.* p. 24. t. II. das kleine, braune, haarige Apfelbaumräudelein mit weissen Schildern.

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 848. no. 3. *Tinea Cucullatella*, die *weisse Vogelbeerbaummotte*.

*Onomat.* Hist. nat. VI. p. 346. die *Sperbermotte*.

*Fabric.* S. E. p. 660. no. 29. *Tin. Cucullatella*.

*Alis argenteis; arcu dorsali fusco.*

*Larva pilosa, 14-poda, fusca; dorso albo maculato.*

*Pupa folliculata, obtusa, fusca.*

— *Spec. Inf. II. p. 296. no. 37. Tin. Cucullatella*

377. *Granella*, die *Kornmotte*. \*)

*Müller* l. c. p. 742. no. 377. *Kornwurm*.

*Friesl.* schweiz. Inf. p. 42. no. 831. *Tin. Granella*.

*Röfels* Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 25. t. 12. der schädliche, wohlbekannte, *weisse Kornwurm*.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 78. no. 223. p. 89. no. 257. *Tin. Granella*, der *Kornwurm*.

*Bakers* zum Gebrauch leicht gemachtes Microscopium p. 236. t. XI. f. 13. AB. *Wolf im Korn*.

*Bonnets* Betr. über die Natur p. 458. *Aftermotten auf den Kornböden*.

*Berlin. Samml.* IV. p. 341. *Kornwurm* no. 1.

*Martini* Naturlex. I. 634. *Getreideaftermotten; der Wolf; der weisse Kornwurm. Tin. Granella*.

*Abhandl.* der königl. schwed. Gef. der Wiss. VIII. p. 49. t. I. f. 1-4. *Raupe*. Beschr. kleiner *weisser Raupen*, welche das Korn auf Böden und Vorrathsbehältnissen verzehren. (Carl *Degeer*.)

*Oekonomische Nachr.* der patriotischen Gef. in Schlefien I. p. 159. *Kornmotte*.

— II. p. 119. *Kornmotte*.

*Neuer*

\*) Ich nenne sie lieber *Kornmotte*, um sie von dem *Kornwurm*, *Curculio granarius et frumentarius*, zu unterscheiden.

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 144. *Kornmotten*.

Eberts Naturl. für die Jugend III. p. 95.

Blumenbachs Handb. der N. G. I. p. 372. no. 20. Tin.

*Granella*, *Wolf*; *weißer Kornwurm*.

Wien. Schmett. p. 144. C. no. 77. *Kornschabenraupe* (Frumenti in Granariis); *Kornschabe*. Tin.

*Granella* L.

Loevenhoek Opp. Tom. II. Arcana Nat. detecta p. 241-252. f. 2. A A. *Lupus*.

Tiburtius von den Kornmotten. Berlin. 12. 1665.

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 377. Tin. *Granella*, *weißer Kornwurm*; *Wolf*.

Bomar. Dict. des Anim. IV. 313. VIII. 245. Fausse-Teigne du Bled.

Fabric. S. E. p. 668. no. 8. *Alucita granella*. Nom. Linn.

*Larva* 16-poda, nuda, alba, capite brunneo.

*Pupa* folliculata, attenuata, brunnea.

— Spec. Inf. II. p. 307. no. 10. *Alucita granella*.

Geoffr. Inf. II. p. 186. no. 11.

*Tinea* tota fusco-nebulosa, capite albido.

La *Teigne brune à tête blancheâtre*.

Long.  $3\frac{2}{3}$  lign.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1556. Tin. *granella*. Nom. Linn.

378. *Lappella*, die *Klettenmotte*.

Müller l. c. p. 742. no. 378. *Klettenmotte*.

Abhandl. der königl. schwed. Ges. der Wiss. XIV. p. 72. der *Klettenfalterling* (von *Renström*).

*Phalaena feticornis*, spirilinguis, alis incumbentibus; superioribus cinereo-griseis, puncto atro; inferioribus atris, omnibus margine postico interiore; barbatis.

III. Th. IV. Band.

G. Wien.

*Wien. Schmett.* p. 142. D. no. 12. *Klettenschabentraupe* (Arctii Lappae); *Klettenschabe*. Tin. *Lappella* L.

*Clerk Phal.* t. II. f. 15.

*Fabric. S. E.* p. 668. no. 9. *Alucita Lappella*  
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 308. no. 12. *Aluc. Lappella*.

*Mülleri Faun. Fridr.* p. 57. no. 510. Tin. *Lappella*.  
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 134. no. 1555. Tin. *Lappella*.

379. *Proletella*, die *Muttermotte*. \*)

*Müller l. c.* p. 742. no. 379. *Muttermotte*.

*Füesl. Schweiz. Inf.* p. 42. no. 832. Tin. *Proletella*.  
Auf der Unterseite des Kohls.

*Sulzers Gesch. der Inf.* p. 163. t. 23. f. 17. *Muttermotte*.

380. *Arbutella*, *Bärentraubenmotte*. \*\*)

*Müller l. c.* p. 742. no. 380. *Bärentraubenmotte*.

*Cathol. A.* p. 446. *Arbutella*, *Sandbeerenmotte*.

*Fabric. S. E.* p. 661. no. 30. Tin. *Arbutella*.

*Alis rufis, strigis argenteis, intermediis bifidis.*

— *Spec. Inf. II.* p. 296. no. 39. Tin. *Arbutella*.

*Mülleri Faun. Fr.* p. 56. no. 496. Tin. *Arbutella*.  
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 134. no. 1557. Tin. *Arbutella*.

381. *Tessella*, die *Würfelmotte*. \*\*\*)

*Müller l. c.* p. 742. no. 381. *Würfelmotte*.

*Füesl.*

\*) Parit quotannis 200000 soboles, dum 12 progenies ponant 12 ova singula.

\*\*) Nicht abgebildet.

\*\*\*) Nicht abgebildet.

*Früßl.* Schweiz. Inf. p. 42. no. 833. Tin. *Tessella*.  
*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 978. no. 25. Tin. *Tessella*.

Die schwarzgeflügelte Motte mit zwey weißen weit aus einander stehenden gewürfelten Binden.

Franz von Paula *Schrank* Beytr. zur Naturgesch. p. 81. *Würfelmotte*. Tin. *Tessella*.

Der *Dronth.* Gesellsch. Schr. IV. p. 287. no. 49. Tin. *Tessella*.

*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 161. no. 87.

*Fabric.* S. E. p. 661. no. 31. Tin. *Tessella*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 296. no. 40. T. *Tessella*.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1560. Tin. *Tessella*.

382. *Vittella*, die Schwarzbinde.

*Müller* l. c. p. 743. no. 382. *Schwarzlinie*.

*Wien. Schmett.* p. 136. B. no. 42. *Ubekannte Raupe*; *Afchgraue Schabe mit schwarzem Innenrande*. T. *Vittella* L.

*Clerk* Phal. t. 15. f. 10.

*Fabric.* S. E. p. 668. no. 6. *Alucita Vittella*.

*Alis cinereis*; *vitta dorsali margineque postico nigris*.

— *Spec. Inf.* II. p. 307. no. 7. *Aluc. vittella*.

In *Lipsiae hortis*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 55. no. 489. Tin. *vittella*.  
 Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 134. no. 1554. Tin. *vittella*.

383. *Uftella*, der Brandrand.

*Müller* l. c. p. 743. no. 383. *Brandrand*.

*Clerk* Phal. t. 3. f. 13.

384. *Parenthesella*, die *Weißlinie*. \*)

*Müller* l. c. p. 743. no. 384. *Weißlinie*.

*Füesl.* Schweiz. Inf. p. 42. no. 834. Tin. *Parenthesella*. Auf den *Viehweiden*.

*Fabric.* S. E. p. 661. no. 33. Tin. *Parenthesella*.  
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 297. no. 43. Tin. *Parenthesella*.

385. *Elongella*, der *Schmalflügel*. \*\*\*)

*Müller* l. c. p. 743. no. 385. *Schmalflügel*.

*Wien. Schmett.* p. 141. C. no. 67. *Unbek. Raupe*;  
*Beinfarbige Schabe*. Tin. *Elongella* L.

*Fabric.* Mantiss. p. 295. no. 33-34. Tin. *Elongella*.  
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 297. no. 44. Tin. *Elongella*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 58. no. 514. Tin. *Elongella*.  
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 135. no. 1564. Tin. *Elongella*.

386. *Punctella*, der *Punktflügel*. \*\*\*)

*Müller* l. c. p. 743. no. 386. *Punktflügel*.

*Fabric.* S. E. p. 661. no. 34. Tin. *Punctella*. Nom.  
*Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 297. no. 46. Tin. *Punctella*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 58. no. 515. Tin. *Punctella*.  
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 135. no. 1565. Tin. *Punctella*.

387. *Bicoftella*, die *Doppelrippe*.

*Müller* l. c. p. 743. no. 387. *Doppelrippe*.

*Clerk* Phal. t. 3. f. 15.

*Scop.*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

\*\*\*) Nicht abgebildet.

*Scop.* Entom. carn. p. 249. no. 642. *Phal. bicostella.*

Caput, dorsum, alae anticae, alba; linea longitudinali ferruginea a basi ad apicem excurrente prope marginem crassiolem; disco punctis subternis atris.

Circa *Idriam.*

*Long.* lin. 5.

*Fabric.* S. E. p. 661. no. 32. *Tin. bicostella.*

Alis cinereis, linea longitudinali fusca, palpis porrectis.

— *Spec. Inf.* II. p. 297. no. 42. *Tin. bicostella.*

In *Europae* hortis.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1562. *Tin. bicostella.* Nom. *Linn.*

388. *Tetrapodella*, *Vierfufs.* \*)

*Müller* l. c. p. 744. no. 388. *Vierfufs.* Auf den *Kirschbäumen.*

389. *Xylostella*, die *Levkogenmotte.*

*Müller* l. c. p. 744. no. 389. *Levkogenmotte.*

*Friesl.* schweiz. Inf. p. 42. no. 835. *Tin. Xylostella.*

*Röfels* Infektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 22. t. 10. das sehr kleine *Kohl- und Salaträuplein.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 103. no. 294. die *Levkogenmotte.*

*Wien.* Schmett. p. 137. B. no. 54. *Heckkirschenscha-  
benraupe* (*Loniceri Xylostei*); *Heckkirschenscha-  
be.* *Tin. Xylostella* L.

*Der Dronth.* *Gesellsch.* Schr. IV. p. 287. no. 50. *Tin. Xylostella.*

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 939. no. 2. *Phal. Tinea Xylostella.*

G 3

Die

\*) Nicht abgebildet.

Die aschgraue *Welpermeymotte* mit einem weissen zackichten Flecke.

*Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 99.*

*Fabric. S. E. p. 667. no. 1. Alucita Xylofella.*

Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 306. no. 1. Aluc. Xylofella.*

*Geoffr. Inf. II. p. 195. no. 35.*

*Tinea cinerea, dorso vitta longitudinali alba.*

*La Teigne à bandelette blanche.*

*Long. 3 lign.*

*Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1562. Tin. Xylofella. Nom. Linn.*

390. *Cinctella*, die *Pappelmotte*. \*)

*Müller l. c. p. 744. no. 390. Pappelmotte.*

*Füesl. schweiz. Inf. p. 43. no. 836. Tin. Cinctella.*

*Der Dronth. Gefellsch. Schr. IV. p. 288. no. 53. Tin.*

*Cinctella,*

*Scop. Ent. carn. p. 252. no. 651. Phal. Vorticella.*

*Nigra, alis anticis fascia alba lineari.*

*In foliis fruticum.*

*Long. lin. 2 $\frac{3}{4}$ .*

*Fabric. S. E. p. 662. no. 36. Tin. cinctella.*

*Alis nigris, anticis striga argentea.*

— *Spec. Inf. II. p. 298. no. 48. Tin. cinctella.*

*Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 495. Tin. cinctella.*

Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1558. Tin. cinctella.*

391. *Leucatella*, das *Weissband*. \*\*)

*Müller l. c. p. 744. no. 391. Weissband.*

*Wien. Schmett. p. 139. C. no. 42. Unbekannte Raupe; schwärzlichte Schabe mit weissem Bande und Punkten.*

*Fabric.*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.



*Fabric.* S. E. p. 662. no. 37. Tin. *Leucatella*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 298. no. 49. Tin. *Leucatella*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 58. no. 516. Tin. *Leucatella*.  
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 135. no. 1566. Tin. *Leucatella*.

392. *Cinerella*, der Grauflügel. \*)

*Müller* l. c. p. 744. no. 392. Grauflügel.

*Wien. Schmett.* p. 138. C. no. 25. Unbek. R. Grauglänzende Schabe.

*Fabric.* S. E. p. 662. no. 40. Tin. *Cinerella*.

Alis fusco-cinereis, nitidulis, immaculatis.

— *Spec. Inf. II.* p. 299. no. 55. Tin. *Cinerella*.

*Mülleri* *Zool. Dan. Pr.* p. 135. no. 1563. Tin. *Cinerella*. Nom. *Linn.*

393. *Trigonella*, das Doppeldreyeck. \*\*)

*Müller* l. c. p. 745. no. 393. Doppeldreyeck.

Der *Dronth. Gesellsch. Schr.* IV. p. 287. no. 81. Tin. *Trigonella*.

*Gleditsch* *Forstwiss.* II. p. 978. no. 26. Tin. *Trigonella*, die braune Motte mit dem gedoppelten weissen dreyeckigen Fleck.

*Syst. Nat. du Regn. Anim.* II. p. 163. no. 101.

*Fabric.* S. E. p. 663. no. 42. Tin. *Trigonella*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 299. no. 57. Tin. *Trigonella*.

*Mülleri* *Zool. Dan. Pr.* p. 135. no. 1567. Tin. *Trigonella*. Nom. *Linn.*

394. *Rhomboidella*, das schwarze Viereck. \*\*\*)

*Müller* l. c. p. 745. no. 394. Schwarzviereck.

G 4

*Fabric.*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

\*\*\*) Nicht abgebildet.

*Fabric.* S. E. p. 663. no. 43. Tin. *Rhomboïdella*.  
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 299. no. 58. Tin. *Rhomboïdella*.

395. *Tertianella*, die *Dunkelstreife*. \*)

*Müller* l. c. p. 745. no. 395. *Dunkelstrich*.

— *Faun. Fridr.* p. 57. no. 511. Tin. *Tertianella*.  
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 135. no. 1568. Tin. *Tertianella*.

396. *Scabrella*, der *Schuppenflügel*. \*\*)

*Müller* l. c. p. 745. no. 396. *Schuppenflügel*.

*Fabric.* *Mantill.* p. 297. no. 10-11. *Alucita Scabrella*.

Alis fusco-cinereis, punctis nigris elevatis scabris.

— *Spec. Inf.* II. p. 308. no. 14. *Aluc. Scabrella*.

397. *Asperella*, der *Schuppenfleck*. \*\*\*)

*Müller* l. c. p. 745. no. 397. *Schuppenfleck*.

*Friesl.* *schweiz. Inf.* p. 43. no. 837. Tin. *Asperella*.

*Wien. Schmett.* p. 136. B. no. 46. *Unbekannte Raupe; grünweißlichte Schabe mit gefichelten Oberflügeln*.

*Catholicon* A. p. 535. *Asperella*, die *rauhe Motte*.

398. *Serratella*, der *Langschenkel*. †)

*Müller* l. c. p. 745. no. 398. *Langschenkel*.

399. *Populella*, der *Haarflügel*. ††)

*Müller*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

\*\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

Müller l. c. p. 746. no. 399. *Haarflügel.*

400. *Mercurella*, die *Queckfilbermotte.* \*)

Müller l. c. p. 746. no. 400. *Queckfilbermotte.*

401. *Pomonella*, die *Obstmotte.*

Müller l. c. p. 746. no. 401. *Birnmotte.*

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 835. Tin. *Pomonella.*

Frisch Inf. VII. p. 16. no. 10. 2te Pl. t. 10. der *Obstwurm in Birnen und Aepfeln.*

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 33. t. 13. die *kleine Apfel- und Birnraupe*, oder der sogenannten *Apfel- und Birnenwurm.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 39. no. 104. p. 62. no. 173. Tin. *Pomonella*, *Birnmotte.*

Gleditsch Forstwiss. II. p. 789. no. 18. Tin. *Pomonella*, die *Birnraupe.*

Wien. Schmett. p. 126. B. no. 10. *Apfelwicklerraupe* (*Pyri mali*); *Apfelwickler.* T. *Pomonana* (*Pomonella* L.).

Onomat. hist. nat. VI. p. 399. die *Birnmotte.*

Bekm. Ep. S. L. p. 168. no. 401. Tin. *Pomonella.*

Fabric. S. E. p. 653. no. 49. *Pyralis Pomana.*  
Nom. Linn.

*Larva* 16-poda, nuda, rufa, capite nigro.

*Pupa* folliculata, brunnea.

— Spec. Inf. II. p. 286. no. 67. *Pyralis Pomana.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 505. Tin. *Pomonella.* Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1576. Tin. *Pomonella.*

402. *Strobilella*, die *Tannzapfenmotte.*

Müller l. c. p. 746. no. 402. *Zapfenmotte.*

G-5 Füesl.

\*) Nicht abgebildet.

*Füesl.* Schweiz. Inf. p. 43. no. 839. Tin. *Strobilella*.  
*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 504. no. 9. Tin. *Strobilella*,  
*Tannzapfenmotte*.

*Wien.* Schmett. p. 135. B. no. 24. *Tannzapfenschabenraupe* (*Strobilorum abietis*); *Tannzapfenschabe*. Tin. *Strobilella* L.

*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 164. no. 104.

*Clerk* Phal. t. 12. f. 10.

*Fabric.* S. E. p. 662. no. 38. Tin. *Strobilella*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 298. no. 50. Tin. *Strobilella*.

*Degeer* Inf. Tom. II. P. I. p. 490. no. 9. t. 9. f. 15.

*Phalène* à antennes filiformes, à trompe, à ailes pendantes d'un brun obscur avec des rayes transverses couleur d'agate.

*Petite Phalène des Pommes de Sapin.*

— *Ueberf.* II Th. I B. p. 362. no. 9. t. 9. f. 15. die kleine *Tannapfelphaläne*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 57. no. 506. Tin. *Strobilella*. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 136. no. 1577. Tin. *Strobilella*.

403. *Turionella*, die *Anflugmotte*.

*Müller* l. c. p. 746. no. 403. *Anflugmotte*.

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 504. no. 10. Tin. *Turionella*, die *Lichtgraue Maywachsmotte*.

*Degeer* Ueberf. I Th. 3 Quart. p. 74.

*Clerk* Phal. t. 12. f. 15.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 57. no. 507. Tin. *Turionella*. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 156. no. 1578. Tin. *Turionella*.

404. *Dodecella*, der *Zwölfpunkt*.

*Müller*

Müller l. c. p. 747. no. 404. *Zwölfpunkt.*

Gleditsch Forstwiss. I. p. 504. no. II. Tin. *Dodecella*, die *Lichtgraue und braunstipplichte Maywachsmotte.*

Degeer Inf. I. t. 22. f. 22. 23. 24.

— Ueberf. 3 Quart. p. 73.

— Inf. Tom. II. Part. I. p. 494. no. 3.

*Phalène* à antennes filiformes, à trompe; à ailes étroites un peu élevées grises à quatre bandes ondées noirâtres & six huppées élevées noires.

*Phalène* teigne à douze huppées sur les ailes.

— Ueberf. II Th. I B. p. 365. no. 3. die *Mottenphaläne mit zwölf Bürstgen auf den Flügeln.*

Fabric. Spec. Inf. II. p. 298. no. 53. Tin. *Dodecella*, grisea, nigro-punctata.

*Larva* 16-poda, laevis ferruginea.

*Pupa* folliculata, conica, ferruginea.

*Imago* palpis reflexis coniformibus.

Ledermüller Gemüths- und Augenergötzung p. 122. t. 64. der Saame von der rothen Tanne oder Fichte, und die denselben so schädliche kleine Raupe mit ihrer Verwandlung zur Schabe. \*)

405. *Cembrella*, der *Weißsprenkel.* \*\*)

Müller l. c. p. 747. no. 405. *Weißsprenkel.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 39. *Fichtenschabensraupe* (*Pini Sylvestris*); *Fichtenschabe.* Tin. *Cembrella* L.

Müller's Faun. Fridr. p. 57. no. 508. Tin. *Cembrella.* Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 156. no. 1579. Tin. *Cembrella.*

406. *Re-*

\*) Da die kleine Motte hier t. 64. I. punktiert abgebildet ist; so glaube ich, das es die *Dodecella* ist.

\*\*) Nicht abgebildet.

406. *Resinella*, die *Harzmotte*.

*Müller* l. c. p. 747. no. 406. *Harzmotte*.

*Friesl.* Schweiz. Inf. p. 43. no. 840. Tin. *Resinella*.

*Frisch* Inf. X. p. II. no. 9. 2te Pl. t. 9. die *Kien-*  
*sprossenmotte*.

*Röfels* Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 44. t. 16. die in  
den Harzbeulen des Kiehn- oder Föhrenbaums  
wohnende *Sehabenraupe*.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 117. no. 331. Tin.  
*Resinella*, *Harzmotte*.

*Bonnets* und anderer Abhandl. aus der Insektol. p.  
391.

Fr. von Paula *Schrank* Beytr. zur N. G. p. 42. *Kien-*  
*sprossenmotte*. *Fliege* aus derselben. t. 2. f. 5.

*Fischers* N. G. von Livl. p. 155. no. 377. *Kien*  
*sprossenmotte*.

*Behm.* Epit. S. L. p. 168. no. 406. Tin. *Resinella*.

*Fabric.* S. E. p. 654. no. 55. *Pyralis Resinana*.  
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 288. no. 75. Tin. *Resinana*.

*Larva* 16. poda, nuda, lutea, capite brunneo:  
*Pupa* folliculata, fusca.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 57. no. 508. *Tinea Resinella*.  
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 136. no. 1580. Tin. *Resinella*.

*Degeer* Inf. I. t. 33. f. 12. 13.

— *Ueberf.* I. 3 Quart. p. 65.

— *Tom.* II. P. I. p. 491. no. 10.

*Phalène* à antennes filiformes, à trompe; à  
ailes pendantes d'un gris cendré avec des rayes  
transverses & des nuances noires.

*Phalène* des galles resineuses du Pin.

— *Ueberf.* II Th. I B. p. 363. no. 10. die *Fichten-*  
*harzphaläne*.

407. *Taedella*, der Spaltfleck.

Müller l. c. p. 747. no. 407. *Spaltfleck*.  
Clerk Phal. t. 10. f. 13.

408. *Iuniperella*, die Wacholdermotte. \*)

Müller l. c. p. 747. no. 408. *Wacholdermotte*.  
Wien. Schmett. p. 139. C. no. 26. *Wacholderscha-  
benraupe* (*Iuniperi communis*); *Wacholderscha-  
be*. Tin. *Iuniperella* L.  
Cathol. I. p. 405. *Iuniperella*.

409. *Fuscella*, die Hausmotte. \*\*)

Müller l. c. p. 748. no. 409. *Hausmotte*.  
Fabric. S. E. p. 662. no. 39. Tin. *Fuscella*. Nom.  
Linn.  
— Spec. Inf. II. p. 299. no. 54. Tin. *Fuscella*.  
Müller Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1569. Tin. *Fuscel-  
la*. Nom. Linn.

410. *Minutella*, die Miniaturmotte. \*\*\*)

Müller l. c. p. 748. no. 410. *Mignaturmotte*.  
Wien. Schmett. p. 140. C. no. 30. *Unbek. R. Ku-  
pferbraune Schabe mit unterbrochenem gelben  
Querbande*.  
Fabric. Spec. Inf. II. p. 300. no. 63. *Alis atris, ma-  
culis duabus ferrugineis suboppositis*.  
In Europae hortis.

411. *Corticella*, die Rindenmotte. †)

Müller l. c. p. 748. no. 411. *Rindenmotte*.  
Gleditsch Forstwiss. I. p. 558. no. 14. Tin. *Corticel-  
la*, die *Rindenmotte*.

412. *Sti-*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

\*\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

412. *Stipella*, der Schwefelfleck.

*Müller* l. c. p. 748. no. 412. *Schwefelfleck.*

*Pontopp.* N. G. von Dänem. p. 222. Tin. *Stipella.*  
t. 17.

*Clerk* Phal. t. 12. f. 5.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1575. Tin. *Stipella.*  
la. Nom. *Linn.*

413. *Sylvella*, die Rostbinde. \*)

*Müller* l. c. p. 748. no. 413. das *Bartköpfchen.*

*Fabric.* S. E. p. 667. no. 3. *Alucita Sylvella.*  
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 306. no. 4. *Aluc. Sylvella.*

414. *Gemmella*, der Eichenblattminierer.

*Müller* l. c. p. 748. no. 414. *Silberwolke.*

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 657. no. 47. Tin. *Gemmel-*  
la, die kleine *Eichenblattschabe.*

*Clerk* Phal. t. 10. f. 10.

*Fabric.* S. E. p. 663. no. 44. Tin. *Gemmella.* Nom.  
*Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 299. no. 59. Tin. *Gemmella.*

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1570. Tin. *Gem-*  
mella. Nom. *Linn.*

415. *Bractella*, der Goldflügel.

*Müller* l. c. p. 749. no. 415. *Goldflügel.*

*Füesl.* Schweiz. Inf. p. 43. no. 841. Tin. *Bractella.*

*Clerk* Phal. t. 12. f. 4.

*Fabric.* S. E. p. 662. no. 41. *Tinea Bractella.*

*Alis nigris, macula basaeos fasciaque media in-*  
*terrupta sulphureis.*

— *Spec. Inf. II.* p. 299. no. 56. Tin. *Bractella.*

*Mülleri*

\*) Nicht abgebildet.



*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1571. Tin. *Bractella*. Nom. *Linn.*

416. *Aristella*, die *Silberlinie*. \*)

*Müller* l. c. p. 749. no. 416. *Silberlinie*.

*Cathol. A.* p. 477. *Aristella*.

*Fabric. S. E.* p. 669. no. II. *Alucita Aristella*.  
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 308. no. 15. *Aluc. Aristella*.

417. *Caudella*, die *Schwanzlinie*. \*\*)

*Müller* l. c. p. 749. no. 417. *Schwanzlinie*.

*Fabric. S. E.* p. 669. no. 12. *Alucita Caudella*.

Alis subcaudatis, testaceis; linea postica fusca.

— *Spec. Inf. II.* p. 308. no. 16. *Aluc. Caudella*.

418. *Capitella*, der *Gelbkopf*. \*\*\*)

*Müller* l. c. p. 749. no. 418. *Gelbkopf*.

*Fabric. S. E.* p. 663. no. 45. Tin. *Capitella*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 300. no. 60. Tin. *Capitella*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 56. no. 493. Tin. *Capitella*.  
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 136. no. 1581. Tin. *Capitella*.

419. *Porrectella*, der *Hahenschwanz*.

*Müller* l. c. p. 749. no. 419. t. 22. f. 17. das *Langhorn*.

*Wien. Schmett.* p. 140. C. no. 62. *Unbek. R. Weißgestrichte Schabe mit gelblichem Unterrande*.  
Tin. *Porrectella* L.

*Degeer*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

\*\*\*) Nicht abgebildet.

*Degeer* Inf. I. t. 26. f. 15. 16.

— *Ueberf.* I. 3 Quart. p. 12.

— Tom. II. P. I. p. 494. no. 2.

*Phalène* à antennes filiformes, à trompe; à ailes étroites élevées d'un gris blanchâtre à bande longitudinale onquée brune.

*Phalène teigne blanchâtre de la Juliane.*

— *Ueberf.* II Th. I B. p. 364. no. 2. die weißliche Mottenphaläne der *Viola matronalis*.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1572. Tin. *Porre-stella*. Nom. *Linn.*

420. *Pedella*, die braune Dreybinde. \*)

*Müller* l. c. p. 750. no. 420. das Querbein.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 57. no. 513. Tin. *Pedella*. Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1582. Tin. *Pedella*.

421. *Argentella*, die Silbermotte.

*Müller* l. c. p. 750. no. 421. Silbermotte.

*Fabric.* S. E. p. 658. no. 17. Tin. *Argentella*. Nom. *Linn.*

— Spec. Inf. II. p. 293. no. 20. Tin. *Argentella*.

*Degeer* Inf. Tom. II. Part. I. p. 483. no. 2. t. 10. f. 19.

*Phalène* à antennes filiformes, à trompe; à ailes pendantes d'un blanc argenté, dont le dessous des supérieures est ardoisé, & dont l'extrémité du ventre est jaune.

*Phalène argentée.*

— *Ueberf.* II Th. I B. p. 357. no. 2. t. 10. f. 19. die Silbermotte.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1573. Tin. *Argentella*. Nom. *Linn.*

422. *Cal*

\*) Nicht abgebildet.

422. *Calthella*, die *Sumpfdottermotte*. \*)

Müller l. c. p. 750. no. 422. *Sumpfdottermotte*.

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 36. *Dotterblumenschabenraupe* (*Calthae Palustris*); *Dotterblumenschabe*. Tin. *Calthella* L.

Fabric. S. E. p. 663. no. 47. Tin. *Calthella*. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 300. no. 64. Tin. *Calthella*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 512. Tin. *Calthella*. Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1583. Tin. *Calthella*.

423. *Petiverella*, der *Rückenstrich*.

Müller l. c. p. 750. no. 423. die *Schleuder*.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 41. *Unbek. Raupe*. Gelbgraue Goldschielende Schabe.

Fabric. S. E. p. 664. no. 49. Tin. *Petiverella*. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 300. no. 65. Tin. *Petiverella*.

Schaeff. Icon. t. 43. f. 33.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1584. Tin. *Petiverella*. Nom. Linn.

424. *Swammerdammella*, das *Langhorn*.

Müller l. c. p. 751. no. 424. *Langhorn*.

Füesl. schweiz. Inf. p. 43. no. 842. Tin. *Swammerdammella*. In den *Wiesen*.

Wien. Schmett. p. 141. D. no. 2. *Unbek. R.* Bleichmessingfarbene gewässerte Schabe.

Der Drontheim. Gesellsch. Schr. III. p. 370. no. 36. Tin. *Swammerdammella*.

Clerk Phal. t. 12. f. i.

Fabric.

\*) Nicht abgebildet.

*Fabric. S. E.* p. 669. no. 13. *Alucita Swammerdammella.*

— *Spec. Inf. II.* p. 308. no. 17. *Tin. Swammerdammella.*

*Mülleri Zool. Dan. Pr.* p. 136. no. 1585. *Tin. Swammerdammella. Nom. Linn.*

425. *Reaumurella*, der *Goldrand.*

*Müller l. c.* p. 751. no. 425. der *Goldrand.*

*Füesl. schweiz. Inf.* p. 43. no. 843. *Tin. Reaumurella.*

*Wien. Schmett.* p. 143. D. no. 26. *Dotterweidenschabenraupe (Salicis Vitellinae); Dotterweidenschabe. Tin. Reaumurella L.*

*Der Dronth. Gefellsch. Schr. IV.* p. 287. no. 52. *Tin. Reaumurella.*

*Syst. Nat. du Regn. Anim. II.* p. 162. no. 92.

*Clerk Phal. t. 12. f. 2.*

*Fabric. S. E.* p. 670. no. 17. *Alucita Reaumurella. Nom. Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 309. no. 22. *Aluc. Reaumurella.*

*Mülleri Zool. Dan. Pr.* p. 136. no. 1586. *Tin. Reaumurella.*

*Geoffr. Inf. II.* p. 193. no. 28.

*Tinea nigra*, alis exterioribus deauratis, antennis corpore duplo longioribus.

*La Teigne noire bronzée.*

*Long.*  $3\frac{1}{2}$  lign.

426. *Degeerella*, der *Silberrand.*

*Müller l. c.* p. 751. no. 426. *Silberrand.*

*Füesl. schweiz. Inf.* p. 43. no. 844. *Tin. Degeerella.*

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 25. Unbek. R. Goldgestrichte Schabe mit gelbem Querbande.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 26. Goldgestreifte Schabe.

Scop. Ent. carn. p. 251. no. 647.

Alae nigrae, fascia argenteo-aurea; antennae longae.

Long. lin. 2.

Fabric. S. E. p. 669. no. 15. *Alucita Degeerella.* Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 309. no. 20. *Aluc. Degeerella.*

Geoffr. Inf. II. p. 193. no. 29. t. 12. f. 5.

*Tinea nigra*, alis superioribus lineis longitudinalibus, fascia lata transversa, inferneque radiis plurimis aureis; antennis corpore triplo longioribus.

La Coquille d'or.

Long.  $4\frac{1}{2}$  lign.

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 497. Tin. *Degeerella.* Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1587. Tin. *Degeerella.* Degeer Inf. I. t. 32. f. 13.

— Uebersf. 3 Quart. p. 99.

— Inf. Tom. II. P. I. p. 487. no. 6.

*Phalène* à antennes filiformes trois fois plus longues que le corps, & à trompe; à ailes pendantes bronzées traversées par une bande jaune bordée de violet.

*Phalène-frigane bronzée à bande jaune.*

— Uebersf. II Th. I B. p. 359. no. 6. die Erzfärbige gelbbandirte *Phryganäenphaläne.*

427. *Sulzella*, das Goldband. \*)

H 2

Mül.

\*) Nicht abgebildet. Diese hat Fabric. Spec. Inf. II. p. 309. no. 20. β. als eine Abänderung der *Degeerella* angeführt.

Müller l. c. p. 751. no. 427. *Goldband.*

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 24. *Unbek. R. Goldgestrichte Schabe mit schwarzem Querbande.*

Geoffr. Inf. II. p. 199. no. 44.

*Tinea nigra*, alis exterioribus deauratis, capitibus vertice, alarumque fascia transversa flavis.

*La Teigne dorée à bande & toupet jaunes.*

Long.  $2\frac{3}{4}$  lign.

428. *Podaella*, das *Milchband.* \*)

Müller l. c. p. 751. no. 428. *Milchband.*

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 845. Tin. *Podaella.*

Fabric. S. E. p. 670. no. 16. *Alucita Podaella.*

Nom. Linn.

--- Spec. Inf. II. p. 309. no. 21. Aluc. *Podaella.*

Geoffr. Inf. II. p. 194. no. 32. \*\*)

*Tinea nigra*, fascia transversa alba.

*La Teigne cordelière.*

Long.  $2\frac{1}{2}$  lign.

429. *Robertella*, das *Weißeck.* \*\*\*)

Müller l. c. p. 752. no. 429. die *weiße Ecke.*

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 8. *Unbek. R. Glänzende neblicht düstre Schabe.*

Fabric. S. E. p. 669. no. 14. *Alucita Robertella.*

Nom. Linn.

--- Spec. Inf. II. p. 308. no. 18. Aluc. *Robertella.*

430. *Geoffrella*, das *Silbergitter.* †)

Müller l. c. p. 752. no. 430. *Silbergitter.*

Wien.

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Diese nach der Meynung der Wiener Entomol. p. 123. Linn. *Pyralis cingulata.* no. 280.

\*\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 19. Unbek. R. Oker-  
gelbe Schabe mit Silberstrichen und zwey hell-  
gelben Dreyecken.

Fabric. S. E. p. 664. no. 50. Tin. *Geoffrella*. Nom.  
Linn.

--- Spec. Inf. II. p. 301. no. 67. Tin. *Geoffrella*.

431. *Mouffetella*, der Spitzflügel. \*)

Müller l. c. p. 752. no. 431. Spitzflügel.

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 57. Unbek. R. Röth-  
lichgraue Schabe mit 8 schwarzen Punkten.

Fabric. S. E. p. 664. no. 51. Tin. *Mouffetella*. Nom.  
Linn.

--- Spec. Inf. II. p. 301. no. 68. Tin. *Mouffetella*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 499. Tin. *Mouffe-  
tella*. Nom. Linn.

--- Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1588. Tin. *Mouffetella*.

432. *Listerella*, der Halbringel. \*\*)

Müller l. c. p. 752. no. 432. Halbringel.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 30. Unbek. R. Trüb-  
graue Schabe mit schwarzpunktirtem Unterran-  
de.

433. *Frischella*, der Goldbraune Flügel. \*\*\*)

Müller l. c. p. 752. no. 433. der Vergulder.

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 53. Unbek. R. Schmu-  
zige Goldgeglättete Schabe.

Fabric. S. E. p. 663. no. 48. Tin. *Frischella*. Nom.  
Linn.

--- Spec. Inf. II. p. 309. no. 19. *Alucita Fri-  
schella*.

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

\*\*\*) Nicht abgebildet.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 56. no. 498. Tin. *Frischella*.  
la. Nom. Linn.

-- Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1589. Tin. *Frischella*.

434. *Scopolella*, der *Goldsprenkel*. \*)

*Müller* l. c. p. 753. no. 434. *Goldsprenkel*.

*Wien. Schmett.* p. 138. C. no. 1. *Unbek. R. Schwärzliche Schabe mit 8 weißen Punkten.*

435. *Albinella*, der *Goldbogen*. \*\*)

*Müller* l. c. p. 753. no. 435. *Goldbogen*.

*Syst. Nat. du Regn. Anim.* II. p. 162. no. 91.

436. *Goedartella*, der *Silberbogen*. \*\*\*)

*Müller* l. c. p. 753. no. 436. *Silberbogen*.

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 558. no. 15. Tin. *Goedartella*, die *Goldfarbige Elfenmotte mit der doppelten Silberweißen Binde.*

*Clerk* Phal. t. 12. f. 14.

*Fabric.* S. E. p. 664. no. 33. Tin. *Goedartella*.

*Alis auratis; fasciis duabus punctisque tribus argenteis.*

-- *Spec. Inf.* II. p. 302. no. 72. Tin. *Goedartella*.

*In Alnetis; in Betulae gemmis.*

437. *Loevenhoekella*, die *Silberlinie*. †)

*Müller* l. c. p. 753. no. 437. *Silberlinie*.

*Wien. Schmett.* p. 141. C. no. 76. *Unbek. R. Kupferglänzende Schabe mit 12 Silber- oder Blausgoldflecken.*

438. *Merianella*, das *Silberblättchen*.

*Müller* l. c. p. 753. no. 438. *Silberblättchen.*

*Wien.*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

\*\*\*) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.



Wien. Schmett. p. 143. D. no. 31. Unbek. R. Purpurgoldne Schabe mit 3 blasfgoldnen Querbändern.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 161. no. 90.

Fabric. S. E. p. 664. no. 54. Tinea Merianella.  
Nom. Linn.

-- Spec. Inf. II. p. 302. no. 73. Tin. Merianella.

Geoffr. Inf. II. p. 198. no. 43.

Tinea nigro-aurata lineis argenteis transversis tribus, antennis extremo-albis.

La Teigne dorée à bandes d'argent.

Long. 1 lign.

Aët. Upsal. 1736. p. 26. no. 84.

Papilio alis depressis oblongis argenteis, lineis tribus transversis aureis, media bifurca.

439. *Wilkella*, das Bogenband.

Müller l. c. p. 754. no. 439. Bogenband.

Réaum. Inf. III. t. 4. f. 8.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 161. no. 89.

Fabric. S. E. p. 664. no. 55. Tin. *Wilkella*. Nom. Linn.

-- Spec. Inf. II. p. 302. no. 74. Tin. *Wilkella*.

Geoffr. Inf. II. p. 199. no. 43. β.

Tinea nigro-aurata, lineis argenteis transversis quatuor, antennis nigris.

Long. 1 $\frac{3}{4}$  lign.

(Variet. *Merianellae*).

440. *Lyonetella*, die Silberspalte. \*)

Müller l. c. p. 754. no. 440. Silberrostral.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 94.

Fabric. S. E. p. 665. no. 56. Tin. *Lyonetella*. Nom. Linn.

H 4

Fabric.

\*) Nicht abgebildet.

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 302. no. 77. Tin. Lyonetella.*

441. *Bonnetella*, die *Silberwelle*. \*)

*Müller l. c. p. 754. no. 441. Wellensilber.*

*Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 93.*

*Fabric. S. E. p. 665. no. 57. Tin. Bonnetella. Nom. Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 303. no. 78. Tin. Bonnetella.*

442. *Iungiella*, der *Siebenfleck*.

*Müller l. c. p. 754. no. 442. Verdoppeler.*

*Clerk Phal. t. 12. f. 9.*

*Cáthol. I. p. 405. Iungiella.*

*Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1594. Tin. Iungiella. Nom. Linn.*

443. *Schefferella*, der *Buchblattminirer*. \*\*)

*Müller l. c. p. 754. no. 443. Büchenwühler.*

*Gleditsch Forstwiss. I. p. 600. no. 4. Tin. Schefferella, die kleine schwarze und gelbgefleckte Buchmotte.*

*Wien. Schmett. p. 138. C. no. 21. Büchenblattschabenraupe (in Fagi Sylvaticae foliis); Büchenblattschabe. Tin. Schefferella L.*

*Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 27. Büchenminirer.*

*Fabric. S. E. p. 665. no. 58. Tin. Schefferella. Nom. Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 303. no. 79. Tin. Schefferella.*

444. *Rhediella*, die *gebrochene Silberlinie*.

*Müller l. c. p. 755. no. 444. Bruchsilber.*

*Clerk Phal. t. 12. f. 12.*

*Fabric.*

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

*Fabric.* S. E. p. 665. no. 59. Tin. *Rhediella.* Nom. Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 303. no. 82. Tin. *Rhediella.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 56. no. 500. Tin. *Rhediella.* Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 137. no. 1591. Tin. *Rhediella.*

445. *Roefella*, der *Apfelblattminirer.* \*)

*Müller* l. c. p. 755. no. 445. *Silberbuckel.*

*Früesl.* Schweiz. Inf. p. 43. no. 847. Tin. *Roefella.*

*Frisch* Inf. III. p. 31. no. 15. 3 Pl. t. 4. f. 7. von den Räuplein unter der Pflaumenblatthaut.

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 790. no. 20. Tin. *Roefella*, die allerkleinste Blattmotte des Apfelblatts.

*Wien. Schmett.* p. 143. D. no. 30. *Apfelblattschabentraupe* (in *Pyri Mali foliis*); *Apfelblattschabe.* Tin. *Roefella* L.

*Fabric.* S. E. p. 665. no. 60. Tin. *Roefella.* Nom. Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 303. no. 83. Tin. *Roefella.*

*Larva* 14-poda, flava, capite testaceo.

*Pupa* nuda, oblonga, brunnea.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 56. no. 501. Tin. *Roefella.* Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 137. no. 1592. Tin. *Roefella.*

*Degeer* Inf. I. t. 30. f. 10-12.

— *Ueberf.* I. 3 Quart. p. 36.

— *Inf. Tom.* II. Part. I. p. 495. no. 6.

*Phaléne* à antennes filiformes, à trompe, à ailes étroites couleur de bronze doré à taches argentées, mais sans point noir.

H 5

*Phaléne-*

\*) Vermuthlich einerley mit *Mülleri* Tin. *Maestingella.* Faun. Fr. p. 58. no. 521. Alis flavis linea maculisque niveis. — *Zool. Dan. Pr.* p. 138. no. 1603. Hierbey auch *Frisch*, III. t. 4. f. 7.

*Phalène-teigne dorée à taches argentées du Pommier.*

— Uebersf. II Th. I B. p. 366. no. 6. die goldne Silbergefleckte Apfelmottenphaläne.

Réaum. Inf. III. t. 4. f. 11-15.

446. *Linneella*, der Silberpunkt.

Müller l. c. p. 755. no. 446. der Autor.

Clerk Phal. t. 12. f. 8.

Behm. Epit. S. L. p. 168. no. 446. Tin. *Linneella*.

Fabric. S. E. p. 666. no. 61. Tin. *Linneella*.

Alis fusco-auratis; punctis quatuor argenteis elevatis.

— Spec. Inf. II. p. 304. no. 84. Tin. *Linneella*.

Geoffr. Inf. II. p. 200. no. 45.

*Tinea flavo-aurata*, punctis quatuor argenteis, antennarumque apice albo. Vulgo *Linnaea-nella*.

La Teigne dorée à quatre points d'argent.

Long.  $2\frac{2}{3}$  lign.

447. *Rajella*, der Erlenblattminirer.

Müller l. c. p. 755. no. 447. Erlenmotte.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 558. no. 16. Tin. *Rajella*, die kleine Goldfarbige, Silberweiße gedüpfelte Erlenmotte.

Swammerd. Bib. der Nat. Fol. p. 298. t. 44. f. 18-21. von den Würmern zwischen den beyden Häuten der Erlenblätter.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 32. Erlenblattschabenraupe (in Betulae Alni foliis); Erlenblattschabe.

Tin. *Rajella* L.

Fabric. S. E. p. 666. no. 62. Tin. *Rajella*. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 304. no. 85. Tin. *Rajella*.

Larva

*Larva* pallida, capite utrinque puncto testaceo.

*Pupa* oblonga mucrone dentato intra folliculum extus excrementis tectum.

*Degeer* Inf. I. t. 31. f. II. 12.

— *Uebersf.* I. 3 Quart. p. 40.

— Inf. Tom. II. P. I. p. 495. no. 5.

*Phalène* à antennes filiformes, à trompe; à ailes étroites élevées dorées à taches argentées, avec un point noir proche du bout.

*Phalène-teigne* dorée à taches argentées de l'Aune.

— *Uebersf.* II Th. I B. p. 366. no. 5. die goldne, Silbergefleckte Erlenminir - Mottenphaläne.

448. *Brunnichella*, die *Violetbinde*. \*)

*Müller* l. c. p. 755. no. 448. *Violetlinie*.

449. *Harrisella*, die *Brandspitze*. \*\*)

*Müller* l. c. p. 756. no. 449. *Brandspitze*.

*Fabric.* S. E. p. 666. no. 63. Tin. *Harrisella*. Nom. Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 305. no. 88. Tin. *Harrisella*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 56. no. 502. Tin. *Harrisella*. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 137. no. 1593. Tin. *Harrisella*.

450. *Clerckella*, die *Schwanzmotte*. \*\*\*)

*Müller* l. c. p. 756. no. 450. *Schwanzmotte*.

*Fabric.* S. E. p. 666. no. 66. Tin. *Clerckella*.

Alis argenteis, postice subcaudatis, fusco-striatis punctoque atro.

— *Spec. Inf.* II. p. 305. no. 93. Tin. *Clerckella*.

In

\*) Nicht abgebildet.

\*\*) Nicht abgebildet.

\*\*\*) Nicht abgebildet.

In *Europae Nemoribus*.451. *Occultella*, die *Fenstermotte*. \*)

Müller l. c. p. 756. no. 451. *Fenstermotte*.

Degeer Inf. I. Ueberf. 3 Quart. p. 32.

452. *Lichenella*, die *Mooßmotte*.

Müller l. c. p. 756. no. 452. *Flechtenmotte*.

Degeer Ueberf. I. 3 Quart. p. 78.

— Inf. Tom. II. Part. I. p. 380. no. 4. t. II. f. 5.  
6.

*Phalène* à antennes filiformes, sans trompe, dont la femelle est sans ailes; d'une chenille-teigne des murs à fourreau prismatique fait de grains de pierre.

*Phalène-teigne des murs à court fourreau prismatique*.

— Ueberf. II Th. I B. p. 276. no. 4. t. II. f. 1-6.  
die *Mauermottenphaläne mit kurzem dreyeckigen Gehäuse*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 306. no. 94. Tin. *Lichenella*.

*Aptera laevis nigra*.

*Larva* 16-poda, laevis, obscure grisea, postice incrassata, intra cucullum triangulari prismaticum ex arena constructum.

*Unabgebildete Linnéische Motten.*

1) no. 353. *Crataegella*.

2) no. 357. *Oxyocanthella*.

3) no. 359. *Pascuella*.

4) no. 362. *Rorella*.

5) no. 364. *Nemorella*.

6) no. 366. *Ramella*.

7) no. 370. *Vestionella*.

8) no.

\*) Nicht abgebildet.

- 8) no. 380. *Arbutella.*
- 9) no. 381. *Tessella.*
- 10) no. 384. *Parenthesella.*
- 11) no. 385. *Elongella.*
- 12) no. 386. *Punctella.*
- 13) no. 388. *Tetrapodella.*
- 14) no. 390. *Cinctella.*
- 15) no. 391. *Leucotella.*
- 16) no. 392. *Cinerella.*
- 17) no. 393. *Trigonella.*
- 18) no. 394. *Rhomboidella.*
- 19) no. 395. *Tertianella.*
- 20) no. 396. *Scabrella.*
- 21) no. 397. *Asperella.*
- 22) no. 398. *Serratella.*
- 23) no. 399. *Populella.*
- 24) no. 400. *Mercuriella.*
- 25) no. 405. *Cembrella.*
- 26) no. 408. *Juniperella.*
- 27) no. 409. *Fuscella.*
- 28) no. 410. *Mimutella.*
- 29) no. 411. *Corticella.*
- 30) no. 413. *Sylvella.*
- 31) no. 416. *Aristella.*
- 32) no. 417. *Caudella.*
- 33) no. 418. *Capitella.*
- 34) no. 420. *Pedella.*
- 35) no. 422. *Calthella.*
- 36) no. 427. *Sulzella.*
- 37) no. 428. *Podaella.*
- 38) no. 429. *Robertella.*
- 39) no. 430. *Geoffrella.*
- 40) no. 431. *Monffetella.*
- 41) no. 432. *Listerella.*
- 42) no. 433. *Frischella.*

- 43) no. 434. *Scopolella.*  
 44) no. 435. *Albinella.*  
 45) no. 437. *Loevenhoekella.*  
 46) no. 440. *Lyonetella.*  
 47) no. 441. *Bonnetella.*  
 48) no. 443. *Schefferella.*  
 49) no. 448. *Brunnichella.*  
 50) no. 450. *Clerckella.*  
 51) no. 451. *Occultella.*

*Neue Arten von Motten:*

1. *Tinea cauda piscina*, die *Fischschwanzmotte.*  
*Naturforscher* II St. p. 14. t. I. f. 6. (D. Kühn.)
2. *Aureo-polita*, der *Goldglanz.*  
*Naturforscher* III. p. 8. f) t. I. f. 8. (D. Kühn.)  
*Füesl. Magaz. der Entomol.* II. p. 107.  
*Schaeff. Icon.* t. 19. f. 4. 5.
3. *Quadrioculata*, das *Vierauge.*  
*Naturforscher* III. p. 8. g) t. I. f. 9. die fahlbraune vieräugigte Motte, welche fast die Gestalt einer Frühlingsfliege hat (D. Kühn).  
*Füesl. Magaz. der Entom.* II. p. 107.  
*Schaeff. Icon.* t. 278. f. 4-7.
4. *Aleella*, die *gelbbraunrothgefleckte Motte.*  
*Naturforscher* IX. p. 106. t. 2. (Schulze).  
 Alis oblongis flavis, maculis fulvis alternis,  
 strigaque undulata argentea.  
 In Germaniae Pratis.
5. *Chocolatella*, die *Chokolatenmotte.*



Bonnets Betracht. über die Natur p. 457. (Note Spalanzani).

Martini allgem. Gesch. der Nat. I. p. 633.

Alis griseis, pallide-flavis, nigro-punctatis maculatisque.

6. *Fueslinella*, die *Füßlismotte*.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 13. die Vorderflügel schwarz; die hintern braun; auf dem Kopfe und zu beyden Seiten des Bruststücks Orangeflecken; auf den Vorderflügeln weiße Tropfen.

7. *Proboscidella*, der *Schnauzbart*.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 14. die Flügel braun, mit einem Goldgelben Bande der Länge nach durchzogen, nebst einem rothgelben Fleck und Saum.

8. *Viciella*, *Wickenschabe*.

Wien. Schmett. p. 133. A. *Scheinspinner*schaben (Ph. Tin. Bombyciformes): no. 2. *Wickenschabenraupe* (*Viciae Sylvaticae*), Tab. I. a. f. 7. *Wickenschabe*, Tab. I. b. f. 7.

Geoffr. Inf. II. p. 203. no. 52.

*Tinea involucro ex paleis transversis composito.*

*La Teigne à fourreau de pailles transverses.*

*Fourreau à sept à huit lignes de long.*

Degeer Inf. I. p. 511. t. 29. f. 23-25.

*Chenille-teigne à seize jambes, rase, noirâtre, qui vit sur l'Ozier, & qui se fait un fourreau couvert de brins de gramen, qui sont placés transversalement sur le fourreau.*

Uebersf. I. 3 Quart. p. 80. t. 29. f. 23-25.

9. *Muscella*,

9. *Muscella*, *Fliegenflüchtige Schabe.*

*Wien. Schmett. p. 133. A. no. 3. Unbek. Raupe.*

10. *Bombycella*, *gelblichte düstere gewässerte Schabe.*

*Wien. Schmett. p. 133. A. no. 4. Unbek. R.*

11. *Pectinella*, *Afchgraue durchsichtige Schabe.*

*Wien. Schmett. p. 133. A. no. 5. Unbek. R.*

12. *Plumella*, *schwärzlichte Schabe.*

*Wien. Schmett. p. 133. A. no. 6. Unbek. R.*

13. *Palpella*, *braungelblichte Schabe mit 2 geraden Silberstreifen.*

*Wien. Schmett. p. 134. B. Geradschnauzige Schaben, Ph. Tin. Directipalpes: no. 3. Unbek. R.*

14. *Margaritella*, *braune Schabe mit Silberartigem Geradstreife.*

*Wien. Schmett. p. 134. B. no. 5. Unbek. R.*

*Geoffr. Inf. II. p. 183. no. 3.*

*Tinea cinerea, corniculis duobus cristatis, fascia alarum longitudinali argentea.*

*La Teigne à rayure d'argent.*

*Long. 4 lign.*

15. *Conchella*, *gelbbraune Schabe mit 2 Silberartigen Flecken.*

*Wien. Schmett. p. 134. B. no. 6. Unbek. R.*

16. *Inquinatella*, *gelblichte am Innenrande trübe Schabe.*

*Wien. Schmett. p. 134. B. no. 10. Unbek. R.*

17. *Exoletella*, *Beinfarbene graugestrichte Schabe.*

*Wien. Schmett. p. 134. B. no. 12. Unbek. R.*

18. *Straminella*, *Strohfarbige Schabe*.  
*Wien. Schmett.* p. 134. B. no. 13. *Unbek. R.*
19. *Luteella*, *Okergelbe Schabe*.  
*Wien. Schmett.* p. 134. B. no. 14. *Unbek. R.*
20. *Convolutella*, *Lichtgraue Schabe*.  
*Wien. Schmett.* p. 134. B. no. 15. *Unbek. R.*
21. *Falsella*, *weißlichglänzende dunkelgezeichnete Schabe*.  
*Wien. Schmett.* p. 134. B. no. 16. *Unbek. R.*
22. *Tristella*, *grau und braungemischte Schabe*.  
*Wien. Schmett.* p. 134. B. no. 17. *Unbek. R.*
23. *Quercella*, *Eichenschabe*.  
*Wien. Schmett.* p. 134. B. no. 18. *Eichenschabenraupe* (*Quercus Koboris*).
24. *Antennella*, *gelbliche, weißschielende Schabe*.  
*Wien. Schmett.* p. 135. B. no. 19. *Unbek. R.*
25. *Pyralella*, *weißlichte Schabe mit grauen Querflecken*.  
*Wien. Schmett.* p. 135. B. no. 20. *Unbek. R.*
26. *Alpella*, *blässhwefelgelbe olivgestrichte Schabe*.  
*Wien. Schmett.* p. 135. B. no. 21. *Unbek. R.*
27. *Ceruffella*, *graue Schabe mit silberner Untenrandlinie*.  
*Wien. Schmett.* p. 135. B. no. 22. *Unbek. R.*
28. *Quadrella*, *weiße Schabe mit gestrichtem Untenrande*.

130 *Lepidoptera*. 233. *Phalaena Tinea*.

*Wien. Schmett.* p. 135. B. no. 23. *Unbek. R.*

29. *Striatella*, graue Schabe mit weißen Geradstrichen.

*Wien. Schmett.* p. 135. B. no. 26. *Unbek. R.*

30. *Gigantella*, große graugelbe Schabe mit langen Schnauzen.

*Wien. Schmett.* p. 135. B. no. 27. *Unbek. R.*

31. *Argyrella*, silberne graugesprenkelte Schabe.

*Wien. Schmett.* p. 135. B. no. 28. *Unbek. R.*

32. *Anella*, graugemischte Schabe mit 2 Mittelringen.

*Wien. Schmett.* p. 135. B. no. 30. *Unbek. R.*

33. *Canella*, grau-röthliche Schabe ohne Ringe.

*Wien. Schmett.* p. 135. B. no. 31. *Unbek. R.*

34. *Ahenella*, glänzende schwarzgraulichte Schabe.

*Wien. Schmett.* p. 135. B. no. 32. *Unbek. R.*

35. *Alternella*, weißgraue Schabe mit breiten düstern Querstreifen.

*Wien. Schmett.* p. 135. B. no. 33. *Unbek. R.*

36. *Fagella*, Büchenschabe.

*Wien. Schmett.* p. 135. B. no. 34. *Buchenschabentraupe (Fagi Sylvaticae).*

37. *Noctuella*, bräunlichte Schabe mit düstern Ring- und Nierenflecken.

*Wien. Schmett.* p. 136. B. no. 35. *Unbek. R.*

38. *Verbascella*, Wollkrautschabe.

*Wien.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 36. *Wollkrautschabens-  
raupe* (Verbalci Tapfi).

39. *Daphnella*, *Zeidelbastschabe*.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 37. *Zeidelbastschabens-  
raupe* (Daphnes Mezerei).

40. *Nyctemerella*, *weiße Schabe mit schwarzen Rand-  
flecken*.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 38. *Unbek. R.*

41. *Dilutella*, *graue, düstergezeichnete Schabe*.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 40. *Unbek. R.*

42. *Barbella*, *dunkelgraue Schabe*.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 43. *Unbek. R.*

43. *Braßeella*, *rothgoldene Schabe*.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 44. *Unbek. R.*

44. *Falcella*, *gelbbraune Schabe mit gefichelten Ober-  
flügeln*.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 47. *Unbek. R.*

45. *Apicella*, *graugelbe Schabe mit spitzigem Außen-  
winkel der Oberflügel*.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 48. *Unbek. R.*

46. *Uncella*, *Erdfarben und weißgemischte Schabe mit  
geficheltem Außenwinkel der Oberflügel*.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 49. *Unbek. R.*

47. *Harpella*, *Zimmetbraune Schabe mit gelbem In-  
nenrande und gefichelten Oberflügeln*.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 50. *Unbek. R.*

48. *Ciliella*, goldbraune Schabe.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 51. Unbek. R.

49. *Genistella*, Gilbkrautschabe.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 52. Gilbkrautschabentraupe (*Genistae tinctoriae*).

50. *Pyropella*, bleichgelbe Schabe mit finstereim Außenrande.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 53. Unbek. R.

51. *Albidella*, weißsgraue Schabe.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 56. Unbek. R.

52. *Humerella*, Okerbraune Schabe mit weißsem Außenrande der Oberflügel.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 57. Unbek. R.

53. *Nitidella*, Silberweißse Schabe mit goldfarbiger Zeichnung.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 58. Unbek. R.

54. *Mendicella*, schwarzbraune Schabe.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 59. Unbek. R.

55. *Choragella*, glänzend Holzfarbichte dunkelgezeichnete Schabe.

Wien. Schmett. p. 137. C. Krummschnauzichte Schaben, Ph. Tin. *Recurvipalpes*: no. 1. Unbek. R.

56. *Characterella*, graulichte Schabe mit Sförmigem Mittelzeichen.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 2. Unbek. R.

57. *Arenella*, bleichsandfarbige Schabe mit Bleifarbenem Mittelpunkt.

Wien.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 3. Unbek. R.

58. *Liturella*, gelbliche Schabe mit niederen dunklen Flecken.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 4. Unbek. R.

59. *Daucella*, Möhrenschaube.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 5. Möhrenschaubenraupe (Dauci Carotae).

60. *Atomella*, graulichte dunkelgesprengte Schabe.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 6. Unbek. R.

61. *Laterella*, Ziegelfarbige Schabe.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 7. Unbek. R.

62. *Verrucella*, vorwärts Zimmetrothe, rückwärts düstere Schabe mit einer Warze.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 8. \*)

63. *Lobella*, graue Schabe mit 3 schwarzen Hökern.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 9. Unbek. R.

64. *Putridella*, Holzbräunliche Schabe mit einem kleinen weissen Mittelpunkt.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 10. Unbek. R.

65. *Monitella*, weißlichte Schabe mit einem bunten Makel am Außenrande.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 11. Unbek. R.

66. *Roborella*, Hageeichenschabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 14. Hageeichenschabenraupe (Quercus Roboris).

\*) Die Raupe auf dem Kellerhals oder Zeiland, Daphne Mezereum.  
S. Nachtrag p. 319. Note.

67. *Palumbella*, graue Schabe mit 2 röhlichen Quersirichen.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 15. Unbek. R.

68. *Abietella*, Tannenschabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 19. Tannenschabentraupe. (Pini abietis. Clus.)

69. *Adscitella*, grauglänzende Schabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 20. Unbek. R.

70. *Procerella*, goldgelbe Schabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 21. Unbek. R.

71. *Tetricella*, düsterglänzende Schabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 22. Unbek. R.

72. *Denifella*, gelbgraue weisgefleckte Schabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 23. Unbek. R.

73. *Lipfiella*, Hirschfarbene Schabe mit einer weislichten Nerue.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 24. Unbek. R.

74. *Tremella*, Zitterpappelschabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 27. Unbek. R.

75. *Cristella*, hellgraue Schabe mit schwarzen Randflecken.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 28. Unbek. R.

76. *Turpella*, düster und blasgraugemischte Schabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 29. Unbek. R.

77. *Umbrella*, graugelbe glänzende Schabe mit düstern Flecken.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 31. Unbek. R.



78. *Obsoletella*, Staubfarbige Schabe.  
*Wien. Schmett.* p. 139. C. no. 32. *Unbek. R.*
79. *Plumbella*, Bleyfarbene Schabe mit schwarzer Mittelmakel und schwarzen Punkten.  
*Wien. Schmett.* p. 139. C. no. 34. *Unbek. R.*
80. *Violella*, glänzende düster Veilrothe Schabe.  
*Wien. Schmett.* p. 139. C. no. 35. *Unbek. R.*
81. *Laevigella*, braune Schabe mit Goldstäubchen.  
*Wien. Schmett.* p. 139. C. no. 36. *Unbek. R.*
82. *Lactella*, glänzend braungemischte Schabe mit weissem Kopfe und Rücken.  
*Wien. Schmett.* p. 139. C. no. 37. *Unbek. R.*
83. *Rhombella*, Holzfarbige, schwarzgezeichnete Schabe.  
*Wien. Schmett.* p. 139. C. no. 38. *Unbek. R.*
84. *Obscurella*, düstere Schabe mit bleichem Außenrandpunkte.  
*Wien. Schmett.* p. 139. C. no. 39. *Unbek. R.*
85. *Aquella*, bleiche Schabe mit dunkler Zeichnung.  
*Wien. Schmett.* p. 139. C. no. 40. *Unbek. R.*
86. *Alabastrilla*, weiße Schabe.  
*Wien. Schmett.* p. 139. C. no. 41. *Unbek. R.*  
*Geoffr. Inf. II.* p. 168. no. 115.  
*Phalaena feticornis spirilinguis alba, oculis nigris, antennis pedibusque subflavescentibus.*  
*L' albâtre.*  
*Long. 2½ lign.*
87. *Vulgella*, graue Schabe.  
*Wien. Schmett.* p. 139. C. no. 44. *Unbek. R.*
88. *Terfella*, bleiche Schabe.

*Wien. Schmett.* p. 139. C. no. 45. Unbek. R.

89. *Sifymbrella*, *Wellensamenschabe*.

*Wien. Schmett.* p. 140. C. no. 46. *Wellensamenschabenraupe* (*Sifymbrii Sophiae*).

90. *Formosella*, *gelbe Schabe mit silbernem Außenrandmakel*.

*Wien. Schmett.* p. 140. C. no. 47. Unbek. R.

91. *Pedisequella*, *bleichglänzende Schabe*.

*Wien. Schmett.* p. 140. C. no. 48. Unbek. R.

92. *Terrella*, *röthlichgraue Schabe*.

*Wien. Schmett.* p. 140. C. no. 49. Unbek. R.

93. *Laminella*, *glänzende dunkelstahlgrüne Schabe*.

*Wien. Schmett.* p. 140. C. no. 51. Unbek. R.

94. *Nebulella*, *Afchgraue Schabe mit schwarzen Punkten*.

*Wien. Schmett.* p. 140. C. no. 52. Unbek. R.

95. *Echiella*, *Natterkopfschabe*.

*Wien. Schmett.* p. 140. C. no. 54. *Natterkopfschabenraupe* (*Echii vulgaris*).

96. *Derasella*, *bleichbraune Schabe*.

*Wien. Schmett.* p. 140. C. no. 56. Unbek. R.

97. *Cuspidella*, *schwarzbraune Schabe mit 4 weißlichen Streifen*.

*Wien. Schmett.* p. 140. C. no. 58. Unbek. R.

98. *Micella*, *stahlgrüne Schabe mit blau-silbernen Punkten*.

*Wien. Schmett.* p. 140. C. no. 59. Unbek. R.

99. *Atrilla*,

99. *Atrella*, blauschwarze Schabe mit 4 weißen Punkten.  
Wien. Schmett. p. 140. C. no. 60. Unbek. R.
100. *Pennella*, Silberweißgestrichte Schabe.  
Wien. Schmett. p. 140. C. no. 61. Unbek. R.
101. *Eburnella*, Helfenbeinfarbene gelbgestrichte Schabe.  
Wien. Schmett. p. 140. C. no. 63. Unbek. R.
102. *Variella*, graue bleichgefleckte Schabe.  
Wien. Schmett. p. 140. C. no. 64. Unbek. R.
103. *Epilobiella*, Weidrichsröschenschabe.  
Wien. Schmett. p. 141. C. no. 65. Weidrichsröschen-  
schabenraupe (*Epilobii hirsuti*).
104. *Sparfella*, weißliche schwarzgesprengte Schabe.  
Wien. Schmett. p. 141. C. no. 67. Unbek. R.
105. *Nanella*, schwarzgrau und weißgemischte Schabe.  
Wien. Schmett. p. 141. C. no. 68. Unbek. R.
106. *Opimella*, bräunlichte Schabe mit silbernem Mittelraume.  
Wien. Schmett. p. 141. C. no. 69. Unbek. R.
107. *Pygmaeella*, Goldfarbige Schabe mit bleichem Innenrande.  
Wien. Schmett. p. 141. C. no. 70. Unbek. R.
108. *Locupletella*, goldene und silberne Schabe mit düsterm Untenrande.  
Wien. Schmett. p. 141. C. no. 71. Unbek. R.

109. *Dimidiella*, halbgelb und halbschwarze Schabe.  
*Wien. Schmett.* p. 141. C. no. 72. Unbek. R.
110. *Pumilella*, weiß und graue Schabe.  
*Wien. Schmett.* p. 141. C. no. 73. Unbek. R.
111. *Accessella*, graubraune Schabe mit bleichgelben  
 Flecken.  
*Wien. Schmett.* p. 141. C. no. 74. Unbek. R.
112. *Majorella*, goldbraun gezeichnete Schabe.  
*Wien. Schmett.* p. 141. D. Schnauzenlose Schaben,  
 Ph. Tin. Impalper: no. 1. Unbek. R.
113. *Membranella*, mattgelbe durchsichtige Schabe.  
*Wien. Schmett.* p. 142. D. no. 3. Unbek. R.
114. *Rubricella*, braunröthliche kleingestrichte Schabe.  
*Wien. Schmett.* p. 142. D. no. 5. Unbek. R.
115. *Pilella*, glänzend düstergraue Schabe.  
*Wien. Schmett.* p. 142. D. no. 6. Unbek. R.
116. *Ephemerella*, weißliche fast durchsichtige Schabe.  
*Wien. Schmett.* p. 142. D. no. 9. Unbek. R.
117. *Spretella*, Aschgraue Schabe mit schwarzen  
 Punkten.  
*Wien. Schmett.* p. 142. D. no. 10. Unbek. R.
118. *Maurella*, glänzendschwarze Schabe.  
*Wien. Schmett.* p. 142. D. no. 11. Unbek. R.
119. *Ferrugella*, Goldgelbe bräunlichgemischte Scha-  
 be.  
*Wien. Schmett.* p. 142. D. no. 14. Unbek. R.

120. *Pronubella*, Trübgoldschielende Schabe mit gelben Unterflügeln.  
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 16. Unbek. R.
121. *Taurella*, grau und schwärzlichte Schabe mit kno-  
tigen Fühlhörnern.  
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 17. Unbek. R.
122. *Miscella*, düstergelb und blaugemischte Schabe  
mit Hökern.  
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 18. Unbek. R.
123. *Aurella*, rothgoldene Schabe mit silbernem Quer-  
bande.  
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 19. Unbek. R.
124. *Schiffermillerella*, rothgoldene Schabe mit stahl-  
blauem Querbande.  
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 20. Unbek. R.
125. *Exiguella*, düstere Schabe mit weißlichem Quer-  
striche.  
Wien. Schmett. p. 143. D. no. 21. Unbek. R.
126. *Flavifrontella*, grauglänzende Schabe mit gel-  
bem Kopfe.  
Wien. Schmett. p. 143. D. no. 22. Unbek. R.
127. *Obviella*, Aschgraue Schabe mit gelblichem In-  
nenrande.  
Wien. Schmett. p. 143. D. no. 23. Unbek. R.
128. *Albinigrella*, schwärzlichte Schabe mit 8 weißen  
Makeln.  
Wien. Schmett. p. 143. D. no. 27. Unbek. R.
129. *Mascullella*, grauglänzende Schabe mit zwey weiß-  
sen Innenrandpunkten.  
Wien. Schmett. p. 143. D. no. 28. Unbek. R.
130. *Fibulella*, Purpurschielende Schabe mit einem  
goldenen Gemeinmakel.

- Wien. Schmett.* p. 143. D. no. 33. *Unbek. R.*
131. *Metallella*, dunkelgoldne Schabe mit 6 Silberzeichen.  
*Wien. Schmett.* p. 144. D. no. 34. *Unbek. R.*
132. *Cydoniella*, Quittenblattschabe.  
*Wien. Schmett.* p. 144. D. no. 35. Quittenblattschabenraupe (in *Pyri Cydoniae foliis*).
133. *Rajestella*, grauglänzende Schabe mit einem schwärzlichen Punkte.  
*Wien. Schmett.* p. 144. D. no. 37. *Unbek. R.*
134. *Irella*, grauliche dunkelgefleckte Schabe.  
*Wien. Schmett.* p. 144. D. no. 39. *Unbek. R.*
135. *Alucitella*, goldglänzende Schabe mit 2 düstern Quersflecken.  
*Wien. Schmett.* p. 144. D. no. 40. *Unbek. R.*
136. *Hemidactylella*, oraniengelbe rothbraunpunktirte Schabe.  
*Wien. Schmett.* p. 144. D. no. 41. *Unbek. R.*
137. *Microdactylella*, weiße Schabe mit Goldgelben Winkelstreifen.  
*Wien. Schmett.* p. 144. D. no. 42. *Unbek. R.*
138. *Hirsutella*, Schwingelschabe.  
*Wien. Schmett.* Nachtr. p. 318. ad A. Schwingelschabenraupe (*Festucæ ovinae et elatioris*).
139. *Legatella*, breitflüglichte graue Schabe mit einem langen Silberstreife.  
*Wien. Schmett.* Nachtr. p. 319. ad B. *Unbek. R.*
140. *Tribunella*, breitflüglichte graue Schabe.  
*Wien. Schmett.* Nachtr. p. 319. ad B. *Unbek. R.*

141. *Centuriella*, blafsgraue braungelb und düfterfleckichte Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Unbek. R.

142. *Combinella*, Silberweifse, auswärts braungelbe Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Unbek. R.

143. *Marginella*, glänzende bräunliche Schabe mit einer weiffen Außenrandlinie.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Unbek. R.

144. *Tripunctella*, Flachsbräunliche Schabe mit drey schwarzen Punkten.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Unbek. R.

145. *Perficella*, Pfirsichschabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Pfirsichschabenraupe (Amygdali Perficæ).

146. *Bififfella*, Pflaumenschabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Pflaumenschabenraupe (Pruni domesticae).

147. *Ornatella*, hellbraune blaulichtweiffgestrichelte Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.

148. *Ligulella*, Sammetfchwarze Schabe mit einem weiffen Querstriche.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.

149. *Festivella*, Goldgelb und Silberweiff gemischte Schabe mit erhobenen braunen Fleckchen.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.

150. *Albipunctella*, Ruffarbene Schabe mit 3 weiffen Punkten.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.

151. *Aeneella*, grünlichtgoldene Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.

152. *Minimella*, düstergoldne Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.

153. *Splendella*, blankbraune Schabe mit röthlichsilber-  
nem Fänenrande und Punkte.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.

154. *Cuprella*, ganz rothgoldne Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.

155. *Rupella*, dunkelrothgoldene Schabe mit 4 runden  
Silbermakeln.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.

156. *Praelatella*, blankveilrothe Schabe mit 2 silbernen  
Eckmakeln und einem Querstriche.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.

157. *Argyrodactyla*, silberne Schabe mit schwarzgestri-  
cheltem Untenrande und Kielförmigen Unterflü-  
geln.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.

158. *Erythrodactyla*, röthlichgelbe dunkelrothfleckichte  
Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.

159. *Perlella*, die Perlmotte.

Scop. Entom. carn. p. 243. no. 620.

Alae supra eodem prorsus, quo perla, colore  
fulgidae; subtus fuscescentes.

In *Pratis*. Long. lin. 6.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. II. glänzend Perlfar-  
bichte Schabe. Unbek. R.

Knochs Beytr. zur Insektengesch. I St. p. 68. t. 4. f.  
6. Ph. Tin. *Perlella*, die Perlmotte.

*Tinea* alis oblongis margaritato-fulgidis, sub-  
tus furvis.



160. *Semirubella*, der *Halbröthling*.  
Scop. Entom. carn. p. 245. no. 623.  
Alae anticae vinaceae, femipaleaceae.  
In *Gramineis*. Long. lin. 6.
161. *Rosella*, die *halbrosenfarbige Motte*.  
Scop. Ent. carn. p. 245. no. 624.  
Alae anticae albae, femiroseae. Occiput aureum.  
In *herbidis collibus*. Long. lin. 4.
162. *Viduella*, der *Einfiedler*.  
Scop. Ent. carn. p. 245. no. 625.  
Alae anticae albae; linea fusca, a basi ad apicem prope marginem crassiolem decurrente.  
In *Sylvis*, rarior et solitaria. Long. lin.  $4\frac{1}{3}$ .
163. *Fuscella*, der *Braunpunkt*.  
Scop. Ent. carn. p. 245. no. 626.  
Alae canescentes, fusco-punctatae.  
In *montanis nostris*. Long. lin. 4.
164. *Craterella*, die *Achtlinie*.  
Scop. Ent. carn. p. 246. no. 627.  
Alae anticae albae; lineis longitudinalibus octo binisque transversis ferrugineis.  
In *Gramine*. Long. lin.  $5\frac{1}{3}$ .
165. *Chrysonuchella*, der *Streupunkt*.  
Scop. Ent. carn. p. 246. no. 628.  
Alae albae, margine crassiore, punctulis sparsis, strigisque binis transversis fuscescentibus.  
In *pratis*. Long. lin.  $5\frac{1}{3}$ .

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 8. *weisslichte Schabe mit einem Silberbogen und Untenrande.* Unbek. R.

166. *Virginella*, das *Jüngferchen.*

Scop. Ent. carn. p. 246. no. 629.

Pallida tota et albicans; alis anticis maculis duabus albissimis, anteriore conica, posteriore quadrata.

In *Nemoribus.* Long. lin. 5.

167. *Cornutella*, das *Zweyhorn.*

Scop. Ent. carn. p. 247. no. 633.

Tota ossea et polita; palpis *erectis.*

In *pratis.* Long. lin.  $5\frac{1}{2}$ .

168. *Marginella*, der *Blasrand.*

Scop. Ent. carn. p. 248. no. 635.

Pallide caryophyllina; alis anticis margine crassiore pallidiore punctisque (6-7) caryophyllinis variegato, fimbria subargentea.

In *Pomariis* circa Idriam. Long. lin.  $3\frac{1}{2}$ .

169. *Palliatella*, das *Schwarzauge.*

Scop. Ent. carn. p. 248. no. 636.

Ossea tota, alis impositis, oculis nigris.

In *Nemoribus nostris.* Long. lin. 7.

170. *Cervinella*, die *Hirschhornfarbige Motte.*

Scop. Ent. carn. p. 248. no. 637.

Alae *cervinae*; anticae punctis posticis nigris (4) in margine crassiore, (7) in exteriore. Corpus subtus subargenteum.

In *Pratis.* Long. lin.  $5\frac{1}{2}$ .

171. *Forficella*, der *Goldkopf.*

Scop. Ent. carn. p. 248. no. 638.

Alae anticae fusco-ferrugineae; capite, striga a basi ad angulum posticum extensa, maculaque obliqua postica marginis crassioris, *subaurei coloris.*

In *Sylvis.* Long. lin. 5.

172. *Flavella*, der *Gelbling.*

*Scop.* Ent. carn. p. 249. no. 639.

Caput, dorsum, alae anticae supra flavae ferrugineo-subfasciatae.

In *Nemoribus umbrosis.* Long. lin.  $4\frac{1}{2}$ .

173. *Gemmatella*, die *Juwelenmotte.*

*Scop.* Ent. carn. p. 249. no. 640.

Alae anticae flavescentes; fasciis ferrugineis punctisque argenteis variegatae.

In *Collibus nostris.* Long. lin.  $3\frac{3}{4}$ .

*Wien.* Schmett. p. 135. B. no. 25. *Gelblichte Schabe mit zwey bräunlichten Bändern.* Unbek. R.

174. *Eclipsella*, der *Dickrand.*

*Scop.* Ent. carn. p. 249. no. 641.

Obscure cana; alis anticis margine crassiore nigro-punctatis.

In *Pratis.* Long.  $3\frac{1}{3}$ .

175. *Mucronella*, der *Lanzettenflügel.*

*Scop.* Ent. carn. p. 250. no. 643.

Alae omnes lanceolatae, mucronatae, nitidae, concolores, pallidae; anticae longitudinaliter fusco-sublineatae.

*Unicam* collegi circa *Idriam.*

Long. lin.  $6\frac{1}{2}$ .

*Wien.* Schmett. p. 136. B. no. 45. *Unreinstrohsfarbichte Schabe.* Unbek. R.

176. *Scabiosella*, die *Skabiosenmotte*.

*Scop.* Ent. carn. p. 250. no. 644.

Alae anticae auratae, margine fubtusque una cum posticis utrinque haematiticae lucidae. Antennae alis longiores, albae, basi nigricantes.

In Floribus *Scabiosae officin.*

*Long.* lin. 4.

*Poda* Mus. Graec. p. 94. *Metallica.*

*Füesl.* schweiz. Inf. p. 43. no. 846. Tin. *Scabiosella* *Scop.* Auf den wilden *Skabiosen*.

*Sulzers* Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 16. die *Skabiosenmotte*.

177. *Viridella*, der *Goldgrünling*.

*Scop.* Ent. carn. p. 250. no. 645.

Alae anticae viridi-auratae. Femora postica barbata.

In *Sylvis Idriensibus.* *Long.* lin.  $3\frac{1}{3}$ .

*Wien.* Schmett. p. 142. D. no. 4. *Mattgrüngoldglänzende Schabe.* *Unbek. R.*

178. *Barbatella*, der *Bartling*.

*Scop.* Ent. carn. p. 251. no. 646.

Alae anticae glaucae, aurato-punctatae. *Palpi barbati.* Antennae alis longiores, apice albidae.

In *Collibus gramineis Carnioliae super.*

*Long.* lin.  $2\frac{1}{3}$ .

179. *Croesella*, die *Goldlinie*.

*Scop.* Ent. carn. p. 251. no. 648.

Alae fature violaceae, anticae fascia, basi et apice, lineisque longitudinalibus (5 - 7) aureis. Antennae longissimae alidae.

In *Evonymo vulgari.*

*Long.* lin. 2<sup>1</sup>.

180. *Rufimitrella*, das Rauchmützgen.

Scop. Ent. carn. p. 251. no. 649.

Caput lana rufa vestitum. Corpus nigrum.

Alae fuscae, anticae supra fusco-viridi aeneae.

In *Sylvestribus*. Long. lin. 2½.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 15. Bräunlicht - Messingfarbige Schabe. Unbek. R.

181. *Hemerobiella*, die Hemerobienmotte.

Scop. Ent. carn. p. 252. no. 650.

Alae anticae canae, fusco-punctulatae. Tibiae posticae plumosae.

Frisch Inf. I. p. 37. 3 Pl. t. XI. f. 1-6. von der Blattmotte, die mit aufgerichteter gerader Hülse fort-kriecht. \*)

182. *Obscurella*, der Dusterling.

Scop. Ent. carn. p. 252. no. 652.

Fusca; alis anticis supra fusco-auratis, apice subhaematiticis.

In *Carniolia* inferiore.

Long. lin. 3.

183. *Fenestrella*, die Fenstermotte.

Scop. Ent. carn. p. 252. no. 653.

Alae anticae albae; maculis punctisque nigris, postice nebula subaurata.

Circa *fenestras* occurrit primo vere.

Long. lin. 3.

184. *Scaella*, die Treppenmotte.

Scop. Ent. carn. p. 253. no. 654.

Alae anticae albae; tribus paribus punctorum nigrorum, contiguorum, totidem obliquas aequae diffitas veluti fascias praeferentium.

K 2

Ruri.

\*) Dies die perpendicular stehenden braunen Bälglein auf den Apfel- und Birnblättern.

148 *Lepidoptera*. 233. *Phalaena Tinea*.

*Ruri*. Long. lin. 2.

185. *Punctella*, der *Punktling*.

*Scop.* Ent. carn. p. 253. no. 655.

Alae anticae niveae; punctis fuscescentibus,  
in apice confluentibus variegatae.

*Ruri* inter *Corylos*. Long. lin.  $2\frac{1}{2}$ .

186. *Comella*, das *Weißhaar*.

*Scop.* Ent. carn. p. 253. no. 656.

Capillitium album, alba coma per marginem  
alae internum decurrente auctum. Alae anticae  
ferrugineae fascia obscuriore, obsoleta, obliqua.

Circa domos et hortos.

Long. lin.  $2\frac{1}{4}$ .

187. *Pufiella*, der *Zwerg*.

*Scop.* Ent. carn. p. 253. no. 657.

Alae anticae cauda repanda terminatae, posticae  
lineares.

In *Pratis*. Long. lin.  $1\frac{1}{2}$ .

188. *Thrafonella*, der *Praler*.

*Scop.* Ent. carn. p. 253. no. 658.

Alae anticae fusco-auratae, lineis strigisque  
transversis argenteis, macula nigra ad angulum  
posticum, in qua puncta tria argentea.

In *herbidis paludosis*.

Long. lin.  $2\frac{2}{3}$ .

189. *Equitella*, das *Pferdeschwänzchen*.

*Scop.* Ent. carn. p. 254. no. 659.

Alae anticae caudula e margine exteriori na-  
ta, loboque terminatae; lituris in margine eodem  
quinis, in opposito vero binis argenteis.

In *herbidis paludosis*.

Long. lin.  $2\frac{1}{2}$ .

190. *Arum-*

190. *Aruncella*, *Schwarzwurzelmotte.*  
*Scop.* Ent. carn. p. 254. no. 660.  
 Alae anticae auratae, cum intermixto violaceo-rubro colore, fronte aureis pilis pubescente.  
 In Paniculis *Asteae*, *Arunci.*  
*Long.* lin.  $1\frac{1}{4}$ .
191. *Alchimiella*, *der Lanzettenfleck.*  
*Scop.* Ent. carn. p. 254. no. 661.  
 Alae anticae aureae, striga transversa, antica, maculaque lanceolata apicis, laccae colore.  
 Circa *Idriam.* *Long.* lin.  $2\frac{1}{2}$ .
192. *Aureatella*, *der Goldröthling.*  
*Scop.* Ent. carn. p. 254. no. 662.  
 Alae anticae rubro-auratae, fascia maculisque aureis.  
 In *Sylvestribus locis.* *Long.* lin.  $2\frac{1}{3}$ .
193. *Aeneella*, *der Kupferkönig.*  
*Scop.* Ent. carn. p. 255. no. 663.  
 Fulca tota, alis anticis aeneo-fuscis.  
 In *Sylvis.* *Long.* lin. 3.
194. *Leucocerella*, *der weiße Doppelpunkt.*  
*Scop.* Ent. carn. p. 255. no. 664.  
 Alae anticae aurato-rubrae, punctis binis obsoletis albis.  
 In *Sylvis.* *Long.* lin. 2.
195. *Luridella*, *der Schmutzling.*  
*Scop.* Ent. carn. p. 255. no. 665.  
 Alae argenteae, anticae atomis punctisque fuscis inquinatae. Caput cum thorace album.  
 Circa *Labacum.* *Long.* lin.  $3\frac{1}{2}$ .
196. *Zoolegella*, *die Thiermotte.*

*Scop.* Ent. carn. p. 255. no. 666.

Pallide cervina; alis anticis puncto postico nigro.

In *Avium exuviis*, et *Insectis adservatis*, praesertim *Cancris*.

Huic proxima, et forte eadem, Phal. Tin. *Pelionella* Linn. no. 372, sed nostra non est cana.

*Long.* lin.  $2\frac{1}{2}$ .

197. *Rufella*, der *Fuchs*.

*Scop.* Ent. carn. p. 255. no. 667.

Alae griseo-cinerae, corpore pedibusque rufis.

Circa *Labacum*. *Long.* lin.  $2\frac{1}{2}$ .

198. *Murinella*, das *Mäuslein*.

*Scop.* Ent. carn. p. 256. no. 668.

Alae pallide murinae.

In *Carniolia inferiore*. *Long.* lin. 3.

*Wien. Schmett.* p. 137. B. no. 55. *Mausfarbichte Schabe*. *Unbek. R.*

199. *Arbustella*, die *Strauchmotte*.

*Scop.* Ent. carn. p. 256. no. 670.

Alae anticae subargenteae, puncto nigro.

Inter *arbusta*. *Long.* lin.  $1\frac{1}{2}$ .

200. *Domesticella*, die *Hausmotte*.

*Scop.* Ent. carn. p. 256. no. 671.

Albida nitens, alis omnibus apice utrinque nigro nebulosis.

In *Cubilibus*. *Long.* lin. 3.

201. *De Bornella*, die *Goldbinde*.

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 118. no. 137.

Antennis longissimis; alarum anticarum lineis aureis



aureis nigrisque, et fascia aurea violaceo marginata moeniata.

Circa *Schemnitz.* Long. alae ant. lin. 5-6.

202. *Gronoviella*, das *Mohrenkind.*

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 119. no. 138.*

Alis nigris, punctis aureo-argenteis 8-9; marginalibus tribus maioribus.

Circa *Schemnitium.*

Alae anticae Long. lin. 4.

203. *Vandelliella*, die *Violetlinie.*

*Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 119. no. 139.*

Alae anticae aureae; linea media violacea, fascia versus basin argentea, violaceo-marginata.

Circa *Schemnitium.* Statura prioris.

204. *Cornella*, die *Korneelkirschenmotte.*

*Fabric. S. E. p. 657. no. 8.*

Alis niveis, fascia punctisque numerosis fuscis.

Habitat in *Saxoniae cornu.*

— *Spec. Inf. II. p. 291. no. 11. Tin. Cornella.*

205. *Nigrella*, der *Rothafter.*

*Fabric. S. E. p. 658. no. 19.*

Nigra, alis fuscis, abdomine rufo.

In *Daniae Nemoribus.*

— *Spec. Inf. II. p. 294. no. 24. Tin. Nigrella.*

206. *Cryptella*, die *ostindianische Wellenstreife.*

*Fabric. S. E. p. 658. no. 20.*

Alis griseis, linea dimidiata albissima strigaeque postica undata, argentea.

In *India orientali.*

— *Spec. Inf. II. p. 294. no. 25. Tin. Cryptella.*

207. *Limbella*, der *Saumflügel.*

*Fabric.* S. E. p. 660. no. 27.

Alis ciliatis, exalbidis, limbo maculisque fuscis.

In *Germaniae Nemoribus.*

— *Spec. Inf. II.* p. 296. no. 35. Tin. *Limbella.*

208. *Undella*, die *Wellenmotte.*

*Fabric.* S. E. p. 661. no. 35.

Alis fusco-cinereis; lineola media fasciaque posticae undatis, albis.

— *Spec. Inf. II.* p. 297. no. 47. Tin. *Undella.*

In *Germania.*

209. *Compositella*, der *Rückenfleck.*

*Fabric.* S. E. p. 663. no. 46.

Alis fuscis; macula communi dorsali argentea, e strigis quatuor compositis.

In *Angliae Nemoribus.*

— *Spec. Inf. II.* p. 300. no. 62. Tin. *Compositella.*

210. *Drurella*, die *Drurella.*

*Fabric.* S. E. p. 666. no. 64.

Alis fusco-argenteis, fascia postica aurea.

*Hafniae.*

— *Spec. Inf. II.* p. 305. no. 89. Tin. *Drurella.*

211. *Aurella*, der *Goldflügel.*

*Fabric.* S. E. p. 666. no. 65.

Alis auratis, postice atris, fascia argentea. *Lipsiae* in *Pomoniae arboribus.*

— *Spec. Inf. II.* p. 305. no. 92. Tin. *Aurella.*

212. *Spissicella*, das *Dickhorn.*

*Fabric.* *Mantiff.* p. 295. no. 3-4.

Alis oblongis griseis, antennarum articulis duobus inferioribus *incrassatis.*

*Chilonii.*

*Fabric. Spec. Inf. p. 289. no. 4. Tin. Spißicella.*

213. *Arcella, der Braunbogen.*

*Fabric. Mantiff. p. 295. no. 29-30.*

Alis niveis; arcu communi maculisque duabus marginalibus fuscis.

In *Germania.*

— *Spec. Inf. II. p. 296. no. 38. Tin. Arcella.*

214. *Cylindrella, die Walzenförmige Motte.*

*Fabric. Mantiff. p. 295. no. 34-35.*

Alis anticis linearibus fuscis, maculis tribus flavis.

*Hamburgi.*

— *Spec. Inf. II. p. 297. no. 45. Tin. Cylindrella.*

215. *Bipunctella, der Zweypunkt.*

*Fabric. Mant. p. 296. no. 38-39.*

Alis fusco-cinereis, puncto marginali albo.

*Hamburgi.*

— *Spec. Inf. II. p. 298. no. 51. Tin. 2-punctella.*

216. *Sulphurella, die Schwefelmotte.*

*Fabric. Mant. p. 296. no. 45-46.*

Fusca, capite thorace alarumque basi maculaque costali sulphureis.

— *Spec. Inf. II. p. 300. no. 61. Tin. Sulphurella.*

In *Germaniae Nemoribus.*

217. *Seppella, der doppelte Silberstrich.*

*Fabric. Mantiff. p. 296. no. 52-53.*

Alis auratis, strigis duabus argenteis.

In *Anglia.*

— *Spec. Inf. II. p. 301. no. 70. Tin. Seppella.*

218. *Cramerella*, der schwarze Endpunkt.*Fabric.* Mantiss. p. 296. no. 64-65.

Alis pallide argenteis postice fuscis maculis marginalibus argenteis punctoque terminali atro.

In *Anglia*.— *Spec. Inf. II.* p. 305. no. 90. *Tin. Cramerella*.219. *Linetella*, der lineirte Flügel.*Fabric.* *Spec. Inf. II.* p. 291. no. 12.

Alis albidis fusco-lineatis, apice strigis duabus fuscis.

In *Agro Pedemontano*.220. *Strigella*, die silberne Randstreife.*Fabric.* *Spec. Inf. II.* p. 293. no. 22.

Alis anticis cinereo-flavescentibus, striga marginali argentea.

In *Germania*.221. *Marginella*, der weiße Wulstrand.*Fabric.* *Spec. Inf. II.* p. 293. no. 23.

Alis anticis fuscis, margine crassiori albo, palpis porrectis incrassatis.

222. *Gramella*, die Winkelstreife.*Fabric.* *Spec. Inf. II.* p. 294. no. 26.

Alis cinereis, strigis duabus angulatis fuscis, argenteaque marginali.

In *Anglia*.223. *Scalacella*, das schwarze Treppchen.*Fabric.* *Spec. Inf. II.* p. 294. no. 28.

Alis coerulefcenti cinereis, punctis vitta media maculisque rhombeis contiguis atris.

*Beschäftigungen* der Berlin. Gesellsch. Naturf. Fr. III. p. 36. t. I. f. 6. (D. Kühn).

224. *Stigmatella*, der *weiße Rippenfleck*.

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 295. no. 34.*

Alis sublinearibus ferrugineis, macula costali  
alba.

In *Anglia*.

225. *Clematella*, die *Waldrebenmotte*.

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 297. no. 41.*

Alis anticis niveis, lineola baseos, fascia me-  
dia punctoque apicis nigris.

In *Angliae Clematide*.

226. *4-punctella*, der *Vierpunkt*.

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 298. no. 52.*

Alis fuscis, punctis duobus albidis.

In *Germania*.

227. *Fueslella*, der *Schwarzwinkel*.

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 301. no. 66.*

Alis auratis argenteo subfasciatis, angulo ani  
macula atra, punctis tribus argenteis.

In *Germaniae Nemoribus*.

228. *Sulzerella*, die *abgebrochene Streife*.

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 301. no. 71.*

Alis cinereis, strigis tribus abbreviatis lineo-  
lisque duabus apicis argenteis fusco-marginatis.

In *Africa aequinoctiali*.

229. *Schieffermüllerella*, die *Spaltstreife*.

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 302. no. 75.*

Alis auratis, strigis tribus nigro-argenteis, ter-  
tia externe bifida.

In *Hamburgensibus arboretis*.

230. *Bergsträsserella*, der *Flachflügel*.

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 302. no. 76.*

'Alis

Alis planis auratis, limbo atro punctisque argenteis numerosis.

In *Germaniae Pomariis.*

231. *Stroemella*, die *Norwegische Waldmotte.*

*Fabric. Spec. Inf. p. 303. no. 80.*

Alis atris, punctis quatuor argenteis, maculisque quatuor marginalibus flavis.

In *Norwagiae Nemoribus.*

— *Reise durch Norwegen p. 196.*

231. *Gleichenella*, die *Englische Waldmotte.*

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 303. no. 81.*

Alis planis atris, fascia media maculisque duabus apicis oppositis argenteis.

In *Angliae Nemoribus.*

232. *Schreberella*, der *Glanzfleck.*

*Fabric. Spec. Inf. p. 304. no. 86.*

Alis auratis, basi fasciis duabus maculisque duabus apicis argenteis nitidissimis.

In *Anglia.*

233. *Klemannella*, die *Englische Gartenmotte.*

*Fabric. Spec. Inf. p. 304. no. 87.*

Alis auratis argento subfasciatis, apice maculis duabus atris, interiori oblonga tripunctata.

In *Angliae hortis.*

234. *Blancardella*, der *Siebenfleck.*

*Fabric. Spec. Inf. p. 305. no. 91.*

Alis auratis, lineola apicis maculisque septem marginalibus argenteis.

In *Angliae Nemoribus.*

235. *Dentella*, die *Zahnbinde.*

*Fabric. S. E. p. 667. no. 2. Alucita Dentella.*

Alis fuscis, apice adscendentibus; vitta dorsali communi unidentata, alba.

*Fabric.* Spec. Inf. II. p. 306. no. 3.

In *Sueciae Caprifolio.*

*Larva* glabra, viridis, linea dorsali purpurea.

*Pupa* flava intra folliculum fusiformem utrinque apertum.

*Degeer* Inf. Tom. II. Part. I. p. 493. no. 1.

*Phalène-teigne à bande jaune du Chevre-feuille.*

— *Uebers.* II Th. I B. p. 364. no. 1. die *Mottenphaläne mit der gelben Binde auf den Geißblättern.*

*Albin.* Inf. t. 73. fig. e, f, g, h.

236. *Lucella*, der *Schneekopf.*

*Fabric.* S. E. p. 667. no. 4.

Alis flavis, immaculatis, capite thoraceque niveis.

In *Suecia.*

— Spec. Inf. II. p. 307. no. 5.

237. *Flavella*, die *gelbe Rückenbinde.*

*Fabric.* S. E. p. 667. no. 5.

Alis fuscis; vitta communi dorsali abbreviata maculaque flavis.

In *Suecia.*

— Spec. Inf. II. p. 307. no. 6.

238. *Bipunctella*, der *schwarze Doppelpunkt.*

*Fabric.* S. E. p. 668. no. 7.

Alis fuscis; vitta communi dentata, alba, thorace niveo; punctis duobus atris.

In *Lichene prunastri Saxoniae.*

*Fabric.*

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 307. no. 8.*

239. *Costella*, der *Rippenfleck*.

*Fabric. S. E. p. 668. no. 10.*

Nivea, alis rufo-auratis; macula *costali* baseos alba, fusco-punctata.

— *Spec. Inf. II. p. 308. no. 13.*

In *Anglia*.

240. *Fasciella*, die *Braunstreife*.

*Fabric. S. E. p. 670. no. 18.*

Alis auratis, *fascia fusca*, antennis apice albis.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 310. no. 23.*

241. *Sulphurella*, der *Schwefelfleck*.

*Fabric. S. E. p. 670. no. 19.*

Alis anticis auratis; maculis duabus *sulphureis* oppositis, posticis flavis.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 310. no. 25.*

242. *Oppositella*, der *Gegenfleck*.

*Fabric. S. E. p. 670. no. 20.*

Alis fuscis; maculis duabus *oppositis* flavis, posticis fuscis.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 310. no. 27.*

243. *Ephippella*, die *Sattelmotte*.

*Fabric. Mantiss. p. 297. no. 1. 2. Alucita Ephippella.*

Alis pallide auratis, vitta dorsali nivea, fascia aurea.

In *Europa*.

*Fabric.*



*Fabric. Spec. Inf. II. p. 306. no. 2.*

244. *Niveella*, der *Grönländer*.

*Fabric. Mantiff. p. 297. no. 8-9.*

Alis niveis, maculis duabus marginalibus fasciaque media nigris, capite albo.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 308. no. II.*

245. *Marginella*, der *Schneerand*.

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 307. no. 8. Alucita Marginella.*

Alis fusco-nitidis, marginibus niveis.

In *Iuniperetis Angliae*.

246. *Striatella*, der *Gelbstrich*.

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 310. no. 24.*

Alis auratis, flavo-striatis, fascia media flavo cupro marginata.

In *Angliae hortis*.

247. *Atomella*, die *Atomenmotte*.

*Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 518.*

Alis ex albo fuscoque variis, strigis longitudinalibus nigro-punctatis; margine postico argenteo.

In *Pratis*.

248. *Wiedemanella*, der *blaue Silberpunkt*.

*Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 519.*

Alis fulvis, fasciis maculisque albis, lineis punctisque coeruleo-argenteis.

In *Pratis*.

— *Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1601.*

249. *Obliquella*, die *Schregstreife*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 58. no. 520.

Alis plumbeis, fasciis duabus obliquis albidis,  
margine infima albo nigroque tessulato.

In *Pratis*.

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1602.

250. *Ludvigella*, das braune Dreyeck. \*)

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 58. no. 522.

Alis griseis; basi priorum macula magna,  
margine extimo triangulo minimo fusco.

In *Horto*.

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1604.

251. *Hebenstreitella*, der Düstereck. \*\*)

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 58. no. 523.

Alis subfuscis, priorum maculis tribus obscu-  
ris umbraticis.

In *Horto*.

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1605.

252. *Filicella*, der Fadenflügel.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1600.

Alis superioribus apice in acumen erectis fu-  
scis, linea dorsali communi medio divergente,  
antennis pedibusque albis.

253. *Angulella*, der Silberwinkel.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1595.

Alis cinereis lanceolatis, superioribus angulis  
duobus argenteis, lineolaque apicis nigra.

254. *Hauberella*, der Weißsaum.

*Mülleri*

\*) Hierbey *Rösel* I. NV. 4. t. II. die doch mit *Linn.* *Cucullatella* no. 376. einerley ist.

\*\*) Hierbey *Rösel* I. NV. 4. t. 2. Diese wird bald für *Linn.* *Tortrix Rosana* no. 293, bald für *Oporana* no. 292. ausgegeben.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1596.

Alis anticis ciliisque albis, posticis utrinque,  
anticisque subtus, nigro-cinereis.

255. *Albella*, die *Schneemotte*.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1597.

Alis totis albis ciliatis, oculis nigris.

*Geoffr.* Inf. II. p. 185. no. 8.

*Tinea* tota alba oculis nigris.

*La Teigne blanche*.

*Long.*  $2\frac{1}{2}$  lign.

256. *Goetzella*, die *gelbe Längsstreife*.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1598.

Alis fulvescentibus, superioribus striga longi-  
tudinali communi flava, linea marginis inferio-  
ris alba.

257. *Lupulella*, die *Krummstreife*.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1599.

Alis fulvescentibus; fascia marginis superio-  
ris incurvata, maculaque inferioris flavis.

258. *Auratella*, das *silberne Ringelhorn*.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1606.

Alis auratis, antennis annulo argenteo.

*Der Dronth. Gesellsch. Schr.* IV. p. 288. no. 54.  
*Tin. Aurata*.

259. *Ciliatella*, der *Dreysaum*.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1607.

Alis linearibus; anticis atomis nigris, macu-  
lisque sparsis luteis, posticis ter ciliatis.

260. *Hirundinella*, der *Schwalbenschwanz*.

*Geoffr. Inf. II. p. 182. no. 1.*

*Tinea corniculis duobus subulatis recurvis,*  
*cinerea, alis macula fusca.*

*La Teigne à queue d'hirondelle.*

*Long. 3½ lign. Larg. 2 lign.*

261. *Radiella*, das *Strahlenband*.

*Geoffr. Inf. II. p. 182. no. 2.*

*Tinea corniculis duobus subulatis recurvis,*  
*alis flavescens nitidis, striarum albidarum or-*  
*dine duplici transverso.*

*La Teigne à bandes rayonnées.*

*Long. 5 lign.*

262. *Histrionella*, der *gelbe Harlekin*.

*Geoffr. Inf. II. p. 184. no. 5.*

*Tinea alis flavis, fasciis maculisque nigris.*

*L'Arlequinette jaune.*

*Long. 4½ lign.*

263. *Nebulella*, die *Nebelotte*.

*Geoffr. Inf. II. p. 185. no. 7.*

*Atro-plumbea, alis superioribus fusco-nebu-*  
*lofis.*

*La Teigne plombée nébuleuse.*

*Long. 2 lign.*

264. *Bordella*, die *Punktborte*.

*Geoffr. Inf. II. p. 185. no. 9.*

*Cinerea, alarum margine inferiore punctis*  
*nigris.*

*La Teigne à bordure de points.*

*Long.*  $3\frac{1}{2}$  lign.

265. *Cruciella*, das *Ritterkreuz.*

*Geoffr.* Inf. II. p. 187. no. 12.

Fusca, cruce dorso decussata alba.

*La Teigne à croix de Chevalier.*

*Long.*  $2\frac{1}{2}$  lign.

266. *Triangulella*, das *dreyfache Dreyeck.*

*Geoffr.* Inf. II. p. 188. no. 15.

Nigra, alis pone albidis, macula triplici triangulari nigra.

*La Teigne bedaude aux trois triangles.*

*Réaumur.* Inf. II. t. 40. f. 5.

267. *Quadrella*, die *Quadratmotte.*

*Geoffr.* Inf. II. p. 189. no. 16.

Alis nigris, superioribus macula quadrata alba ex quatuor lineolis albis transversis composita.

*La Teigne à quarrure.*

*Long.*  $2\frac{1}{2}$  lign.

268. *Quadrillella*, der *Vierfleck.*

*Geoffr.* Inf. II. p. 189. no. 17.

Nigra, antice albidis, maculis quatuor nigris; pone nigris, maculis duabus albis.

*La Teigne à quadrille.*

*Long.*  $2\frac{2}{3}$  lign.

269. *Duplicella*, die *Zweylinie.*

*Geoffr.* Inf. II. p. 189. no. 18.

Alis atris, punctorum alborum linea duplici transversa.

*La Teigne noire à deux rangs de points blancs.*

*Long.*  $1\frac{1}{4}$  lign.

270. *Fasciella*, das *Vierband.*

*Geoffr.* *Inf.* II. p. 190. no. 20.

*Alis dilute cinereis, fasciis tribus fuscis transversis undulatis.*

*La Teigne à quatre bandes brunes ondulées.*

*Long.*  $3\frac{1}{2}$  lign.

271. *Viridella*, das *Grünband.*

*Geoffr.* *Inf.* II. p. 191. no. 23.

*Alis corpori circumvolutis albido-roseis, fasciis tribus obscure virescentibus.*

*Le Manteau à bandes verdâtres.*

*Long.*  $6\frac{1}{2}$  lign.

272. *Rosella*, der *Rosenrand.*

*Geoffr.* *Inf.* II. p. 192. no. 25.

*Alis corpori circumvolutis albescentibus, margine roseo.*

*Le Manteau couleur de Rose.*

*Long.* 7 lign.

273. *Cinerella*, die *Aschmotte.*

*Geoffr.* *Inf.* II. p. 192. no. 26.

*Fusco-cinerea, alarum macula rhomboïdaea albida oblonga.*

*Le losange cendré.*

*Long.* 3 lign.

274. *Fissella*, die *gespaltene Flügelader.*

*Geoffr.*

Geoffr. Inf. II. p. 192. no. 27.

Alis cinereis, superioribus nitentibus, nervis multifidis fuscis.

La Teigne à nervures.

Long. 5 lign.

275. *Mediella*, der *Zwischenfleck*.

Geoffr. Inf. II. p. 194. no. 30.

Alis flavescens, lineis duabus et macula intermedia fuscis in extremo superiorum.

L'Entre-ligne.

Long. 5 lign.

276. *Fuscorubella*, der *braune Mönch*.

Geoffr. Inf. II. p. 194. no. 31.

Fusco-rubra, alarum superiorum margine exteriori maculis duabus flavis.

La Teigne à deux taches jaunes en bordure.

Long.  $3\frac{1}{2}$  lign.

277. *Marmorella*, die *Marmorotte*.

Geoffr. Inf. II. p. 195. no. 34.

Nigro-fusca, rivulis flavescens marmorata.

La Teigne à marbrure.

Long. 5 lign.

278. *Obliquella*, der *Sonderling*.

Geoffr. Inf. II. p. 196. no. 36.

Cinerea, alarum fascia triplici obliqua undulata fusca.

La Teigne grise à trois sautoirs bruns.

*Long.*  $3\frac{1}{2}$  lign.

279. *Thoracella*, der *gestreifte Brustschild*.

*Geoffr. Inf. II. p. 196. no. 37.*

Capite thoraceque flavo lineis longitudinalibus fuscis, alis albo-flavescentibus, fasciis transversis fuscis.

*La Teigne à corcelet rayé.*

*Long.* 4 lign.

280. *Interruptella*, das *Bruchband*.

*Geoffr. Inf. II. p. 197. no. 38.*

Albo-flavescens, fasciis duabus obliquis ferrugineis, posteriore interrupta.

*La Teigne à bande interrompue.*

*Long.*  $2\frac{1}{2}$  lign.

281. *Kochiella*, das *Randdreyeck*.

*Geoffr. Inf. II. p. 197. no. 39.*

Alba, margine alarum exteriori maculis tribus fuscis, triangulum referentibus.

*La Teigne à triangle marginat.*

*Long.*  $3\frac{1}{2}$  lign.

282. *Esperella*, das *Fünfband*.

*Geoffr. Inf. II. p. 197. no. 40.*

Alba, alis superioribus lineis quinque transversis fuscis.

*La Teigne blanche à cinq bandes brunes.*

*Long.*  $1\frac{2}{3}$  lign.

283. *Laichartingella*, der *eingeschnittene Rand*.

*Geoffr. Inf. II. p. 198. no. 41.*



Fusca, linea duplici transversa flava, margine alarum undique flavo-intersecto.

La *Teigne à bordure herminée.*

Long. 2 lign.

284. *Schränkella*, der *Weißring.*

Geoffr. Inf. II. p. 198. no. 42.

Alis superioribus nigris, fascia longitudinali, maculisque duabus aureis, antennis medio-albis.

La *Teigne à bande dorée, & anneau blanc aux antennes.*

Long.  $2\frac{3}{4}$  lign.

285. *Herbstella*, die *Safranmotte.*

Geoffr. Inf. II. p. 200. no. 46.

Crocea, lineis transversis fusco-argenteis interruptis, alarum medio macula alba punctisque plumbeis.

La *Teigne crayonnée.*

Long.  $3\frac{1}{2}$  lign.

286. *Borowskiella*, die *Schimmelmotte.*

Geoffr. Inf. II. p. 201. no. 47.

Albida, lineis longitudinalibus reticulatis fuscis, involucro villoso-albescente.

La *Teigne moïse.*

Long. 4 lign.

287. *Bernoulliella*, die *Stielmotte.*

*Geoffr. Inf. II. p. 201. no. 48.*

Alis cinereis, lineis albis, fasciaque longitudinali fusca, involucro fusco pediformi.

*La Teigne à fourreau en crosse.*

*Long. 4 lign.*

*Réaum. Inf. Tom. III. t. 16.*

288. *Kühnella, die Plattenmotte.*

*Geoffr. Inf. II. p. 202. no. 49.*

Nigro-cinerea, involucro fusco recurvo, lamina duplici foliosa tecto.

*La Teigne à fourreau à deux lames.*

*Long. 3 lign.*

289. *Lapidella, die Steinmoosmotte.*

*Geoffr. Inf. II. p. 204. no. 53.*

*La Teigne des pierres à fourreau rond en capuchon.*

*(Noch nie zur Verwandlung gebracht.)*

*Réaum. Inf. III. t. 15. f. 1. 2. 3.*

— No. 54. *La Teigne des pierres à fourreau triangulaire à pans.*

*Réaum. Inf. III. t. 15. f. 7. 8.*

290. *Anomalella, der Hautfuß.*

*Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 495. no. 7.*

*Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes étroites élevées grises, d'une chenille mineuse du Rosier.*

*Phalène-teigne mineuse grise du Rosier.*

Degeer Tom. I. t. 30. f. 20. t. 31. f. 13. 14. 16.

La Chenille une mineuse jaune à dix-huit pattes membraneuses & point de pattes écailleuses, qui mine les feuilles du Rosier en galeries.

— Uebers. I. 3 Quart. p. 41. t. 30. f. 20. t. 31. f. 13. 14. 16.

— II Th. I B. p. 366. no. 7. die graue Rosenblattminirmotte.

Naturforscher 15tes St. p. 21. t. 2. f. 1-12. die wahre, aber unendlich kleine Phaläne der Degeerischen Raupe mit 18 häutigen Wulstfüßen.

291. *Frangutella*, die Faulbaumotte.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 496. no. 8.

*Phalène-teigne blanche, tachetée de brun de l'Aune noir,*

— Tom. I. t. 32. f. 1. 4. 8. 9. 10. 11.

— Uebers. I. 3 Quart. p. 49. t. 32. f. 1. 4. 8. 9. 10. 11.

— II Th. I B. p. 367. no. 8. die weiße braungefleckte Faulbeermottenphaläne.

292. *Chaerophyllella*, die Kälberkropfnotte.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 496. no. 9.

*Phalène-teigne à ailes huppées, du Cerfeuil-sauvage.*

— Tom. I. t. 29. f. 9-18.

— Uebers. I. 3 Quart. p. 46. t. 29. f. 9-18.

— II Th. I B. p. 367. no. 9. die wilde Kerbelmottenphaläne mit gebüschelten Flügeln.

170 *Lepidoptera.* 233. *Phalaena Tinea.*

293. *Entella*, die *Koromandelsche Entella*.

*Cramer* Pap. exot. III. p. 27. t. 208. Fig. D.

Alis flavis; anticis maculis purpurascensibus  
rubro-marginatis, posticis flavo-venosis.

294. *Nobilitella*, der *Kurakaner*.

*Cramer* Pap. exot. III. p. 128. t. 264. Fig. G.

Alis anticis fusco-rubris, maculis albissimis  
nigro-marginatis, posticis incarnatis fusco-mar-  
ginatis.

295. *Molinella*, der *Scheckflügel*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 113. t. 348. Fig. G.

Alis anticis pulchre variegatis, posticis luteis.

296. *Florella*, die *Surinamische Florella*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 114. t. 348. Fig. L.

Fusca, flavo-maculata.

297. *Argentella*, die *Surinamische Silbermotte*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 135. t. 359. Fig. I.

Tota argentea, marginibus nigricantibus,

298. *Petronella*, die *Surinamische Petronella*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. K.

Testacea, atro-striata.

299. *Punctella*, der *Surinamische Goldpunkt*.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. L.

Nigra, punctis aurantiacis atomisque flavis.

300. *Nigrella*, der *ostindianische Mohr*.

*Linn.* S. N. ed. 12. Tom. III. App. p. 225.

Alis atris, strigis albis, anteriore simplici, po-  
steriore circumflexa.

Müllers Suppl. B. p. 314. G. no. 453. a. der *Weißstriem.*

VII. *Federmotten. Alucitae.*

(*Fächerfalter; Federvögel; Geistgen.* Les Papillons à ailes en plumes. Réaum. Les Pterophores. Geoffr. Phalène - Tipule Degeer).

453. *Monodactyla*, die *Einfeder.*

Müller l. c. p. 756. no. 453. *Einfeder.*

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 848. Aluc. *Monodactyla.*

Réaum. Inf. I. t. 20. f. 12-16.

Fabric. S. E. p. 671. no. 1. *Pterophorus Monodactylus.* Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 310. no. 1.

Mülleri Faun. Fridr. p. 59. no. 524. Aluc. *Monod.* Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1608.

454. *Didactyla*, die *Zweyfeder.*

Müller l. c. p. 757. no. 454. *Zweyfeder.*

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 849. Aluc. *Didactyla.*

Gleditsch Forstwiss. II. p. 939. no. 4. Aluc. *Didactyla.*

*Die braune Feder- oder Fingermotte mit ästigen zwey- und dreytheiligen Flügeln.*

Wien. Schmett. p. 145. no. 2. *Märzenwurzgeistchenraupe* (Gei rivalis); *Märzenwurzgeistchen.* Al. *Didact.* L.

Schäffers Inf. III. p. 146. c. fig. der *Federfalter.*

— Icon. t. 159. f. 5. *Pterophorus secundus.*

Bekm. Ep. S. L. p. 168. no. 454.

Raj. Hist. Inf. p. 205. no. 101.

*Phalaena minima*, alis amplis, nervis rigidis, membrana connectente, facile disrupta a se invicem disiunctis.

Ex *Eruca parva incarnata*, Caprifolii folia depascente.

Scop. Ent. carn. p. 256. no. 672.

Alae fuscae; anticae semibifidae, segmento inferiore falcato, omnibus rachi albida.

In *Pratis nostris*.

Long. lin. 5.

Fabric. S. E. p. 671. no. 2. *Pterophorus didactylus*.

Alis fissis, fuscis, strigis albis; anticis bifidis, posticis tripartitis.

In *Convolvulo; Geo rivali*.

— Spec. Inf. II. p. 310. no. 2.

*Larva* 16-poda, viridis, fasciculato-pilosa.

*Pupa* elongata, lineis duabus dorsalibus tuberculorum quadri-spinosorum.

Mülleri Faun. Fridr. p. 59. no. 525. *Aluc. didactyla*. Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1609.

(An Schaeff. Icon. t. 93. f. 7?)

Degeer Inf. Tom. II. p. 260. no. 1. t. 4. f. 1-9.

*Phalène - Tipule* à aile brunes rayées de blanc, dont les supérieures sont divisées en deux, & les inférieures en trois parties barbues.

*Phalène - Tipule brune rayée de blanc.*

— Uebersf. II Th. I B. p. 186. no. 1. t. 4. f. 1-9.

*Die braune, weißgestreifte Erdschnakenphaläne.*

455. *Tridactyla*, die Dreyfeder.

Müller l. c. p. 757. no. 455. t. 22. f. 18. *Dreyfeder*.

Füesl.

*Füßl.* Schweiz. Inf. p. 43. no. 850. Aluc. *Tridactyla*.

*Scop.* Ent. carn. p. 257. no. 675. Ph. *Tridactyla*.

Nivea tota, alis anticis ultra medium bifidis;  
posticis trifidis.

In *Pratis*:

*Long.* lin. 6.

*Poda* Mus. graec. t. 2. f. 14.

*Fabric.* S. E. p. 671. *Pterophorus* 3. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 311. no. 3. In *Europae hortis*.

*Beschäftigungen* Naturf. Fr. zu Berl. III. t. I. f. 8.

(D. *Kühn*).

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1610. An Al. *tridactyla*?

Alis patentibus fissis, griseis, macula fusca, lineaque apicis transversa alba; posticis tripartitis.

456. *Tesseradactyla*, die *Wolkenfeder*.

*Müller* l. c. p. 757. no. 456. *Wolkenfeder*.

*Pontopp.* N. G. v. Dännem. p. 222. t. 17.

*Fabric.* S. E. p. 671. *Pterophorus* 4. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 311. no. 4.

*Mülleri* Faun. Fr. p. 59. no. 527. Aluc. *Tesseradactyla*. Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1611.

457. *Tetradactyla*, die *Vierfeder*.

*Müller* l. c. p. 757. no. 457. t. 22. f. 19. *Vierfeder*.

*Sulzers* Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 20. die *Vierfeder*.

*Mülleri* Faun. Fr. p. 59. no. 528. Aluc. *Tetradactyla*. Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1612.

458. *Pterodactyla*, die *Flügelfeder*.

*Müller*

*Müller* l. c. p. 757. no. 458. *Flüggelfeder.*

*Pontopp.* Nat. Gesch. von Dännem. p. 222. t. 17.

*Wien. Schmett.* p. 146. no. 6. Tab. I. a. f. 8. *Windlinggeistchenraupe* (*Convolvuli arvensis*); *Windlinggeistchen.* Tab. I. b. f. 8. A. *Pterodactyla* L.

*Scop.* Ent. carn. p. 257. no. 674.

Alae anticae bifidae, divisura lineari, puncto nigro medio notatae.

In pratis sterilioribus.

Long. lin. 4.

*Fabric.* S. E. p. 671. *Pterophorus* 5. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 311. no. 5.

*Larva* subpilosa coerulea, linea dorsali purpurea.

*Geoffr.* Inf. II. p. 92. no. 2.

*Pterophorus* fuscus, alis superioribus apice bipartitis, inferioribus tripartitis.

Le *Pterophore brun.*

Long. 10 lign.

*Aët.* Upsal. 1736. p. 26. no. 87. *Papilio* alis ramosis.

*Mülleri* Faun. Fr. p. 59. no. 526. Al. *Pterodactyla.* Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 138. no. 1613.

#### 459. *Pentadactyla*, *Fünffeder.*

*Müller* l. c. p. 758. no. 459. *Fünffeder.*

*Friesl.* Schweiz. Inf. p. 43. no. 851. Aluc. *Pentadactyla.*

*Röfels* Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 12. t. 5. das kleine, dicke, blafsgrüne *Räuplein* mit braunen Punkten und hellen Streifen.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 18. no. 31. *Fünffeder.*

*Wien.*



Wien. Schmett. p. 146. no. 9. *Schlehengeistchen-  
raupe* (*Pruni Spinosa*); *Schlehengeistchen.* Aluc.  
*Pentadactyla* L.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 28. *weiße  
Federmotte.*

Behm. Epit. S. L. p. 168. no. 459. Aluc. *Pentada-  
ctyla.*

Gleditsch Forstwiss. II. p. 939. no. 5. Aluc. *Penta-  
dactyla.*

*Die weiße Federmotte mit fünfstheiligen Flie-  
geh.*

Fabric. S. E. p. 672. *Pterophorus* 6.

Alis niveis, anticis bifidis, posticis tripartitis.

— Spec. Inf. II. p. 311. no. 6.

*Larva* 16-poda, pilosa, viridis nigro-puncta-  
ta lineaque dorsali alba.

*Pupa* pilosa, viridis, nigro-punctata.

Mülleri Faun. Fr. p. 59. no. 529. Aluc. *Pentada-  
ctyla.* Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1614.

Geoffr. Inf. II. p. 91. no. 1. t. XI. f. 6.

*Pterophorus* albus, alis superioribus bipartitis,  
inferioribus tripartitis.

Le *Pterophore* blanc.

Long. 1 pouce.

460. *Hexadactyla*, die *Sechsfeder.*

Müller l. c. p. 758. no. 460. *Sechsfeder.*

Friesl. schweiz. Inf. p. 43. no. 852. Aluc. *Hexada-  
ctyla.*

Frisch Inf. III. p. 20. no. 10. 2te Pl. t. 7. f. 1-5. von  
dem kleinen *Caprifoliumblüträuplein.*

Blumenbachs Handb. der N. G. I. p. 372. no. 22. Al.  
*Hexadactyla.*

*Wien. Schmett.* p. 146. no. 10. *Heckenkirschengeistchenraupe* (Lonicerae Xylostei); *Heckenkirschengeistchen.* Al. *Hexadactyla* L.

*Bekm. Ep. S. L.* p. 168. no. 460. Al. *Hexadactyla.*

*Scop. Ent. carn.* p. 258. no. 676.

Alae singulae sexpartitae fuscae albis transversis lineolis fasciatae.

Circa *Labacum.*

Long. lin.  $3\frac{1}{3}$ .

*Fabric. S. E.* p. 672. *Pterophorus* 7.

Alis fissis, cinereis, singulis sexpartitis.

— *Spec. Inf. II.* p. 312. no. 7.

*Geoffr. Inf. II.* p. 92. no. 3.

*Pterophorus* cinereus, fusco-maculatus, alis superioribus octopartitis, inferioribus quadripartitis.

Le *Pterophore en Evantail.*

Long. 6 lign.

*Neue Arten von Federmotten.*

1. *Diptera*, die *Einfeder.*

*Sulzers* Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 19.

Alis lanceolatis albidis, fusco-maculatis.

2. *Paradoxa*, *Meyersvögelein.*

*Sulzers* Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 21. vergröß. f. 22.

Alis pilosis binis; elinguis, barba divisa magna.

Fortasse foemina —

3. *Ochrodactyla*, *blaßröthlichgelbes Geistchen.*

*Wien. Schmett.* p. 145. no. 1. *Unbek. R.*

4. *Tri-*

4. *Trichodactyla*, Braunes weißgestrichtes Geistchen.  
Wien. Schmett. p. 145. no. 3. Unbek. R.

5. *Calodactyla*, Dunkelbraun und Oraniengelb gemischtes Geistchen.

Wien. Schmett. p. 146. no. 4. Unbek. R.

An Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 267. no. 2. t. 3.  
f. II. 12. *Phalène-Tipale brune?*

Uebersf. II Th. I B. p. 190. no. 2. t. 3. f. II. 12.  
die braune Erdschnakenphaläne.

6. *Rhododactyla*, Heckrosengeistchen.

Wien. Schmett. p. 146. no. 5. Heckrosengeistchen-  
raupe (*Rosae caninae*).

7. *Leucodactyla*, Lungenkrautgeistchen.

Wien. Schmett. p. 146. no. 7. Lungenkrautgeistchen-  
raupe (*Pulmonariae officinalis*).

8. *Megadactyla*, Weißlichtes bräunlichgeflecktes Geistchen.

Wien. Schmett. p. 146. no. 8. Unbek. R.

9. *Chrusodactyla*, Braunes Geistchen mit Goldglänzenden Querstrichen.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. Unbek. R.

10. *Microdactyla*, Flacksblüthfarben, bleichroth und braungemischtes Geistchen.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. Unbek. R.

11. *Gonodactyla*, Bräunlichweißes Geistchen mit einem düstern Dreyeckfleckchen.

III. Th. IV. Band. M Wien.

*Wien. Schmett.* p. 320. *Unbek. R.*

12. *Galactodactyla*, *Milchrahmfarbenes Geiſtchen mit einem düſtern Punkte.*

*Wien. Schmett.* p. 320. *Unbek. R.*

13. *Bipunctidactyla*, *die Zweypunktfeder.*

*Scop. Ent. carn.* p. 257. no. 673.

*Alae anticae cinerae, punctis tribus, nigris, lineaque fusca longitudinali in limbo.*

*In Sylvestribus.*

*Long. lin. 4.*

14. *Heterodactyla*, *der Fremdling.*

*Mülleri Faun. Fridr.* p. 59. no. 530.


*Alis patentibus fillis, nigris, maculis albis, anticis bifidis, posticis tripartitis.*


*In horto.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 138. no. 1615.


*Ende der Lepidopterorum.*

---














SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01476 4120